

RENATI  
DES-CARTES  
OPERA  
PHILOSOPHICA.

EDITIO TERTIA,

*Nunc demum hac Editione diligenter recognita,  
& mendis expurgata.*



# C O N T E N T A

In hoc Volumine.

*Meditationes de Prima Philosophia ; &c.*

Epistola ad Celeberrimum virum D. Gisbertum  
Voetium.

*Principia Philosophiæ.*

*Dissertatio de Methodo.*

Dioptrice.

Metecora.

*Tractatus de Passionibus Animæ.*




T Y P O G R A P H V S  
A D L E C T O R E M .



*Vm in nova hac operum Illustris Viri, RENATI  
DES CARTES, editione adornanda in id  
unicè fuerimus intenti, ut quàm accuratissimè pro-  
diderent: à Clarissimis Viris D. Ioanne de Racy, Phi-  
losophia; & D. Francisco à Schooten, Mathefcos, in  
Acad. Lugd. Bat. Professoribus, impetravimus, ut ille quidem  
menda Typographica in Principiis & Methodo in priores editio-  
nes illapsa suppeditaverit, hic vero idem in Dioptrica & alibi  
praestiterit, eamque novis quibusdam figuris ut & animadversio-  
nibus nonnullis illustraverit, ac Geometriam, qua intra paucas  
septimanas est sequutura, de novo recognoverit, longè amplioribus  
Commentariis exornaverit, nec non posthumis D<sup>ni</sup> de Beaune ac-  
cessionibus locupletaverit. Quod nostrum Te juvandi studium,  
Amice Lector, si acceptum compererimus, brevi etiam CAR-  
TESII de Homine tractatum cum genuinis figuris (cujus nobis  
ab amico jam spes facta est) edere in animum duximus. Vale.*





*Primus inaccessum qui per tot sæcula verum  
 Eruit è tetrìs longæ caliginis umbris,  
 Mysteria sagax, Natura, tuus, sic cernitur Orbi  
 Cartesius. Voluit sacros in imagine vultus  
 Jungere victuræ artificis pia dextera famæ,  
 omnia ut aspicerent quem sæcula nulla tacebunt.*

CONSTANTINI HUGENII F. 27





R E N A T I  
D E S - C A R T E S  
P R I N C I P I A  
P H I L O S O P H I Æ.

2

*Nunc demum hac Editione diligenter recognita, & mendis expurgata.*



AMSTELODAMI,  
Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios,  
Anno c1615 c1616  
*Cum Privilegio.*

## P R I V I L E G E .

**L**OUÏ par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, à noi aimez, & feaux Conrre des gens tenans nos cours de Parlement, Bailifs, Seneschaux, Prevofts, Juges, & leurs Lieutenans, & autres nos juges & officiers quelconque, A chascun d'eux, ainsi qu'il appartenra, salut. L'invention des Sciences & des Arts accompagnez, de leurs demonstrations, & des moyens de les mettre à execution, estant une production des Esprits qui sont plus excellens que le commun, a fait que les Princes & les Estats en ont toujours receu les inventeurs avec toutes sortes de gratifications; afin que ces choses introduites en lieux de leur obissance, ils en deviennoient plus florissans. Ainsi nostre bien aimé Des Cartes nous a fait remonstrer qu'il a par une longue estude rencontré & démontré plusieurs choses utiles & belles, auparavant incognois dans les Sciences humaines, & concernant divers arts avec les moyens de les mettre en execution. Toutes lesquelles choses il esst de bailier au public, en luy accordant qu'il peüss faire imprimer des Traitez, qu'il en a composéz, & composera cy après, soit de theorie soit de pratique, separement & conjointement en telle part que bon luy semblera dedans ou dehors nostre Royaume, & par telles personnes qu'il voudra de nos sujets & autres, avec les defences acoustumées en cas pareil. Nous regardant humblement nos lettres à ce nécessaires. A ces causes desrant gratifier ledit Des Cartes, & faire cognoistre que c'est à luy que le public a l'obligation de ses inventions, nous avons par ces presentes accordé, permis, voulons, & nous plaist, que le dit Des Cartes peüss faire & faire imprimer toutes les œuvres qu'il a composéz & qu'il composera touchant les sciences humaines, en tel nombre de traités, & de volumes que ce soit, separement & conjointement, en telle part que bon luy semblera, dedans & dehors nostre obissance, par telles personnes qu'il voudra choisir de nos sujets ou autres. Et que pendant le terme de dix années consecutives à conter pour chascun volume ou traité du jour qu'il sera parachevé d'imprimer, mesmes auparavant ce terme commencé, aucun ne peüss imprimer ou faire imprimer, en tout ny en partie, sous quelque pretexte ou deguïsement que ce peüss estre, aucune des œuvres du dit Des Cartes, que ceun de nos sujets ou autres auquel il en aura donné la permission, ny personne en vende & debite & autre impression que de celle qui aura esté faite par sa permission, à peine de Mille livres d'amande, confiscation de tous les exemplaires, despens, dommages & interests, applicables moitié aux pauvres & moitié au profit du dit Des Cartes. Si vous mandons & à chascun de vous enjoignons par ces presentes, que du contenu en icelles vous faites, laissez, & souffrez, vous & nser pleinement & paisiblement le dit Des Cartes, faisant cesser tous troubles & empeschemens contraires. Et d'autant que de ces presentes on pourroit avoir effrayé en plusieurs lieux; Nous voulons qu'au vidimus & extrait d'icelles deviennt collationné par un de nos amez, & feaux Conseillers & Secretaires sey soit adjoinct comme au present original. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 11111 Jour de May mil six cens trente sept, & de nostre regne le vingtiesme.

Par le Roy en son conseil

Ceberet.

Kasellé du grand feu de cire jonne sur  
simple queue.

## E L I S A B E T H A E,

F R E D E R I C I B O H E M I A E R E G I S,

C o m i t i s P a l a t i n i , &amp; E l e c t o r i s S a c r i R o m a n i

I m p e r i i , F i l i z n a t u m a x i m z .



S E R E N I S S I M A P R I N C E P S ,

*Maximum fructum percepi scriptorum, quæ antehac in lucem edidi, quòd ea perlegere dignata sis; quodque eorum occasione in notitiam tuam admissus, tales dotes tuas esse cognoverim, ut è re gentis humanæ esse putem, eas seculis in exemplum proponi. Non deceret me vel adulari, vel aliquid non satis perspectum affirmare, præsertim hoc in loco, in quo veritatis fundamenta jacere conaturus sum; & scio, non affectatum ac simplex Philosophi judicium generosæ modestiæ tuæ gratius fore, quàm magis exornatas blandiorum hominum laudationes. Quapropter ea tan-*

tum scribam, quæ vera esse, ratione vel experientia cognosco, & hic in exordio eodem modo, ac in toto reliquo libro, philosophabor. Magnum est discrimen inter veras & apparentes virtutes; nec non etiam ex veris inter illas quæ ab accuratâ rerum cognitione deveniunt, & illas quæ cum aliquâ ignorantia conjunctæ sunt. Per apparentes intelligo vitia quædam non valde frequentia, vitiis aliis notioribus opposita; quæ quoniam ab iis magis distant quàm intermedia virtutes, idcirco magis solent celebrari. Sic quia plures inveniuntur qui pericula timidè refugiunt, quàm qui se inconsideratè in ipsa conjiciant, vitio timiditatis temeritas tanquam virtus opponitur, & magis quàm vera fortitudo vulgo æstimatur; sic sæpe prodigi pluris sunt quàm liberales; sicque nulli faciliùs ad magnam pietatis famam perveniunt, quàm superstitiosi vel hypocrite. Inter veras autem virtutes multæ non à sola recti cognitione, sed etiam ab errore aliquo nascuntur: sic sæpe à simplicitate bonitas, à metu pietas,

à de-

à desperatione fortitudo exsurgit. Atque hæc ab invicem diversæ sunt, ut etiam diversis nominibus designantur: sed illæ puræ & sinceræ quæ ex sola recti cognitione profluunt, unam & eandem omnes habent naturam, & sub uno sapientiæ nomine continentur. Quisquis enim firmam & efficacem habet voluntatem rectè semper utendi suâ ratione quantum in se est, idque omne quod optimum esse cognoscit exsequendi, revera sapiens est quantum ex naturâ suâ esse potest; & per hoc unum justitiam, fortitudinem, temperantiam, reliquasque omnes virtutes habet, sed ita inter se conjungit, ut nullæ supra cæteras emineant: & idcirco, quamvis multò sint præstantiores iis quæ aliqua vitiorum mixtura distinctæ sunt, quia tamen multitudini minùs sunt notæ, non tantis laudibus solent extolli. Præterea cum duo ad sapientiam ita descriptam requirantur, perceptio scilicet intellectûs & propensio voluntatis; ejus quidem quod à voluntate dependet nemo non est capax, sed quidam

aliis multò perspicaciorem habent intellectum. Et  
 quamvis sufficere debeat iis qui sunt naturà tar-  
 diusculi, quòd, et si multa ignorent, modò tamen fir-  
 mam & constantem retineant voluntatem nihil  
 omittendi, quo ad recti cognitionem perveniant,  
 atque id omne quod rectum judicabunt exsequen-  
 di, pro modulo suo sapientes & hoc nomine Deo  
 gratissimi esse possint: multo tamen præstantiores  
 illi sunt, in quibus, cum firmissimà rectè agendi vo-  
 luntate, perspicacissimum ingenium & summa  
 veritatis cognoscendæ cura reperitur. Summam  
 autem esse in Celsitudine tuà istam curam, ex eo  
 perspicuum est, quòd nec aulæ avocamenta, nec  
 consueta educatio, quæ puellas ad ignorantiam da-  
 mnare solet, impedire potuerint, quominus omnes  
 bonas artes & scientias investigaris. Deinde sum-  
 ma etiam & incomparabilis ingenii tui perspicaci-  
 tas ex eo apparet, quòd omnia istarum scientiarum  
 arcana penitissimè inspexeris, ac brevissimo tem-  
 pore accuratè cognoveris. Majusque adhuc ejus-  
 dem

## D E D I C A T O R I A .

*tem rei habeo argumentum mihi peculiare , quòd  
 : unam hactenus irvenerim, quæ Tractatus ante-  
 ac à me vulgatos perfectè omnes intelligas. Obscu-  
 rissimi enim plerisque aliis , etiam maxime inge-  
 iosis, & doctis, esse videntur ; & ferè omnibus  
 sicvenit ut, si versati sint in Metaphysicis, à Geo-  
 metricis abhorreant ; si verò Geometriam excolue-  
 rint , quæ de primâ Philosophiâ scripsi non ca-  
 riant : solum agnosco ingenium tuum ; cui omnia  
 què perspicua sunt , & quod meritò idcirco in-  
 comparabile appello. Cunque considero , tun va-  
 iam & perfectam rerum omnium cognitionem  
 esse in aliquo Gymnosophista jam sene , qui  
 ultos annos ad contemplandum habuerit ; sed in  
 Principe puellâ , quæ formâ & etate non cæsiat  
 Anervam , aut aliquam ex Musis , sed potiùs  
 baritem refert ; non possum in summam admi-  
 rationem non rapi. Denique non tantùm ex parte  
 gnitionis , sed etiam ex parte voluntatis, nihil ad  
 solutam & sublimen sapientiam requiri , quod*

EPIST. DEDICATOR.

*non in moribus tuis eluceat, animadverto. Apparet enim in illis eximia quædam cum majestate benignitas & mansuetudo, perpetuis fortune injuriis laceffita, sed nunquam efferata nec fracta. Hæcque ita me sibi devinxit, ut non modò Philosophiam hanc meam Sapientiæ, quam in Te suspicio, dicandam & consecrandam putem; (quia nempe ipsa nihil aliud est quàm studium Sapientiæ,) sed etiam non magis Philosophus audire velim, quàm*

Serenissimæ Celsitudinis tuæ

Devotissimus cultor

DES-CARTES.

EPI.



PRINCIPIORVM  
PHILOSOPHIÆ

Interpretem Gallicum.

*Qua hic PRÆFATIONIS loco esse potest.*

Deo polita & perfecta est Principiorum meorum versio, in qua adornanda desudare non te piguit, ut merito sperem, à pluribus ea Gallice quam Latine lectum & intellectum iri. Vereor solummodo, ne titulus offendat quamplurimos ex iis qui literis innutriti non sunt, aut apud quos Philosophia male audit, quoniam ea quam edocti sunt animo ipsorum non satisfecit; hancque ob causam mihi persuado, utile fore, Præfationem adjungi, quæ tibi significet quænam sit hujus Libri *materia*, quemque in tribendo *scopum* mihi proposuerim, & quid *utilitatis* hauriri ex eo possit. Verum quamvis hæc præfari meum esset, utpote: qui istorum omnium magis gnarus esse debeam quam quisquam alius, nihilominus id à me impetrare nequeo. Solummodo compendiose proponam præcipua capita quæ in præfatione ista tractanda esse censerem, prudentiæ tuæ committens ea quæ ex te fore judicaveris publico impertiri.

Primo explicare illic voluisssem quid sit Philosophia, inimum faciendo à rebus maxime obviis; cujusmodi sunt, Philosophiæ voce Sapientiæ studium denotari, & per Sapientiam non solum prudentiam in rebus agendis intelligi, verum etiam perfectam omnium earum rerum quas homo novisse potest scientiam, quæ & vitæ ipsius regula sit, & valetudini conservandæ, artibusque omnibus inveniendis inserviat; utque

\* \*

• hæc

hæc scientia talia præstet, necessarium esse ut ex primis causis deducatur, ita ut ei qui hanc acquirere studet (quod proprie Philosophari vocatur) inchoandum sit ab investigatione primarum istarum causarum, quæ Principia vocantur; Atque horum Principiorum *duo esse requisita: primo*, ut tam clara sint & evidentia, ut mens humana dum ea attentè considerat de illorum veritate dubitare non possit; *secundo*, ut aliarum rerum cognitio ab iis ita dependeat, ut cognosci quidem illa possint non cognitis istis, sed istæ non vicissim absque illis; hoc vero peracto in id incumbendum esse ut notitia rerum ex principiis hisce à quibus dependent ita deducatur, ut nihil in tota deductionum serie inveniatur quod non sit manifestissimum. Solus sane Deus perfecte Sapiens est, perfecta omnium rerum notitia præditus: sed tamen homines magis aut minus sapientes dici possunt prout de rebus maxime momentosis plures paucioresve veritates cognoscunt. Et in hisce nihil esse confido in quo omnes Eruditi non consentiant.

Deinde considerandam proposuisssem Philosophiæ hujus utilitatem, simulque demonstrassem credi oportere, eam (quandoquidem se extendit ad omnia quæ mens humana scire potest) solam esse quæ nos à feris hominibus & barbaris distinguat, & unamquamque gentem eo magis civilem & cultam esse quanto melius ibi philosophentur homines; ac proinde majus in Republ. bonum dari non posse quam si in eadem veri reperiantur Philosophi. Præterea, singulis hominibus non solum utile esse eorum familiaritate uti qui ad illud studium animam applicant, verum longe melius facere eos qui semet ipsos illi addicant: quemadmodum proculdubio præstat propriis uti oculis ad gressus suos dirigendum, atque eorundem etiam beneficio pulchritudinè colorum lucisque fruendum, quam clausos eos habere & alterius ductum sequi; quod posterius tamen melius est quam clausos eos tenere, omnique alio dace destitui. Illi autem revera clausos habent oculos, & de iis aperiendis non cogitant, qui absque Philosophiæ

hiz studio vitam traducunt: & voluptas quam percipimus  
intuitu rerum quas oculi cernunt, minime æquiparanda  
est cum illa quam adfert notitia illarum quas philosophando  
invenimus: & denique hoc studium ad mores nostros for-  
mandos vitamque componendam magis necessarium est  
quam oculorum usus ad gressus dirigendos. Bruta animantia  
vibus præter corpus nihil est quod conservent, hoc unum  
continenter agunt ut alimentum illi inveniant; hominum ve-  
ro quorum præcipua pars mens est, prima cura esse debet ut  
sapientiam quærent, quæ verum est illius nutrimentum: atque  
iam certo mihi persuadeo quamplurimos hac in parte sibi  
non defuturos, si id ipsum satis feliciter cessurum sperarent,  
quantum in eo pollerent novissent. Nullus est quantumvis  
jectus & vilis animus, qui adeo sensuum objectis adhæreat,  
non quandoque ab iis se avertat ad desiderandum majus a-  
liud bonum, licet sæpe ignoret in quo illud consistat. Illi  
si maxime propitiam habent fortunam, qui sanitate, honore,  
vitiisque distillant, non minus quam alii hoc desiderio ten-  
tentur; imo mihi persuadeo, illos præ ceteris maxime ad bo-  
num aliquod majus & perfectius omnibus iis quæ possident  
helare. Hoc vero Summum Bonum, prout absque lumine  
rei sola ratione naturali consideratur, nihil aliud est quam  
agnitio veritatis per primas suas causas, hoc est, Sapientia;  
hujus studium Philosophia est. Quæ omnia cum verissima  
sunt, haud difficulter persuaderi possent, modo bene propo-  
rentur.

Verum cum huic persuasioni adversetur experientia, quæ  
endit, eos qui Philosophiam profitentur ut plurimum esse  
non sapientes, & ratione sua non tam recte uti quam alios  
si nunquam huic studio operam dederunt, breviter hoc in  
hoc explicare voluissim, in quo consistat omnis ea quam  
nunc habemus scientia, & ad quem usque Sapientie gradum  
eventum sit. Primus non nisi notiones continet, adeo luce  
propria claras ut absque meditatione acquiri possint. Secun-

duſ complectitur illud omne quod ſenſuum experientia nobis diſtat. Tertius illud quod conſuetudo cum aliis hominibus nos docet. Cui quarto loco addi poteſt lectio librorum, non quidem omnium, ſed eorum ſpeciatiſ qui conſcripti ſunt ab hominibus qui bonis nos præceptis imbuere poſſunt: Hæc enim eſt inſtar conſuetudinis quam cum illorum auctoribus habemus. Omniſque Sapientia quæ haberi ſolet, ſolis quatuor hiſce mediis acquiſita mihi videtur: Revelatio namque divina iis à me non accenſetur, cum non gradatiſ, ſed ſimul & ſemel ad fidem inſallibilem nos evehat. Fuerunt quidem omnibus ſæculis viri magni, qui quintum ad Sapientiam gradum quatuor illis longe ſublimiorem certioreſque acquirere ſunt conati; hoc unum videlicet agentes ut primas cauſas veraque principia inveſtigarent, ex quibus rationes eorum omnium quæ ſciri poſſunt deducerentur; Et qui in hoc operam collocarunt, Philoſophi ſpeciatiſ vocati ſunt. Nulli tamen hætenus, quod ſciam, propoſitum illud feliciter ſucceſſit. Primi & præcipui quorum habemus ſcripta, ſunt Plato & Ariſtoteles; inter quos non alia fuit differentia, niſi quod primus præceptoris ſui Socratis veſtigia ſecutus ingenuè conſeſſus ſit, ſe nihil adhuc certi invenire potuiſſe, & quæ probabilia ipſi videbantur, ſcribere fuerit contentus; hunc in finem principia quædam fingens per quæ aliarum rerum rationes reddere conabatur. Ariſtoteles vero minori ingenuitate uſus, quamvis per viginti annos Platonis diſcipulus fuiſſet, nec alia quam illius Principia habuiſſet, modum ea proponendi proſus immutavit, & ut vera ac recta ea obtuſiſ, quæ veriſimile eſt ipſum nunquam pro talibus habuiſſe. Viris autem hiſ duobus bonæ mentis & ſapientia quatuor præcedentibus mediis acquiſita ſatis erat, atque exinde magnam authoritatem naſti ſunt, ita ut poſteri opinionibus eorum acquieſcere quam meliores quærere maluerint. Præcipua autem quæ inter illorum diſcipulos vigit diſputatio hæc imprimis fuit, Vtrum de omnibus dubitandum, an verò aliqua  
pro

pro certis habenda essent. Atque hoc ipsum utroque in enormes errores præcipitavit. Quidam enim eorum qui pro dubitatione stabant, eandem etiam ad actiones vitæ extendebant, ita ut prudentiâ ad vitæ regimen necessariâ uti negligerent; alii vero qui certitudinem defendebant, à sensibus eam dependere supponentes, iis fidem prorsus adhibuerunt; adeo ut dicant, Epicurum contra omnes Astronomorum rationes ausum fuisse asseverare, Solem non majorem esse quam apparet. Error hic in plerisque disputationibus animadverti potest, quod cum veritas media sit inter duas opiniones quæ defenduntur, unusquisque tanto longius ab ea recedat quanto majori contradicendi studio tenetur. Verum error eorum qui dubitationi nimium indulgebant sectatores non habuit diu; aliorum vero emendatus quidem fuit aliquantulum, ubi sensus in quamplurimis nos fallere agnoverunt; sed radicitus (quod sciam) sublatus non fuit, ostendendo videlicet, non sensibus, sed intellectui soli res distincte percipienti certitudinem inesse; & dum eâ tantummodo præditi sumus notitiâ quæ quatuor primis Sapientiæ gradibus acquiritur, non esse quidem dubitandum de iis quæ vera videntur, quod ad actiones vitæ attinet; veruntamen pro tam certis habenda non esse, ut opinionem de iis conceptam deponere nolimus, ubi eo nos evidentia rationis adigit. Qua veritate vel ignoratâ, vel si qui eam agnoverunt neglectâ, plerique eorum qui posterioribus hisce seculis Philosophi esse voluerunt Aristotelem cæco impetu secuti sunt, sæpeque scriptorum ejus mentem corrumpentes, opiniones quam plurimas ipsi adscripserunt, quas non agnosceret pro suis, si in vitam rediret; Et qui cum secuti non sunt (in quorum numero fuerunt quam plurima præstantissima ingenia) nihilominus opinionibus ejus jam imbuti fuerant in juventute, quia eæ solæ in scholis docentur; adeoque illis præoccupatus fuit ipsorum animus ut ad verorum Principiorum notitiam pervenire non potuerint. Et quamvis omnes apud me in pretio sint, neque aliorum

odium incurrere velim illos carpendo, argumentum tamen aliquod assertionis meæ proferre possum, cui ut opinor nemo eorum refragabitur, eos videlicet omnes pro principio supposuisse aliquid quod ipsimet satis perfecte cognitum non habebant. Exempli gratia, Nullus est qui gravitatem corporibus terrestribus inesse non statuerit. Verum etiamsi experientia evidenter ostendat, corpora quæ gravia vocamus ad terræ centrum ferri, hoc ipso tamen non novimus quænam sit natura ejus quod gravitatis nomine venit, hoc est quæ sit causa vel principium quod descendere ea facit, idque nobis aliundè discendum est. Idem dici potest de vacuo & de atomis, & de calido & frigido, de sicco & humido, nec non de sale, sulphure, mercurio; & de omnibus ejusmodi rebus quas aliqui pro Principiis suis supposuerunt. Nullæ autem conclusiones ex Principio non evidenti deducæ evidentes esse possunt, etiamsi quàm evidentissime inde deducerentur. Vnde sequitur, nulla ratiocinia talibus Principiis innixa eos vel ad unius rei certam notitiam perducere, neque per consequens vel unum passum promovere potuisse in Sapientiæ investigatione: & si quid veri invenerunt, id non nisi ope aliquorum ex quatuor supradictis mediis fecerunt. Veruntamen honori quem unusquisque illorum sibi deberi forte existimat nihil detractum volo; hoc unum tantum in eorum qui literis operam non dederunt solatium dicere cogor, idem hîc usu venire quod in itinere faciendo, sicut enim viatores dum terga obvertunt loco ad quem tendunt, tanto longius ab illo recedunt quo diutius & velocius progrediuntur, adeo ut licet postea in veram viam reducantur, non tamen æque cito ac si quievisent ad destinatum locum pervenire possint; ita & illi qui falsis utuntur principiis, quo ea magis excolunt, majorique cum curâ varias consequentias inde deducunt, se bene philosophari existimantes, eo longius à veritatis & sapientiæ notitia abeunt. Vnde concludendum est, eos qui quam minimum didicerunt illorum omnium quæ hæctenus nomine

Philo-

Philosophiæ insigniri solent, ad veram percipiendam quam maxime esse idoneos.

Hiscæ bene demonstratis, *rationes* hîc proponerè voluissèm, quibus probaretur, illa ipsa Principia quæ in hoc libro proposui, esse vera illa Principia quibus ad altiorem istum Sapientiæ gradum (in quo summum humanæ vitæ bonum consistit) pervenitur; *duæque* ad istud probandum sufficiunt: quarum *Prima* est, ea maxime clara esse; *Secunda*, ex ijs omnia alia deduci posse: cum præter has duas conditiones nullæ aliæ in Principiis desiderentur. Ea autem valde clara esse, facile probo. *Primo* ex modo quo illa inveni; rejiciendo scilicet ea omnia in quibus minima dubitandi occasio occurrere mihi poterat: nam certum est, ea quæ hoc pacto rejici non poterunt, cum attente considerarentur, omnium eorum quæ mens humana novisse potest evidentissima & clarissima esse. Sic, considerando, eam qui dubitare studet de omnibus, non posse tamen dubitare quin ipsemet existat dum dubitat; atque illud quod ita ratiocinatur, & dubitare non potest de se ipso, licet de reliquis omnibus dubitet, non id esse quod corpus nostrum dicimus, sed quod animam seu cogitationem nostram vocamus; existentiam hujus cogitationis assumpsi pro primo Principio, ex quo sequentia quam evidentissime deduxi; videlicet Deum esse qui auctor sit eorum omnium quæ in mundo reperiuntur, quique cum fons sit omnis veritatis, intellectum nostrum ejus naturæ non creatit ut decipi possit in judiciis quæ facit de rebus quas clarissime & distinctissime percipit. Hæc omnia mea Principia sunt quibus in rebus immaterialibus sive Metaphysicis utor; ex quibus rerum corporearum seu Physicarum Principia quam clarissime deduco, scilicet dari corpora in longum, latum & profundum extensa, variis figuris prædita, & quæ diversimode moveantur. Habes hîc summatim omnia Principia ex quibus veritatem aliarum rerum deduco. *Alter*a ratio quæ Principiorum evidentiam probat hæc est; Illa omni tempore cognita,

gnita, quin imo pro veris & indubitatis à cunctis hominibus habita fuisse, solâ Dei existentia exceptâ, quam aliqui in dubium revocarunt, quia sensuum perceptionibus nimium tribuebant, & Deus nec videri nec tangi potest.

Verum etiamsi omnes illæ veritates quas pro Principiis meis habeo, semper & ab omnibus cognitæ fuerint, nemo tamen quod sciam hætenus fuit qui pro Philosophiæ Principiis eas habuerit, id est, qui agnoverit, omnium aliarum rerum quæ in mundo sunt notitiam ex iis deduci posse. Quapropter probandum mihi hîc restat, ea talia esse: quod non melius præstare posse videor, quam si illud experientia probavero, invitando scilicet lectores ad Libri hujus lectionem. Nam quamvis in eo de omnibus rebus non egerim, illudque impossibile sit, omnes tamen eas de quibus dicendi occasionem habui ita me explicasse existimo, ut qui illum cum attentione legent, rationem habituri sint sibi persuadendi non opus esse alia Principia quærere, quam ea quæ tradidi, ut ad altissimas quasque notitias quarum mens humana est capax perveniantur. Præcipue vero si scriptis meis perlectis considerare non dedignentur quam variæ quæstiones explicatæ illic fuerint, atque ea etiam quæ ab aliis tradita sunt percurrentes animadvertant quam parum verisimiles rationes dari potuerint ad easdem quæstiones per Principia à meis diversa explicandum. Quod ut lubentius aggrediantur, dicere potuissem, eos qui opinionibus meis sunt imbuti, multo minori cum negotio aliorum scripta intelligere, eorumque verum pretium æstimare, quam qui imbuti illis non sunt: potius contra, ut supra dixi, quam accidit illis qui ab antiqua Philosophia initium fecerunt, eos videlicet quo plus in eâ desudarunt, tanto solere ad verum petciendum ineptiores esse.

De ratione Librum hunc legendi consilium etiam aliquod breviter adjunxissem, hæc videlicet, me velle ut uno quasi spiritu totus evolvatur, haud secus ac si fabula quæpiam esset, attentionem suam non fatigando, nec difficultatibus quæ forte



forte occurrent inhærendo ; sed eum tantum in finem , ut confuse & summatim sciatur quænam illa sint de quibus tractavi ; ut postea , si lectori digna videantur accuratori examine , atque desiderio teneatur causas eorum cognoscendi , secundo eum legat ad rationum mearum concatenationem observandum ; ita tamen ut si ubique non eam satis percipiat , aut rationes omnes non intelligat , tum animum non despondeat , sed loca solummodo quæ scrupulum movent subductâ lineolâ notet , atque in libri lectione ad finem usque sine interruptione perseveret. denique si librum tertio resumere non gravetur : sic enim plerarumque difficultatum antea annotatarum solutionem in eodem repertum iri , & si quæ adhuc supersint , relegendo tandem exemplum iri confido.

Ingenia humana examinans observavi , vix ulla adeo obtusa & tarda dari , quin idonea sint non modo ad bonas opiniones percipiendum , verum etiam ad altissimas quasque scientias addiscendum , modo via convenienti ducantur. Et hoc ipsum ratione etiam probari potest. Nam cum Principia clara sint , & ex iis nil nisi per evidentissima ratiocinia deduci debeat , nemo adeo ingenio destitutus est quin satis ei supersit ad ea quæ inde dependent intelligenda. Verum præter impedimenta præjudiciorum , à quibus nemo prorsus est immunis , licet illis qui malis scientiis majorem operam dederunt , plus detrimenti adferant , fere semper contingit ut qui moderatiore ingenio sunt præditi , de capacitate sua desperantes studiis incumbere negligant , alii vero magis frequentes nimium festinent , & sæpe principia admittant quæ evidèntia non sunt , aut incertas consequentiâs ex iis deducant. Quocirca eos qui viribus suis plus æquo diffidunt , certiores reddere vellem , nihil esse in meis scriptis quod non perfecte intelligere possint , si modo laborem ea examinandi non refugiant ; simulque alios monere , etiam præstantissimis ingeniis longo tempore & summâ attentione opus esse ad omnia quæ scriptis meis comprehendere volui observanda.

\*\*\*

Post-

Postea ut scopus quem in iis evulgandis habui recte perci-  
piatur, ordinem hęc explicare voluissim qui ad semet ipsum  
erudiendum observandus mihi videtur. Primo is qui non ni-  
si vulgarem & imperfectam illam noticiam habet quę qua-  
tuor supradictis mediis acquiri potest, ante omnia inesse de-  
bet ut Ethicam aliquam sibi fingat quę vitę suę regula sit,  
tum quia moram hoc non patitur, tum quia prima hęc cura  
esse debet, ut bene vivamus. Deinde Logicę operam dare  
debet, non illi quę in Scholis docetur: ea enim si proprie lo-  
quamur non nisi Dialectica quędam est, quę modum docet  
ea quę jam scimus aliis exponendi, vel etiam de iis quę nesci-  
mus multum sine iudicio loquendi; quo pacto bonam men-  
tem magis corrumpit quam auget; verum illi quę docet recte  
regere rationem ad acquirendum cognitionem veritatum  
quas ignoramus; quę quia ab exercitatione maxime pendet,  
consultum est ut ad ejus regulas in usum referendas diu se in  
facilibus simplicibusque quęstionibus, cujusmodi sunt Ma-  
thematicę, exercent. Et postquam in veritate harum quę-  
stionum detegenda facilitatem aliquam sibi acquisivit, serio  
applicare se debet verę Philosophię, cujus prima pars Meta-  
physica est, ubi continentur Principia cognitionis, inter quę  
occurrit explicatio præcipuorum Dei attributorum, imma-  
tentialitatis animarum nostrarum, nec non omnium clararum  
& simplicium notionum quę in nobis reperiuntur.

Altera pars est Physica, in qua inventis veris rerum mate-  
rialium Principiis, generatim examinatur quomodo totum  
Universum sit compositum, deinde speciatim quęnam sit  
natura hujus terrę, omniumque corporum quę ut plurimum  
circa eam inveniri solent, ut aëris, aquę, ignis, magnetis, &  
aliorum mineralium. Deinceps quoque singulatim naturam  
plantarum, animalium, & præcipue hominis examinare de-  
bet, ut ad alias scientias inveniendas quę utiles sibi sunt ido-  
neus reddatur. Tota igitur Philosophia veluti arbor est, cu-  
jus radices Metaphysica, truncus Physica, & rami ex eodem  
pullu-

pullulantes omnes aliæ Scientiæ sunt, quæ ad tres præcipuas revocantur, Medicinam scilicet, Mechanicam, atque Ethicam; altissimam autem & perfectissimam morum disciplinam intelligo, quæ integram aliarum scientiarum cognitionem præsupponens, ultimus ac summus Sapientiæ gradus est.

Iam vero quemadmodum neque ex radicibus neque ex arborum trunco fructus colliguntur, sed ex ramorum extremitate tantum; ita præcipua Philosophiæ utilitas ab iis partibus pendet quæ non nisi ultimo loco addisci possunt. Quamvis autem eas pene omnes ignorem, zelus tamen quo bonum publicum promovere semper sum conatus me movit ut ante annos decem aut duodecim *Specimina* quædam eorum quæ didicisse mihi videbar typis mandari curarem. Prima in illorum Speciminum pars *Dissertatio* fuit de *Methodo* recte regendi rationem, & veritatem in scientiis investigandi; ubi *Logicæ* præcipuas regulas breviter tradidi, nec non *Ethicæ* cujusdam imperfectæ, quam dum meliorem quispiam non habet ad tempus sequi licet. Reliquæ partes tres tractatus continebant, unum de *Dioptrica*, alterum de *Meteoris*, & ultimum de *Geometria*. In *Dioptrica* propositum mihi fuit demonstrare, satis longe nos progredi posse in Philosophia ut illius ope ad notitiam artium in vita utilium perveniamus, cum telescopiorum inventio quam illic explicui una sit ex difficillimis quæ unquam quæsitæ fuerunt. Per tractatum de *Meteoris* notum facere volui quantum Philosophia quam ego excolo distet ab ea quæ docetur in Scholis, ubi de eodem etiam argumento tractari solet. Denique per tractatum de *Geometria* volui demonstrare me quamplurima hætenus incognita invenisse, atque ita occasionem præbere credendi, multa adhuc alia inveniri posse, ut omnes hoc pacto ad veritatis investigationem incitarentur. Postea difficultatem prævidens quam multi in fundamentis *Metaphysicæ* percipiendis haberent, præcipua ejus capita explicare conatus fui in

libro *Meditationum*. qui quidem magnus non est, verum moles ejus excrevit, & ea quæ in illo tractavi multum lucis acceperunt ab Objectionibus quas diversi doctrina excellentes viri hac occasione ad me miserunt, & à meis ad illas Respon- sionibus. Tandem postquam lectorum animus per præcedentes hosce tractatus satis præparatus mihi vilos est ad *Principia Philosophiæ* intelligenda, ea quoque in lucem edidi, atque hunc librum in quatuor partes divisi, quarum prima cognitionis humanæ Principia continet, & hæc est quæ Prima Philosophia aut etiam Metaphysica dici potest; ideoque ut illa recte intelligatur, lectionem *Meditationum*, quas de eodem argumento conscripsi, præmittere utile est. Tres aliz partes id omne continent quod in Physica maxime generale est; cujusmodi sunt explicatio primarum legum aut Principiorum Naturæ; & modus quo Cæli, Stellæ fixæ, Planetæ, Cometæ, & generatim totum hoc universum composita sunt; deinde speciatim natura hujus terræ, aëris, aquæ, ignis, magnetis, quæ corpora ubique circa terram maxime obvia esse solent, & omnium qualitarum quas in corporibus hisce deprehendimus, quales sunt lux, calor, gravitas, similesque. Qua ratione me universæ Philosophiæ explicationem inchoasse existimo tali ordine, ut nihil eorum omiserim quæ ea de quibus ultimo loco scripsi præcedere debebant. Verum ad hoc opus ad finem suum perducendum, postea naturam corporum magis particularium quæ in terra sunt, mineralium scilicet, plantarum, animalium, & præcipue hominis, eodem modo singulatim explicare deberem; tandem denique Medicina, Ethica, artesque Mechanicæ accurate tractandæ essent. Hoc mihi agendum restaret ut integrum Philosophiæ corpus humano generi darem: non adeo autem me ætate provecum esse sentio, nec tantum viribus meis diffido; neque à cognitione ejus quod desideratur tam longe me abesse video, quin accingere me auderem ad opus illud perficiendum, modo oportunitas mihi esset omnia experi-  
menta

menta faciendi quibus ad ratiocinia mea fulcienda & comprobanda indigerem. Verum animadvertens, hoc ipsum magnos requirere sumptus, quibus privatus, qualis Ego sum, nisi à publico adjuvaretur, par esse non posset, nec esse cur istiusmodi subsidium expectem, credo, in posterum satis mihi esse debere si privatæ mei ipsius institutioni tantum studeam, posteritatemque excusatum me habituram, si deinceps nullis amplius in ejus gratiam me laboribus fatigem.

Interim ut appareat qua in re me ipsi jam inserviisse existimem, dicam hoc loco quos fructus ex Principiis meis colligi posse mihi persuadeam. Primus est voluptas qua afficitur qui multas veritates hæcenus incognitas illic inveniet. nam quamvis veritas imaginationem nostram sæpe non adeo afficiat quam falsitates & figmenta, quia minus admitanda & magis simplex apparet, gaudium tamen quod adfert durabilius & solidius est. Secundus fructus est, Principia hæc recollendo paulatim nos rectius de rebus quibuscunque obviis judicare, atque ita sapientiores evadere assuefacturos: qui fructus prorsus contrarius erit ei quem producit Philosophia vulgaris. Facile enim observatu est in Magistris, ipsos per eam rectæ rationis minus reddi capaces, quam forent si eam nunquam attigissent. Tertius est, cum veritates quas continent evidentissimæ & certissimæ sint, omnem eas disputandi materiam è medio sublaturas, atque ita animos ad mansuetudinem & concordiam disposituras; contra quam faciant scholarum controversiæ, quæ illos qui se in iis exercuerunt sensim & sine sensu magis rixosos ac pertinaces reddentes, prima forte causa sunt hæresium & dissensionum quibus mundus etiamnum vexatur. Ultimus & præcipuus horum Principiorum fructus est, ea excolendo quam plurimas veritates quas ipse non explicui detegi, atque ita paulatim ab his ad illas progrediendo ad perfectam totius Philosophiæ cognitionem summumque Sapientiæ gradum cum tempore perveniri posse. Nam veluti in cunctis artibus videmus, eas,

licet initio rudes & imperfectæ sint, quia tamen continent aliquid veri, & cujus effectum experientia probat, usu paulatim perfici: sic quoque in Philolophia, cum vera Principia habemus, fieri non potest quin eorum ductu aliquando in alias veritates incidamus. Neque falsitas Principiorum Aristotelis melius probari potest quam dicendo, eorum ope per multa secula quibus in usu fuerunt nullum progressum in cognitione rerum fieri potuisse.

Non me latet quidem, esse homines quosdam ingenii ad eo præcipitis, & qui tam parum circumspecte in actionibus suis versentur, ut vel solidissimis fundamentis nihil certi superstruere valeant: & quia hi ad libros scribendos cæteris procliviores esse solent, brevi temporis spatio illud omne quod egi corrumpere, nec non incertitudinem & dubitationem introducere possent in meam philosophandi rationem (ex qua summa cum cura eas proscribere fui conatus) si eorum scripta tanquam mea vel tanquam opinionibus meis repleta reciperentur. Nuper expertus illud fui in aliquo eorum qui maxime me sequi velle credebantur, imo de quo alicubi scripseram, me tantum tribuere ejus ingenio, ut non putarem, ipsum alicui opinioni adhærere quam pro mea agnoscere nollem. Nam superiori anno librum sub titulo *Fundamentorum Physica* edidit, in quo etiam si nihil Physicam & Medicinam concernens scripsisse videatur, quod non desumerit ex scriptis meis in lucem edigis, & ex alio nondum perfecto *de natura animalium*, quod in manus ejus incidit; nihilominus quia male transcripsit, & ordinem mutavit, veritatesque quasdam Metaphysicas quibus tota Physica inniti debet negavit, cum profus repudiare cogor, lectoresque rogare, ne unquam opinionem aliquam mihi attribuant nisi expresse eam in scriptis meis invenerint; neque ullam sive in meis sive in aliorum scriptis pro vera recipiant, nisi ex veris principiis eam quam clarissime deductam esse viderint.

Scio etiam, multa effluere posse sæcula antequam ex hisce  
Prin-

Principiis omnes veritates deductæ fuerint quæ deduci inde possunt, quia eæ quæ inveniendæ restant, maximam partem dependent à particularibus quibusdam experimentis, quæ nunquam casu se offerent, verum ab hominibus sagacissimis cum cura & sumptu indagari debent; deinde quia haud facile continget ut illi ipsi qui iis probe uti novissent ea etiam faciendi facultatem sint habituri; atque etiam quia plerique eorum qui ingenio valent adeo sinistram de universa Philosophia conceperunt opinionem, ob errores quos in ea quæ hætenus in usu fuit adverterunt, ut ad meliorem investigandam animum applicare nequeant. Verum, si tandem differentia quam inter mea & omnium aliorum Principia deprehensuri sunt, nec non ingens series veritatum quæ deduci inde possunt, ipsis persuadeat quanti momenti sit, in earum veritatum inquisitione perseverare, ad quam altum Sapientiæ gradum, ad quantam vitæ perfectionem, ad quantam felicitatem perducere nos queant, ausim credere, neminem fore qui non allaboret tam utili se studio tradere, aut saltem qui non faveat, totisque viribus velit juvare eos qui illi cum fructu operam dabunt.

Hæc meorum votorum summa est, ut Nepotes nostri tandem aliquando felicem ejus videant eventum, &c.

INDEX  
PRINCIPIORUM  
PHILOSOPHIÆ.

P A R S P R I M A .

De principiis cognitionis humanæ.

1. **V**eritatem inquirenti, semel in vita de omnibus, quantum fieri potest, esse dubitandum. Pag. 1
2. Dubia etiam pro falsis habenda. *ibid.*
3. Hanc interim dubitationem ad usum vite non esse referendam. *ibid.*
4. Cur possimus dubitare de rebus sensibilibus. *ibid.*
5. Cur etiam de Mathematicis demonstrationibus. *ibid.*
6. Nos habere liberum arbitrium, ad cohibendum assensum in dubiis, sicque ad errorem vitandum. 2
7. Non posse à nobis dubitari, quin existamus dum dubitamus; atque hoc esse primum ordine quod philosophando cognoscimus. *ibid.*
8. Distinctionem inter animam & corpus, sive inter rem cogitantem & corpoream hinc agnoscere. *ibid.*
9. Quid sit cogitatio. *ibid.*
10. Quæ simplicissima sunt & per se nota, definitionibus Logicis obscuriora reddi; & talia inter cognitiones studio acquisitas non esse numeranda. 3
11. Quomodo mens nostra notior sit quam corpus. *ibid.*
12. Cur con omnibus aque immoretur. *ibid.*
13. Quo sensu reliquarum rerum cognitio à Dei cognitione dependeat. *ibid.*
14. Ex eo quod existentia necessaria in nostro de Deo conceptu continetur, recte concludi, Deum existere. 4
15. Non eodem modo in aliarum rerum conceptibus existentiam necessariam, sed contingentem dumtaxat contineri. *ibid.*
16. Præiudicia impedire, quo minus ista necessitas existentia Dei ab omnibus clare cognoscatur. *ibid.*
17. Quo cuiusque ex nostris ideis objectivæ perfectio maior est, eo ejus causam esse debere majorem. 5
18. Hinc rursus concludi, Deum existere. *ibid.*
19. Etsi Dei naturam non comprehendamus, ejus tamen perfectiones omni alia re clarioribus à nobis cognosci. *ibid.*
20. Nos non à nobis ipsi, sed à Deo factos, eumque proinde existere. 6
21. Existentia nostra durationem sufficere ad existentiam Dei demonstrandam. *ibid.*
22. Ex nostro modo existentiam Dei cognoscendi, omnia ejus attributa naturali ingenii vi cognoscibilia simul cognosci. *ibid.*
23. Deum non esse corporeum, nec sentire ut nos, nec velle malitiam peccati. *ibid.*
24. A Dei cognitione ad creatorarum cognitionem perveniri, recordando eum esse infinitum, & nos finitos. 7
25. Credenda esse omnia quæ à Deo revelata sunt, quamvis captum nostrum excedant. *ibid.*
26. Nunquam disputandum esse de infinito; sed tantum ea in quibus nullos fines advertimus, qualia sunt extensio mundi, divisibilitas partium materia, numerus stella-



- stellarum, &c. pro indefinitis habenda. ib.*
27. *Qua differentia sit inter indefinitum & infinitum. 8*
28. *Non causas finales rerum creaturarum, sed efficientes esse examinandas. ibid.*
29. *Deum non esse errorum causam. ibid.*
30. *Hinc sequi, omnia qua clare perceptimus, vera esse, ac tolli dubitationes ante recensitas. ibid.*
31. *Errores nostros, si ad Deum referantur, esse tantum negationes; si ad nos, privationes. 9*
32. *Duos tantum in nobis esse modos cogitandi, perceptionem scilicet intellectus, & operationem voluntatis. ibid.*
33. *Nos non errare, nisi cum de re non satis percepta iudicamus. ibid.*
34. *Non solum intellectum, sed etiam voluntatem requiri ad iudicandum. ibid.*
35. *Hanc illo latius patere, errorumque causam inde esse. ibid.*
36. *Errores nostros Deo imputari non posse. ibid.*
37. *Summam esse hominis perfectionem quod agat libere, sive per voluntatem, & per hoc laude vel vituperio dignum reddi. 10*
38. *Esse defectum in nostra actione, non in nostra natura, quod erremus; Et saepe subditorum culpas aliis dominis, nunquam autem Deo, tribui posse. ibid.*
39. *Libertatem arbitrii esse per se notam. ibid.*
40. *Certum etiam, omnia esse à Deo praordina. 11*
41. *Quomodo arbitrii nostri libertas, & Dei praordinatio, sibi conciliantur. ibid.*
42. *Quomodo, quatenus nolimus falli, fallamur tamen per nostram voluntatem. ibid.*
43. *Nos nunquam falli, cum solis clare & distincte perceptis assentimus. ibid.*
44. *Nos semper male iudicare, cum assentimur non clare perceptis, etsi casu incidamus in veritatem; idque ex eo continere, quod supponamus, ea fuisse antea satis à nobis percepta. ibid.*
45. *Quid sit perceptio clara, quid distincta. 12*
46. *Exemplo doloris ascenditur, clarum esse posse perceptionem, etsi non sit distincta; non autem distinctam, nisi sit clara. ibid.*
47. *Ad prima atque præiudicia emendanda, simplices notiones esse considerandas. & quid in quaque sit clarum. ibid.*
48. *Omnia qua sub perceptionem nostram eadunt, spectari ut res rerumve affectiones, vel ut aternas veritates; & verum enumeratio. ibid.*
49. *Aternas veritates non posse ita numerari, sed nec esse opus. 13*
50. *Eas clare percipi, sed non omnes ab omnibus, propter præiudicia. ibid.*
51. *Quid sit substantia: & quod istud nomen Deo & creaturis non conveniat univoce. ibid.*
52. *Quod menti & corpori semivoce conveniat. & quomodo ipsa cognoscatur. 14*
53. *Cuiusque substantia unum esse principium attributum: ut mentis, cogitatio: corporis, extensio. ibid.*
54. *Quomodo claras & distinctas notiones habere possimus, substantia cogitantis, & corporea, stem Dei. ibid.*
55. *Quomodo duratio, ordo, numerus, etiam distincte intelligantur. 15*
56. *Quid sint modi, qualitates, attributa. ibid.*
57. *Quaedam attributa esse in rebus; alia in cogitatione. Et quid duratio & tempus. ibid.*
58. *Numerum & universalia omnia, esse tantum modos cogitandi. ibid.*
59. *Quomodo universalia fiant; & qua sint quinque vulgata; genus, species, differentia, proprium, accidens. 16*
60. *De distinctiombus, ac primo de reali. ibid.*
61. *De distinctione modali. 17*

\*\*\*

62. De

## De Principiis rerum materialium.

62. De distinctione rationis. *ibid.*
63. Quomodo cogitatio & extensio distincte cognosci possint, ut constituentes naturam mentis & corporis. 18
64. Quomodo etiam ut modi substantia. *ibid.*
65. Quomodo ipsarum modi sint etiam cognoscendi. *ibid.*
66. Quomodo sensus, affectus & appetitus, clare cognoscantur, quamvis saepe de eis male iudicemus. 19
67. In ipso de dolore iudicio saepe nes falli. *ibid.*
68. Quomodo in istis id, quod clare cognoscimus, ab eo in quo falli possumus, sit distinguendum. *ibid.*
69. Longe aliter cognosci magnitudinem, figuram, &c. quam colores, dolores, &c. 20
70. Nos posse duobus modis de sensibilibus iudicium ferre; quarum uno errorem praevidemus, alio in errorem incidimus. *ibid.*
71. Praecipuam errorum causam à prauidicis infantia procedere. *ibid.*
72. Alteram errorum causam esse, quod prauidiciorum obivisi nequeamus. 22
73. Tertiam causam esse, quod desatigemur ad ea, qua sensibus praesentia non sunt, attendendo: & ideo affectui firmus de illis non ex praesenti perceptione, sed ex praconcepta opinione iudicare. *ibid.*
74. Quartam causam esse, quod conceptus nostros verbis, qua rebus accurate non respondent, alligemus. *ibid.*
75. Summa eorum qua observanda sunt ad recte philosophandum. 23
76. Auctoritatem divinam perceptioni nostra esse praferendam: sed ea seclusa non decere Philosophum aliis quam perceptis assentiri. *ibid.*
1. Quibus rationibus rerum materialium existentia certo cognoscatur. 24
2. Quibus etiam cognoscatur, corpus humanum menti esse arte conjunction. *ibid.*
3. Sensuum perceptiones, non quid revera sit in rebus; sed quid humano composito profuit vel obstat, docere. 25
4. Naturam corporis non in pondere, duritie, colore, aut similibus; sed in sola extensione, consistere. *ibid.*
5. Prauidicia de rarefactione, & de vacuo, hanc corporis naturam obscuriorem facere. *ibid.*
6. Quomodo fiat rarefactio. 26
7. Eam non posse ullo alio modo intelligibili explicari. *ibid.*
8. Quantitatem & numerum differre tantum ratione à re quanta & numerata. *ibid.*
9. Substantiam corpoream, cum à quantitate sua distinguitur, confuse concipi tanquam incorpoream. 27
10. Quid sit spatium, sive locus internus. *ibid.*
11. Quomodo in re non differat à substantia corporea. *ibid.*
12. Quomodo ab eadem differat in modo, quo concipitur. 28
13. Quid sit locus externus. *ibid.*
14. In quo differant locus & spatium. 29
15. Quomodo locus externus pro superficie corporis ambientis recte sumatur. *ibid.*
16. Repugnare ut deur vacuum, sive in quo nulla plane sit res. *ibid.*
17. Vacuum ex vulgi usu non excludere omne corpus. 30
18. Quo-

18. *Quomodo emendandum sit præiudicium de vacuo absolute sumo.* ibid.
19. *Ex his ea confirmari, qua de rarefactione dicta sunt.* 31
20. *Ex his etiam demonstrari, nullas atomos dari posse.* ibid.
21. *Item mundum esse indefinite extensum.* ibid.
22. *Item unam & eandem esse materiam cæli & terra; ac plures mundos esse non posse.* 32
23. *Omnem materia variationem, sive omnem ejus formarum diversitatem pendere à motu.* ibid.
24. *Quid sit motus juxta vulgarem sensum.* ibid.
25. *Quid sit motus proprie sumtus.* ibid.
26. *Non plus actionis requari ad motum, quam ad quietem.* 33
27. *Motum & quietem esse tantum diversos modos corporis moti.* ibid.
28. *Motum proprie sumtum non referri, nisi ad corpora contigua ejus quod movetur.* ibid.
29. *Nec referri, nisi ad ea corpora contigua, qua tanquam quiescentia spectantur.* 34
30. *Cur ex duobus corporibus contiguis qua separantur ab invicem, unum potius quam aliud moveri dicatur.* ibid.
31. *Quomodo in eodem corpore innumerari diversi motus esse possint.* 35
32. *Quomodo etiam motus proprie sumtus, qui in quoque corpore unicus est, pro pluribus sumi possit.* ibid.
33. *Quomodo in omni motu integer circulus corporum simul moveatur.* 36
34. *Hinc sequi divisionem materia in particulas revera indefinitas, quamvis ea nobis sint incomprehensibiles.* 37
35. *Quomodo fiat ista divisio; & quod non sit dubitandum quin fiat, etsi non comprehendatur.* ibid.
36. *Deum esse primariam motus causam; & eandem semper motui quantitatem in universo conservare.* ibid.
37. *Prima lex natura: quod unaquaque res quantum in se est, semper in eodem statu perseveret; si que quod semel movetur, semper moveri pergat.* 38
38. *De motu projectorum.* 39
39. *Altera lex natura: quod omnis motus ex se ipso sit rectus; & ideo qua circulariter moventur, tendere semper, ut recedant à centro circuli quem describunt.* ibid.
40. *Tertia lex: quod unum corpus, alteri fortiori occurrendo, nihil amittat de suo motu; occurrendo vero minus forti, tantum amittere, quantum in illud transfert.* 40
41. *Probatio prioris partis hujus regula.* 41
42. *Probatio posterioris partis.* ibid.
43. *In quo consistat vis cujusque corporis ad agendum vel resistendum.* ibid.
44. *Motum non esse motui contrarium, sed quieti; & determinationem in unam partem determinationi in partem oppositam.* 42
45. *Quomodo possit determinari, quantum cujusque corporis motus mutetur propter aliorum corporum occursum; idque per regulas sequentes.* ibid.
46. *Prima.* ibid.
47. *Secunda.* ibid.
48. *Tertia.* ibid.
49. *Quarta.* 43
50. *Quinta.* ibid.
51. *Sexta.* ibid.
52. *Septima.* ibid.
53. *Harum regularum usum esse difficilem, propterea quod unumquodque corpus à multis simul tangatur.* 44
54. *Quæ sint corpora dura, qua fluida.* ibid.
55. *Duroorum partes nullo alio glutino simul jungi, quam earum quiete.* ibid.
56. *Fluidorum particulas aequali vi versus omnes partes moveri; Et corpus durum, in fluido existens, à minima vi posse determinari ad motum.* 45
57. *Ejusdem rei demonstratio.* 46
58. *Si qua fluidi particula tardius moveantur.* 46

- tur, quam corpus durum in eo existens, illud hac in parte fluidi rationem non habere. 49
59. Corpus durum, ab alio duro impulsum, non omnem suam motum ab eo mutuari, sed partem etiam à fluido circumjacente. ibid.
60. Non posse tamen ab isto fluido majorem celeritatem acquirere, quam habeat à duro, à quo impulsus est. ibid.
61. Cum corpus fluidum totum simul versus aliquam partem ferretur, necessario se-cum deferre corpus durum quod in se continet. 48
62. Dum corpus durum à fluido sic deferretur, non ideo morari. ibid.
63. Cur quaedam corpora tam dura sint, ut quamvis parva, non facile manibus nostris dividantur. ibid.
64. Non alia principia in Physica, quam in Geometria, vel in Mathesi abstracta à me admitti, nec optari, quia sic omnia natura phenomena explicantur, & certa deus demonstrationes dari possunt. 49
7. Fixas non posse supponi nimis remotas. ibid.
8. Terram à cælo conspectam non apparituram esse nisi in Planetas Iovæ aut Saturno minorem. ibid.
9. Solem & Fixas propria luce fulgere. 52
10. Lunam & alios Planetas lucem à Sole mutuari. ibid.
11. Terram ratione luminis à Planetis non differre. ibid.
12. Lunam, eum novæ est, à Terra illuminari. ibid.
13. Solem inter Fixas, & Terram inter Planetas posse numerari. ibid.
14. Fixas eandem semper à se mutuo distantiam retinere; non autem Planetas. 53
15. Eandem Planetarum apparentias per varias hypothèses posse explicari. ibid.
16. Hypothese[m] Ptolemaei apparentiis non satisfacere. ibid.
17. Hypotheses Copernici & Tycho[n]is non differre, in quantum hypothèses. ibid.
18. Tycho[n]em verbo minus, sed re plus motus Terra tribuere, quam Copernicium. ibid.
19. Me accuratius quam Copernicium; & verius quam Tycho[n]em, Terra motum negare. ibid.
20. Fixas supponendas esse à Saturno quam maxime distantes. 54
21. Solem instar flammæ, ex materia quidem valde mobili consistere, sed non ideo ex uno loco in alium migrare. ibid.
22. Solem à flammâ differre, quod non ita egeat alimento. ibid.
23. Fixas omnes in eadem sphaera non versari; sed unamquamque vastum spatium circa se habere, aliis fixis destitutum. 56
24. Cælos esse fluidos. ibid.
25. Cælos omnia corpora in se contenta secum deferre. ibid.
26. Terram in cælo suo quiescere, sed nihilominus ab eo ferri. ibid.
27. Idemque sentiendum esse de omnibus Planetis. 57
28. Terram, proprie loquendo, non moveri, nec

P R I N C I P I O R V M  
P H I L O S O P H I Æ

Pars Tertia.

De Mundo adspicibili.

1. **O**pera Dei nimis ampla cogitari non posse. 50
2. Cavendum esse, ne nimis superbe de nobis ipsi sentientes, fines quos Deus sibi proposuit in creando mundo, à nobis intelligi suspicemus. ibid.
3. Quo sensu dici possit, omnia propter hominem facta esse. ibid.
4. De phenomenon, sive experimentis; & quis eorum usus ad philosophandum. 51
5. Qua sit ratio distantia & magnitudinis inter Solem, Terram & Lunam. ibid.
6. Qua sit distantia reliquorum planetarum à Sole. ibid.
28. Terram, proprie loquendo, non moveri, nec

- nec ullos Planetas, quamvis à cælo transferantur. *ibid.*
29. Nullum etiam motum Terræ esse tribuendum, quamvis motus improprie iuxta usum vulgi sumatur; sed tunc recte dici, alios Planetas moveri. *ibid.*
30. Planetas omnes circa Solem à calo deferri. 58
31. Quomodo singuli Planeta deferantur. *ibid.*
32. Quomodo etiam Solis macula. 59
33. Quomodo etiam Terræ circa proprium centrum, & Luna circa terram vehantur. *ibid.*
34. Motus cælorum non esse perfecte circulares. 60
35. De aberratione Planetarum in latitudinem. *ibid.*
36. De motu in longitudinem. *ibid.*
37. Phenomena omnia per hanc hypothese simpliciter intelligi. 61
38. Iuxta Tychonis hypothese dicendum esse, Terram moveri circa proprium centrum. *ibid.*
39. Ac etiam illam moveri circa Solem motu annuo. *ibid.*
40. Terræ translationem nullam efficere ad spectus diversitatem in Fixis, propter maximam ipsorum distantiam. 62
41. Hanc etiam fixarum distantiam requiri ad motus Cometarum, quos jam constat esse in cælo. *ibid.*
42. Omnia qua hic in Terrâ videmus, ad phænomena etiam pertinere; sed non opus esse initio ad cuncta respicere. *ibid.*
43. Vix fieri posse quæ causis, ex quibus omnia phænomena clare deducuntur, sint vera. 63
44. Ne tamen eas, quas hic exponam, pro hypothese tantum habere velle. *ibid.*
45. Neque etiam hic nonnullas assumpturum, quas consistit falsas esse. *ibid.*
46. Quænam sint ea, qua hic assumo ad phænomena omnia explicanda. 65
47. Hæc suspitionum falsitatem non impetire, quo minus ea qua ex ipsis deducuntur, vera & certa esse possint. *ibid.*
48. Quomodo omnes cælestis materia particula facta sint spherica. 66
49. Circa istas particulas sphericas aliam esse debere materiam subtiliorem. *ibid.*
50. Hujus subtilioris materia particulas facillime dividit. 67
51. Facilem celerissime moveri. *ibid.*
52. Tria esse hujus mundi adspectabilis elementa. *ibid.*
53. Tres etiam in illo cælo distingui posse. *ibid.*
54. Quomodo Sol & fixa formata sint. 69
55. Quid sit lux. *ibid.*
56. Quis conatus ad motum in rebus inanibus sit intelligendus. *ibid.*
57. Quomodo in eodem corpore conatus ad diversos motus simul esse possint. *ibid.*
58. Quomodo ea, qua circulariter moventur, conentur recedere à centro sui motus. 70
59. Quanta sit vis istius conatus. 71
60. Hinc conatum reperiri in materia cælorum. 72
61. Ipsum efficere, ut corpora Solis & Fixarum sint rotanda. 73
62. Eundem efficere, ut materia cælestis ab omnibus punctis circumferentia cuiusque stella vel Solis recedere conetur. *ibid.*
63. Globulos materia cælestis se mutuo non impedire in isto conatu. 74
64. Omnes lucis proprietates in isto conatu inveniri: adeo ut lux ejus ope cerni possit tanquam ex stellis manans, etsi nulla vis esset in ipsis stellis. *ibid.*
65. Cuiusque vortices cælorum polos tangere partes aliorum vorticum ab eorum polo remotas. 75
66. Motus istorum vorticum aliquo modo inflecti, ut inter se consentiant. *ibid.*
67. Duorum vorticum polos se mutuo tangere non posse. 77
68. Vertices istius esse magnitudine inaequales. *ibid.*
69. Materiam primi elementi ex polo cuiusque

70. *Idem de materia secundi elementi non posse intelligi.* ibid.
71. *Qua sit ratio hujus diversitatis.* 81
72. *Quomodo moveatur materia, qua Solem componit.* ibid.
73. *Variis esse inaequalitates in situ corporis Solis.* 83
74. *Variis etiam esse in ejus materia motu.* 85
75. *Eas tamen non impedire, ne ejus figura sit rotunda.* ibid.
76. *De motu primi elementi dum versatur inter globulos secundi.* 87
77. *Quomodo Solis lumen non modo versus Eclipticam, sed etiam versus polos se diffundat.* ibid.
78. *Quomodo versus Eclipticam se diffundat.* ibid.
79. *Quam facile ad motum unius exigui corporis alia quam maxime ab eo remota moveantur.* 89
80. *Quomodo lumen Solis tendat versus polos.* ibid.
81. *An aequalis sit ejus vis in polis & in ecliptica.* ibid.
82. *Globulos secundi elementi Soli vicinos minores esse, ac celerius moveri quam remotiores, usque ad certam distantiam; ultra quam sunt omnes magnitudine aequales, & eo celerius moventur, quo sunt à Sole remotiores.* 91
83. *Cur remotissimi celerius moveantur quam aliquanto minus remoti.* ibid.
84. *Cur Solis proximi, celerius etiam ferantur, quam paulo remotiores.* 93
85. *Cur iidem Solis proximi, sint remotioribus minores.* 95
86. *Globulos secundi elementi variis modis simul moveri, quo sit ut plane sphaerici reddantur.* ibid.
87. *Variis esse gradus celeritatis in minutis primi elementi.* ibid.
88. *Eas ejus minutias qua minimum habent celeritatis, facile id ipsum quod habent aliis transferre, ac sibi mutuo auferere.* 96
89. *Tales minutias sibi mutuo auferentes praecipue inveniri in ea materia primi elementi, qua à polis ad centra vorticum fertur.* 97
90. *Qualis sit figura istarum minutiarum, qua particula striata deinceps vocantur.* ibid.
91. *Istas particulas ab oppositis polis venientes, contrario modo esse mortas.* ibid.
92. *Tres tantum strias in ipsis esse.* ibid.
93. *Inter particulas striatas, & omnium minutissimas, varias esse aliarum magnitudines in primo elemento.* 98
94. *Quomodo ex vis macula in Solis vel Stellarum superficie generentur.* 99
95. *Hinc cognosci praecipuas harum macularum proprietates.* ibid.
96. *Quomodo ista macula dissolvantur ac nova generentur.* ibid.
97. *Cur in quarundam extremitate colores iridis appareant.* 100
98. *Quomodo macula in faculis versantur; vel contra.* ibid.
99. *In quales particulas macula dissolvantur.* ibid.
100. *Quomodo ex ipsis aether circa Solem & stellis generetur. Huncque aetherem & istas maculas ad tertium elementum referri.* ibid.
101. *Macularum productionem & dissolutionem à causis valde incertis pendere.* 101
102. *Quomodo eadem macula totum aliquod solum tegere possit.* ibid.
103. *Cur Sol aliquando visus sit obscurior; & cur quarundam stellarum magnitudines apparentes mutantur.* ibid.
104. *Cur aliqua fixa disparcant, vel ex improviso appareant.* 102
105. *Multos esse meatus in maculis, per quos libere transeunt particula striata.* ibid.
106. *Qua sit dispositio istorum meatuum; & cur particula striata per illos retrogredi non possint.* ibid.

107. *Cur etiam qua veniunt ab uno polo, non transcant per eosdem meatus, quam qua veniunt ab alio.* 103
108. *Quomodo materia primi elementi per istos meatus suai.* 104
109. *Quod alii etiam meatus illes decessantim interferent.* 105
110. *Quod lumen stella per maculam vix possit transire.* ibid.
111. *Descriptio Stella ex improvise apparen-  
tia.* 106
112. *Descriptio Stella paulatim dispar-  
entis.* 107
113. *In omnibus maculis multos meatus à  
particulis striatis excavari.* 108
114. *Eandem stellam posse per vices appa-  
rere ac disparere.* 109
115. *Totum aliquando vorticem, in cuius  
centro est stella, destrui posse.* ibid.
116. *Quomodo destrui possit, antequam  
multa macula circa ejus stellam sint con-  
gregata.* 111
117. *Quomodo permulta macula circa ali-  
quam stellam esse possint, antequam ejus  
vortex destruat.* ibid.
118. *Quomodo ista multa macula generen-  
tur.* 112
119. *Quomodo Stella fixa mutetur in Co-  
metam, vel in Planetam.* 113
120. *Quo feratur talis Stella, cum primum  
desinit fixa esse.* ibid.
121. *Quid per corporum soliditatem, &  
quid per eorum agitationem intelliga-  
mus.* 115
122. *Soliditatem non à sola materia sed et-  
iam à magnitudine ac figura pendere.* ibid.
123. *Quomodo globuli celestes integro ali-  
quo sidere solidiores esse possint.* 116
124. *Quomodo etiam esse possint minus so-  
lidi.* ibid.
125. *Quomodo quidam sint aliquo sidere  
magis solidi, alii minus.* 118
126. *De principio motus Cometa.* ibid.
127. *De continuatione motus Cometa per  
diversos vortices.* 119
128. *Phænomena Cometarum.* † ibid.
129. *Horum Phænomenon explicatio.* 120
130. *Quomodo Fixarum lumen ad Terram  
usque perveniat.* ibid.
131. *An Fixa in veris locis videantur: &  
quid sit Firmamentum.* 122
132. *Cur Cometa à nobis non videantur,  
cum sint extra nostrum calvum; & ob-  
ster, cur carbones sint nigri, & cineres al-  
bi.* ibid.
133. *De Cometarum coma, & varii ejus  
phænomenis.* 125
134. *De quadam refractione, à qua ista co-  
ma dependet.* ibid.
135. *Explicatio istius refractionis.* ibid.
136. *Explicatio apparitionis coma.* 127
137. *Quomodo etiam trabes appareant.* 129
138. *Cur Cometarum cauda, non semper  
in parte à Sole directe a versa, nec semper  
recta videatur.* ibid.
139. *Cur tales coma circa Fixas aut Pla-  
netas non apparent.* ibid.
140. *De Principio motus Planeta.* 130
141. *Causa, à quibus ejus errores pendent.  
Prima.* ibid.
142. *Secunda.* ibid.
143. *Tertia.* ibid.
144. *Quarta.* 131
145. *Quinta.* ibid.
146. *De prima productione omnium Pla-  
netarum.* ibid.
147. *Cur quidam Planeta sint alii à Sole  
remotiores: idque ab eorum magnitudine  
sola non pendere.* 132
148. *Cur Soli viciniores celerius alii mo-  
veantur; & tamen ejus macula sint  
tardissima.* ibid.
149. *Cur Luna circa Terram gyret.* 133
150. *Cur Terra circa suam axem verta-  
tur.* 134
151. *Cur Luna celerius feratur, quam  
Terra.* ibid.
152. *Cur semper Luna facies, quamproxi-  
me eadem sit Terra obversa.* ibid.
153. *Cur*

153. Cur Luna celeriter incadat, & à suo motu medio minus aberret in conjunctio-  
nibus, quam in quadris: & cur ejus coe-  
lum non sit rotundum. ibid.
154. Cur secundarii Planeta qui sunt circa  
Iovem, tam celeriter; qui verò sunt cir-  
ca Saturnum, tam tarde vel nullo modo  
moveantur. 135
155. Cur poli Æquatoris & Ecliptica mul-  
tino distent ab invicem. ibid.
156. Cur paullatim ad invicem accedant. 136
157. Ultima & maxime generalis causa  
omnium inæqualitatum, qua in motibus  
corporum mundanorum reperiantur. ibid.
- P R I N C I P I O R V M  
P H I L O S O P H I Æ
- Pars quarta.  
De Terrâ.
1. **F**alsam hypothesim quâ jam ante usi  
sumus, esse retinendam, ad veras  
rerum naturas explicandas. 137
2. Quæ sit generatio Terra, secundum istam  
hypothesim. ibid.
3. Distinctio Terra in tres regiones: & pri-  
ma descriptio. ibid.
4. Descriptio secunda. 138
5. Descriptio tertia. 139
6. Particulas tertii elementi, quæ sunt in  
hac tertia regione, esse dicere satia ma-  
gnas. ibid.
7. Ipsas à primo & secundo elemento posse  
immutari. ibid.
8. Esse majores globulos secundi elementi, sed  
isidem esse minus solidas & minus agra-  
tas. ibid.
9. eas ab initio sibi mutuo incubuisse circa  
Terram, ibid.
10. Varia circa ipsas intervalia materia pri-  
mi & secundi elementi relicta esse. 104
11. Globulos secundi Elementi, eo minores  
initio fuisse, quo centro Terra viciniores.  
ibid.
12. Meatusque inter ipsas habuisse angustio-  
res. ibid.
13. Non semper crassiores, tenuioribus in-  
feriores fuisse. 141
14. De prima formatione diversorum cor-  
porum in tertia Terra regione. ibid.
15. De actionibus, quarum ope ista corpora  
genita sunt; ac primo de generali globulo-  
rum celestium motu. ibid.
16. De primo hujus prima actionis effectu  
quod reddat corpora pellucida. ibid.
17. Quomodo corpus solidum, & durum,  
satis multos meatus habere possit ad radios  
luminis transmittendos. 142
18. De secundo illius prima actionis effectu,  
quod una corpora ab aliis secernat, &  
liquiores expulet. ibid.
19. De tertio effectu: quod liquorum guttas  
reddat rotundas. 143
20. Explicatio secunda actionis, qua gravi-  
tas vocatur. ibid.
21. Omnes Terra partes, si sola spectentur,  
non esse graves, sed leves. 144
22. In quo consistat levitas materia cele-  
stis. ibid.
23. Quomodo partes omnes terra, ab ista  
materia celesti deorsum pellantur, & ita  
fiant graves. ibid.
24. Quanta sit in quoque corpore gravi-  
tas. 145
25. Ejus quantitatem non respondere quan-  
titati materia cuiusque corporis. ibid.
26. Cur corpora non gravitent in locis suis  
naturalibus. 146
27. Gravitationem corpora deprimeere versus  
centrum Terra. 147
28. De tertia actione, quæ est lumen; quo-  
modo particulas aeris commoveat. ibid.
29. De quarta, quæ est calor: quid sit, &  
quomodo sulatio lumine perseveret. 148
30. Cur alius penetret, quom lumen. ibid.
31. Cur corpora a sece omnia rarefaciat. ibid.
32. Quomodo suprema Terra regio, in duo  
diversa



PRINCIPIORVM PHILOSOPHIÆ

- diversa corpora fuerit primum diversa.* ib.
33. *Distinctio particularium terrestrium in tria summa genera.* 149
34. *Quomodo tertium corpus inter duo priora factum sit.* 150
35. *Particulae tantum unius generis in isto corpore contineri.* ibid.
36. *Duas tantum in eo esse species istarum particularium.* ibid.
37. *Quomodo infimum corpus C in plura alia fuerit divisum.* 151
38. *De formatione alterius quarti corporis supra tertium.* 152
39. *De huius quarti corporis accretione, & tertii expurgatione.* ibid.
40. *Quomodo hoc tertium corpus fuerit mole immixtum, & spatium aliquod inter se & quartum reliquerit.* 153
41. *Quomodo multa fissura in quarto facta sint.* 154
42. *Quomodo ipsum in varias partes sit fractum.* ibid.
43. *Quomodo tertium corpus supra quartum ex parte ascenderit, & ex parte infra remanserit.* 156
44. *Inde in superficie Terra ortos esse montes, campos, maria, &c.* ibid.
45. *Qua sit aeris natura.* 157
46. *Cur facile rarefiat & densetur.* ibid.
47. *De violenta ejus compressione in quibusdam machinis.* ibid.
48. *De aqua natura: & cur facile modo in aërem, modo in glaciem vertatur.* ibid.
49. *De fluxu & refluxu maris.* 158
50. *Cur aqua horis 6; ascendat, & horis 6; descendat.* 159
51. *Cur aestus maris sint majores, cum Luna plena est: vel nova.* 166
52. *Cur in æquinoctiis sint maximi.* ibid.
53. *Cur aer & aqua semper ab Oriente in Occidentem fluant.* ibid.
54. *Cur in eadem poli altitudine regiones qua mare habent ad Orientem, sint aliis magis temperata.* ibid.
55. *Cur nullus sit fluxus nec refluxus in lacubus aut stagnis: & cur in variis litibus variis horis fiat.* ibid.
56. *Quomodo ejus causa particulares, in singulis litibus sint investiganda.* 161
57. *De natura Terra interioris.* ibid.
58. *De natura argenti vivi.* 162
59. *De inaequalitate caloris interiorum Terram pervadentis.* ibid.
60. *De istius caloris actione.* 163
61. *De succis acerbis & acidis, ex quibus sunt acramentum sutorium, alumen, &c.* ibid.
62. *De materia oleaginea bituminis, sulphuris, &c.* ibid.
63. *De Chymicorum Principiis; & quomodo metalla in sodina ascendant.* 164
64. *De Terra exteriori; & de origine fontium.* ibid.
65. *Cur mare non augetur ex eo, quod flumina in illud fluant.* 165
66. *Cur fontes non sint salsi, nec mare dulcescat.* ibid.
67. *Cur in quibusdam puteis aqua sit salsa.* ibid.
68. *Cur etiam ex quibusdam montibus sal effodiatur.* 166
69. *De nitro, aliisque salibus, à sale marino diversis.* ibid.
70. *De vaporibus, spiritibus, & exhalationibus à terra interiore ad exteriorem ascendentibus.* ibid.
71. *Quomodo ex varia eorum mistura, variis lapidum, aliorumque fossilium genera oriuntur.* ibid.
72. *Quomodo metalla ex terra interiore ad exteriorem perveniant; & quomodo minimum fiat.* 167
73. *Cur non in omnibus terra locis metalla inveniantur.* ibid.
74. *Cur potissimum inveniantur in radicibus montium, versus Meridicam & Orientem.* ibid.
75. *Fossiles omnes esse in terra exteriori; nec posse unquam ad interiorem solidando perveniri.* ibid.

\*\*\*\*\*

76. De

76. De sulphure, bitumine, argilla, oleo. 168  
 77. Quomodo fiat terra motus. ibid.  
 78. Cur ex quibusdam montibus ignis erumpat. ibid.  
 79. Cur plures concussionis fieri soleant in terra motu: sicque per aliquot horas aut dies interdum duret. ibid.  
 80. De natura ignis, ejusque ab aere diversitate. ibid.  
 81. Quomodo primum excitetur. 169  
 82. Quomodo conservetur. ibid.  
 83. Cur eget alimento. ibid.  
 84. Quomodo ex silicibus excutitur. 170  
 85. Quomodo ex lignis secit. 171  
 86. Quomodo ex collectione radiorum Solis. ibid.  
 87. Quomodo à solo motu valde violento. 172  
 88. Quomodo à diversorum corporum mixtura. ibid.  
 89. In fulmine, in stellis trajectantibus. ibid.  
 90. In iis qua lucent & non urunt: ut in stellis cadentibus. 173  
 91. In guttis aqua marina, in lignis putridis, & similibus. ibid.  
 92. In iis qua incallescunt & non lucent: ut in saxo incluso. ibid.  
 93. In calce aqua aspersa, & reliquis. 174  
 94. Quomodo in cavitatibus terra ignis accendatur. 175  
 95. Quomodo canela ardeat. ibid.  
 96. Quomodo ignis in ea conservetur. ibid.  
 97. Cur ejus flamma sit acuminata; & fumus ex ea egrediatur. 176  
 98. Quomodo aer & alia corpora flammam alant. ibid.  
 99. De motu aëris versus ignem. ibid.  
 100. De iis qua ignem extinguunt. ibid.  
 101. Quid requiratur, ut aliquid corpus alendo igni aptum sit. 177  
 102. Cur flamma ex spiritu vini linteum non urat. ibid.  
 103. Cur spiritus vini facillime ardeat. ibid.  
 104. Cur aqua difficillime. ibid.  
 105. Cur vis magnorum ignium, ab aqua aut salibus injectis augetur. ibid.
106. Qualia sunt corpora qua facile urantur. ibid.  
 107. Cur quadam inflammentur; alia non. 178  
 108. Cur ignis aliquandiu in prunis se conservet. ibid.  
 109. De pulvere tormentario ex sulphure, nitro & carbone confecto; ac primo, de sulphure. ibid.  
 110. De nitro. ibid.  
 111. De sulphuris & nitri conjunctione. 179  
 112. De motu particularum nitri. ibid.  
 113. Cur flamma hujus pulveris valde dilataitur, & precipue agit versus superiora. ibid.  
 114. De carbone. ibid.  
 115. De granis hujus pulveris, & in quo precipua ipsius vis consistat. ibid.  
 116. De lucernis diversissime ardentibus. 180  
 117. De reliquis ignis effectibus. 181  
 118. Quanam corpora illi admota liquecant & bullant. ibid.  
 119. Quanam siccentur & durecant. ibid.  
 120. De aquis ardentibus, vispidis, acidis. ibid.  
 121. De sublimatis & oleis. 182  
 122. Quod mutato ignis gradu mutetur ejus effectus. ibid.  
 123. De calce. ibid.  
 124. De vitro, quomodo fiat. ibid.  
 125. Quomodo ejus particula simul jungantur. 183  
 126. Cur sit liquidum cum candet, omnesque figuras facile induat. ibid.  
 127. Cur, cum frigidum est, sit valde durum. 184  
 128. Cur valde fragile. ibid.  
 129. Cur eius fragilitas minuatur, si lente refrigeretur. ibid.  
 130. Cur sit pellucidum. 185  
 131. Quomodo fiat coloratum. ibid.  
 132. Cur sit rigidum instar arcus; & generaliter, cur rigida, cum inflexa sunt, sponte redeant ad priorem figuram. ibid.  
 133. De magnete. Repetitio eorum ex ante dictis. 186

- dictū, qua ad ejus explicationem requiruntur.* 186
134. Nullos in aëre, nec in aqua esse meatus recipiendū particulis striatis idoneos. 187
135. Nullos etiam esse in ullis corporibus terra exterioris, præterquam in ferro. *ibid.*
136. Cur tales meatus sint in ferro. *ibid.*
137. Qua ratione etiam sint in singulis ejus ramentis. 188
138. Quomodo isti meatus apti reddantur ad particulas striatas ab utraque parte venientes admittendas. *ibid.*
139. Qua sit natura magnetis. 189
140. Quomodo fusione fiat chalybs, & quodvis ferrum. *ibid.*
141. Cur chalybs sit valde durus, rigidus, & fragilis. *ibid.*
142. Qua sit differentia inter chalybem, & aliud ferrum. 190
143. Quomodo chalybs temperetur. *ibid.*
144. Qua sit differentia inter meatus magnetis, chalybis, & ferri. 191
145. Enumeratio proprietatum virtutis magneticae. *ibid.*
146. Quomodo particula striata per Terra meatus fluant. 194
147. Quod difficilium transeant per aërem, aquam, & terram exteriorem, quam per interiorem. 195
148. Quod facilius transeant per magnetem, quam per alia corpora hujus terra exterioris. *ibid.*
149. Qui sint poli magnetis. *ibid.*
150. Cur isti poli se convertant versus polos Terra. *ibid.*
151. Cur etiam certa ratione versus ejus centrum se inclinent. 196
152. Cur unus magnetis ad alium se convertat & inclinet; eodem modo atque ad Terram. 197
153. Cur duo magnetes ad invicem accedant, & qua sit cujusque ipsarum activitatis. *ibid.*
154. Cur interdum se invicem refugiant. 198
155. Cur segmentorum magnetis partes, quam ante sectionem junctæ erant, se mutuo etiam refugiant. 199
156. Cur duo puncta, qua prius in uno magnete contigua erant, in ejus fragmentis sine poli diversa virtutis. 200
157. Cur eadem sit vis in quavis magnetis parte, ac in toto. *ibid.*
158. Cur magnetis suam vim ferro sibi admoto communicet. *ibid.*
159. Cur ferrum pro variis modis, quibus magneti admovetur, ipsam diversimodo recipiat. *ibid.*
160. Cur ferrum oblongum eam non recipiat, nisi secundum suam longitudinem. 201
161. Cur magnetis nihil amittat de sua vi, quamvis eam ferro communicet. *ibid.*
162. Cur hac vi celerrime ferro communicetur, sed diuturnitate temporis in eo confirmetur. *ibid.*
163. Cur chalybs ad eam recipiendam aptior sit, quam visus ferrum. *ibid.*
164. Cur major ei communicetur à perfectiore magnete, quam à minus perfecto. *ibid.*
165. Cur ipsa etiam terra vim magneticam ferro tribuat. 202
166. Cur vis magnetica in Terra debitor sit, quam in parvis magnetibus. *ibid.*
167. Cur acus magnete talia semper sua virtutis polos in extremitatibus suis habeant. 203
168. Cur poli magneticae virtutis non semper accurate versus Terra polos dirigantur, sed ab eis varie declinent. *ibid.*
169. Cur etiam interdum ista declinatio cum tempore mutetur. *ibid.*
170. Cur in magnete supra unum ex suis polis erecto minor esse possit, quam cum ejus poli aequaliter à Terra distant. 204
171. Cur magnetis trahat ferrum. *ibid.*
172. Cur magnetis armatus multo plus ferri sustineat, quam nudus. *ibid.*
173. Cur ejus poli, quamvis contrarii, se invicem juvent ad ferrum sustinendum. 205

INDEX PRINCIPIORVM PHILOSOPHIÆ.

174. *Cur gyration rotula ferrea, à vi magnetis eius appetita est, non impediatur.* ibid.
175. *Quomodo & quare vis unius magnetis angeat vel imminuat vim alterius.* 206
176. *Cur magnes quantumvis fortis ferrum sibi non contiguum à magnete debiliore attrahere non possit.* ibid.
177. *Cur magnetis debilis, aut ferrum, à magnete fortiori ferrum sibi contiguum possit deirahere.* 207
178. *Cur in his Borealibus regionibus polus Australis magnetis sit fortior Borealis.* ibid.
179. *De vis qua observari possunt in ferri limatura circa magnetem sparsa.* ibid.
180. *Cur lamina ferrea polo magnetis conjuncta eius vim trahendi vel convertendi ferri impediatur.* 209
181. *Cur eandem nullius alterius corporis interpositio impediatur.* ibid.
182. *Cur magnetis positio non conveniens ejus vires paulatim imminuat.* ibid.
183. *Cur rubigo, humiditas & fetus, eas etiam imminuat, & vehementis ignis plane tollat.* ibid.
184. *De vi attractionis in succino, cera, resina, & similibus.* 210
185. *Qua sit causa istius attractionis in vitro.* ibid.
186. *Eandem istius causam in reliquis etiam videri.* 211
187. *Ex diutius intelligi, quamvis causa esse possint reliquorum omnium miraculorum effectuum, qui ad occultas qualitates ferri solent.* 212
188. *De vis, qua ex tractationibus de animali & de homine ad rerum materialium cognitionem mutanda sunt.* ibid.
189. *Quid sit sensus, & quomodo fiat.* 213
190. *De sensuum distinctione: ac primo de internis, hoc est, de animi affectibus, & de appetitibus naturalibus.* ibid.
191. *De sensibus externis: ac primo de tactu.* 214
192. *De gustu.* 215
193. *De odoratu.* ibid.
194. *De Auditu.* ibid.
195. *De Visu.* ibid.
196. *Animam non sentire, nisi quatenus est in cerebro.* ibid.
197. *Mentem esse talis natura, ut à solo corporis motu variis sensus in ea possint excitari.* 216
198. *Nihil à nobis in objectis externis sensu deprehendi, præter ipsorum figuras, magnitudines & motus.* 217
199. *Nulla natura phenomena in hac tractatione fuisse præmissa.* 218
200. *Nullis me in ea principis usum esse, qua non ab omnibus recipiantur, hæcque Philosophiam non esse novam, sed maxime antiquam & vulgarem.* ibid.
201. *Dari particulas corporum insensiles.* ibid.
202. *Democriti Philosophiam non minus differre à nostra, quam à vulgari.* 219
203. *Quomodo figuras & motus particularum insensibilium cognoscamus.* 220
204. *Sufficere si de insensilibus, qualia esse possint, explicuerim, etsi forte non talia sint.* ibid.
205. *Ea tamen qua explicari, videri saltem moraliter certa.* 221
206. *Imo plus quam moraliter.* ibid.
207. *Sed nec omnia mea Ecclesia auctori: tui submittere.* 222

P R I N -

I

P R I N C I P I O R V M  
P H I L O S O P H I Æ

P A R S P R I M A.

*De Principiis cognitionis humanæ.*



Voniam infantes nati sumus, & varia de rebus sensibilibus iudicia prius tulimus, quam integrum nostræ rationis usum haberemus, multis præiudiciis à veri cognitione avertimur; quibus non aliter videmur posse liberari, quam si semel in vita de iis omnibus studeamus dubitare, in quibus vel minimam incertitudinis suspicionem reperimus.

Quin & illa etiam, de quibus dubitabimus, utile erit habere pro falsis, ut tanto clarius, quidnam certissimum & cognitu facillimum sit, inveniamus.

Sed hæc interim dubitatio ad solam contemplationem veritatis est restringenda. Nam quantum ad usum vitæ, quia peræpe rerum agendarum occasio præteriret, antequam nos dubiis nostris exsolvere possemus; non raro quod tantum est verisimile cogimur amplecti; vel etiam interdum, etsi è duobus unum altero verisimilius non appareat, alterutrum tamen eligere.

Nunc itaque cum tantum veritati quærendæ incumbamus, dubitabimus in primis, an ullæ res sensibiles aut imaginabiles existant: Primo, quia deprehendimus, interdum sensus errare; ac prudentiæ est, nunquam nimis fidere iis, qui nos vel semel deceperunt: Deinde, quia quotidie in somnis innumera videmur sentire aut imaginari, quæ nusquam sunt; nullaque sic dubitanti signa apparent, quibus somnum à vigilia certo dignoscat.

Dubitabimus etiam de reliquis, quæ antea pro maxime certis habuimus; etiam de Mathematicis demonstrationibus, etiam de iis principiis, quæ hæctenus putavimus esse per se nota; tum quia vidimus, aliquando nonnullos errasse in talibus, & quædam pro certis-

A

fimis,

I.  
*Veritatem inquirensi, semel in vita de omnibus, quantum fieri potest, esse dubitandum.*

II.  
*Dubia etiam pro falsis habenda.*

III.  
*Hanc interim dubitationem ad usum vitæ non esse referendam.*

IV.  
*Cur pessimum dubitare de rebus sensibilibus.*

V.  
*Cur etiam de Mathematicis demonstrationibus.*

simis, ac per se notis admisisse, quæ nobis falsa videbantur; tum maxime quia audivimus, esse Deum, qui potest omnia, & à quo sumus creati. Ignoramus enim, an forte nos tales creare voluerit ut semper fallamur, etiam in iis, quæ nobis quam notissima apparent; quia non minus hoc videtur fieri potuisse quam ut interdum fallamur, quod contingere ante advertimus. Atque si non à Deo potentissimo, sed vel à nobis ipsis, vel à quovis alio nos esse fingamus, quo minus potentem originis nostræ auctorem assignabimus, tanto magis erit credibile, nos tam imperfectos esse, ut semper fallamur.

VI.  
*Nos habere  
liberum ar-  
bitrium, ad  
cogitandum  
assensum in  
dubio, sicque ad errorem vitandum.*

Sed interim, à quocunque tandem sumus, & quantumvis ille sit potens, quantumvis fallax; hanc nihilominus in nobis libertatem esse experimur, ut semper ab iis credendis, quæ non plane certa sunt & explorata, possumus abstinere; atque ita cavere, ne unquam erremus.

VII.  
*Non posse à  
nobis dubi-  
tari, quin  
existamus  
dum dubita-  
mus: atque  
hoc esse pri-  
mum, quod  
ordine philo-  
sophando co-  
gnoscimus.*

Sic autem rejicientes illa omnia, de quibus aliquo modo possumus dubitare, ac etiam falsa esse fingentes; facile quidem supponimus, nullum esse Deum, nullum cælum, nulla corpora; nosque etiam ipsos non habere manus, nec pedes, nec denique ullum corpus; non autem ideo nos qui talia cogitamus nihil esse: repugnat enim, ut putemus, id, quod cogitat, non existere. Ac proinde hæc cognitio, *Ego cogito, ergo sum*, est omnium prima & certissima, quæ cuilibet ordine philosophanti occurrat.

VIII.  
*Distinctio-  
nem inter  
animam &  
corpus, sive  
inter rem  
cogitantem  
& corpo-  
ream, hinc  
arguisti.*

Hæcque optima via est ad mentis naturam, ejusque à corpore distinctionem agnoscendam: Examinantes enim quinam sumus nos, qui omnia quæ à nobis diversa sunt supponimus falsa esse, perspicue videmus, nullam extensionem, nec figuram, nec motum localem, nec quid simile, quod corpori sit tribuendum, ad naturam nostram pertinere, sed cogitationem solam; quæ proinde prius & certius quam ulla res corporea cognoscitur; hanc enim jam percepimus, de aliis autem adhuc dubitamus.

IX.  
*Quid sit co-  
gitatio.*

Cogitationis nomine intelligo illa omnia, quæ nobis consciis in nobis hunt, quatenus eorum in nobis conscientia est: Atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, sed etiam sentire, idem est hic quod cogitare. Nam si dicam, ego video, vel ego ambulo, ergo sum; & hoc intelligam de visione, aut ambulatione, quæ corpore peragitur: conclusio non est absolute certa; quia, ut sæpe fit in somnis, possum putare me videre, vel ambulare, quamvis oculos non ape-  
riam,

riam, & loco non movear, atque etiam forte, quanvis nullum habeam corpus; Sed si intelligam de ipso sensu, sive conscientia videnti aut ambulandi, quia tunc refertur ad mentem, quæ sola sentit, sive cogitat, se videre aut ambulare, est plane certa.

Non hic explico alia multa nomina, quibus jam usus sum, vel utar in sequentibus, quia per se satis nota mihi videntur. Et sæpe adverti, Philosophos in hoc errare, quod ea quæ simplicissima erant ac per se nota, Logicis definitionibus explicare conarentur; ita enim ipsa obscuriora reddebant. Atque ubi dixi, hanc propositionem, *Ego cogito, ergo sum*, esse omnium primam & certissimam, quæ cuilibet ordine philosophanti occurrat, non ideo negavi, quin ante ipsam scire oporteat, quid sit cogitatio, quid existentia, quid certitudo; item quod fieri non possit, ut id quod cogitet non existat, & talia; sed quia hæ sunt simplicissimæ notiones, & quæ solæ nullius rei existentis notitiam præbent, idcirco non censui esse numerandas.

Iam vero ut sciatur, mentem nostram non modo prius & certius, sed etiam evidentius quam corpus cognosci, notandum est, lumine naturali esse notissimum, nihili nullas esse affectiones sive qualitates; atque ideo ubicunque aliquasprehendimus, ibi rem sive substantiam, cujus illæ sint, necessario inveniri; & quo plures in eadem re sive substantiaprehendimus, tanto clarius nos illam cognoscere. Plura vero in mente nostra, quam in ulla alia re à nobisprehendi, ex hoc manifestum est, quod nihil plane efficiat, ut aliquid aliud cognoscamus, quin idem etiam multo certius in mentis nostræ cognitionem nos adducat. Ut si terram judico existere, ex eo quod illam tangam vel videam, certe ex hoc ipso adhuc magis mihi iudicandum est mentem meam existere; fieri enim forsitan potest, ut iudicem me terram tangere, quamvis terra nulla existat; non autem, ut id iudicem, & mea mens quæ id iudicat nihil sit. Atque ita de cæteris.

Nec aliam ob causam aliter visum est iis, qui non ordine philosophati sunt, quam quia mentem à corpore nunquam satis accurate distinxerunt. Et quamvis sibi certius esse putarint, se ipsos existere, quam quidquam aliud; non tamen adverterunt, per se ipsos mentes solas hoc in loco fuisse intelligendas; sed contra potius intellexerunt solasua corpora, quæ oculis videbant, & manibus palpabant, quibusque vim sentiendi perperam tribuebant; hocque ipsos à mentis natura percipienda avocavit.

Cum autem mens, quæ se ipsam novit, & de aliis omnibus rebus

X.

*Quæ simplicissima sunt & per se nota, definitionibus Logicis obscuriora reddi; & talia inter cognitiones studio acquisitas non esse numeranda.*

XI.

*Quomodo mens nostra nosior sit, quam corpus.*

XII.

*Cur non omnibus æque innoscantur.*

XIII.

*De sensu*

*reliquarum  
rerum cogni-  
tio à Dei co-  
gnitione de-  
pendeat.*

adhuc dubitat, undiquaque circumspicit, ut cognitionem suam ulterius extendat; primo quidem invenit apud se multarum rerum ideas, quas quamdiu tantum contemplatur, nihilque ipsis simile extra se esse affirmat nec negat, falli non potest. Invenit etiam communes quasdam notiones, & ex his varias demonstrationes componit, ad quas quamdiu attendit, omnino sibi persuadet esse veras. Sic, exempli causâ, numerorum & figurarum ideas in se habet, habetque etiam inter communes notiones, *quod, si aequalibus aequalia addas, quæ inde exsurgent erunt aequalia*, & similes; ex quibus facile demonstrat tres angulos trianguli æquales esse duobus rectis, &c. ac proinde hæc & talia sibi persuadet vera esse, quamdiu ad præmissas, ex quibus ea deduxit, attendit. Sed quia non potest semper ad illas attendere, cum postea recordatur, se nondum scire, an forte talis natura creata sit, ut fallatur etiam in iis, quæ ipsi evidentissima apparent; videt, se merito de talibus dubitare, nec ullam habere posse certam scientiam, priusquam suæ auctorem originis agnoverit.

## XIV.

*Ex eo quod  
existentia  
necessario in  
nostro de  
Deo conce-  
ptu conti-  
neatur, ve-  
le concludi,  
Deum exi-  
stere.*

Considerans deinde inter diversas ideas, quas apud se habet, unam esse entis summe intelligentis, summe potentis & summe perfecti, quæ omnium longe præcipua est; agnoscit in ipsa existentiam, non possibilem & contingentem tantum, quemadmodum in ideis aliarum omnium rerum, quas distincte percipit, sed omnino necessariam & æternam. Atque ut ex eo quod, exempli causâ, percipiat in idea trianguli necessario contineri, tres ejus angulos æquales esse duobus rectis, plane sibi persuadet, triangulum tres angulos habere æquales duobus rectis; ita ex eo solo, quod percipiat, existentiam necessariam & æternam in entis summe perfecti idea contineri, plane concludere debet, ens summe perfectum existere.

## XV.

*Non eodem  
modo in a-  
harum ve-  
rum conce-  
ptibus exi-  
stentiam ne-  
cessariam,  
sed contingentem duntaxat contineri.*

Magisque hoc credet, si attendat, nullius alterius rei ideam apud se inveniri, in qua eodem modo necessariam existentiam contineri animadvertat. Ex hoc enim intelliget, istam ideam entis summe perfecti non esse à se effectam, nec exhibere chimæricam quandam, sed veram & immutabilem naturam, quæque non potest non existere, cum necessaria existentia in ea contineatur.

## XVI.

*Præjudicia  
impedire,  
quo minus  
ista necessi-  
tas existen-*

Hoc, inquam, facile credet mens nostra, si se prius omnino præjudiciis liberarit. Sed quia sumus assueti, reliquis omnibus in rebus essentiam ab existentia distinguere; atque etiam varias ideas rerum, quæ nusquam sunt, aut fuerunt, ad arbitrium effingere: facile

cile



cile contingit, cum in entis summe perfecti contemplatione non sumus plane defixi, ut dubitemus, an forte ejus idea una sit ex iis, quas ad arbitrium effinximus, aut saltem, ad quarum essentiam existentia non pertinet.

Vt uterque considerantes ideas, quas in nobis habemus, videmus quidem, illas, quatenus sunt quidam modi cogitandi, non multum à se mutuo differre, sed quatenus unam rem, alia aliam repræsentat, esse valde diversas; & quo plus perfectionis objectivæ in se continent, eo perfectiorem ipsarum causam esse debere. Nam quemadmodum, si quis in se habet ideam alicujus machinæ valde artificiosæ, merito queri potest, quænam sit causa à qua illam habet; an nempe viderit alicubi talem machinam ab alio tactam; an mechanicas scientias tam accurate didicerit, anve tanta sit in eo ingenii vis, ut ipsam nullibi unquam visam per se excogitare potuerit? Totum enim artificium quod in ideâ illâ objectivæ tantum, sive tantquam in imagine continetur, debet in ejus causâ, qualiscunque tandem sit, non tantum objectivæ sive repræsentativæ, saltem in prima & præcipuâ, sed re ipsâ, formaliter aut eminenter contineri.

Sic quia Dei, sive entis summi ideam habemus in nobis, jure possumus examinare, à quânam causâ illam habeamus; tantamque in ea immensitatem inveniemus, ut plane ex eo sumus certi, non posse illam nobis fuisse insitam, nisi à re, in qua sit revera omnium perfectionum complementum, hoc est nisi à Deo realiter existente. Est enim lumine naturali notissimum, non modo à nihilo nihil fieri; nec id quod est perfectius ab eo quod est minus perfectum, ut à causâ efficiente & totali produci; sed neque etiam in nobis ideam sive imaginem ullius rei esse posse, cujus non alicubi, sive in nobis ipsis, sive extra nos, Archetypus aliquis, omnes ejus perfectiones re ipsa continens, existat. Et quia summas illas perfectiones, quarum ideam habemus, nullo modo in nobis reperimus, ex hoc ipso recte concludimus, eas in aliquo à nobis diverso, nempe in Deo, esse; vel certe aliquando fuisse; ex quo evidentissime sequitur, ipsas adhuc esse.

Hocque satis certum est manifestum iis qui Dei ideam contemplari summasque ejus perfectiones advertere sunt assueti. Quamvis enim illas non comprehendamus, quia scilicet est de natura infiniti, ut à nobis, qui sumus finiti, non comprehendatur; nihilominus tamen ipsas clarius & distinctius quam ulla res corporeas intelligere possu-

*Etia Dei ab omnibus clare cognoscitur.*

XVII.  
*Quo cujusque ex nostris ideis objectiva perfectio major est, eo ejus causam esse debere majorem.*

XVIII.  
*Hinc rursus concludi, Deum existere.*

XIX.  
*Etia Dei naturam non comprehendamus, ejus tamen perfectiones omni alia re clarius à nobis cognosci*

possimus, quia cogitationem nostram magis implet, suntque simpliciores, nec limitationibus ullis obscurantur.

XX.

*Nam non à nobis ipse, sed à Deo factus, eumque proinde existere.*

Quia vero non omnes hoc advertunt; atque etiam quia non, quemadmodum habentes ideam artificiosæ alicujus machinæ, scire solent undenam illam acceperint, ita etiam recordamur, ideam Dei nobis aliquando à Deo advenisse, ut potest quam semper habuimus; quærendum adhuc est, à quonam sumus nos ipsi, qui summorum Dei perfectionum ideam in nobis habemus. Nam certe est lumine naturali notissimum, eam rem, quæ novit aliquid se perfectius, à se non esse: dedisset enim ipsa sibi omnes perfectiones, quarum ideam in se habet; nec proinde etiam posse ab ullo esse, qui non habeat in se omnes illas perfectiones, hoc est, qui non sit Deus.

XXI.

*Excellentia nostra durationem sufficere ad existendum Dei demonstrandum.*

Nihilque hujus demonstrationis evidentiam potest obscurare, modo attendamus ad temporis sive rerum durationis naturam; quæ talis est, ut ejus partes à se mutuo non pendeant, nec unquam simul existant; atque ideo ex hoc quod jam sumus; non sequitur, nos in tempore proxime sequenti etiam futuros, nisi aliqua causa, neipe eadem illa, quæ nos primum produxit, continuo veluti reproductat, hoc est, conservet. Facile enim intelligimus, nullam vim esse in nobis, per quam nos ipsos conservemus; illumque in quo tanta est vis, ut nos à se diversos conservet, tanto magis etiam se ipsum conservare, vel potius nulla ullius conservatione indigere, ac denique Deum esse.

XXII.

*Ex nostro modo existentiam Dei cognoscendi, omnia ejus attributa naturalis ingenii vi cognoscibilium simul cognosci.*

Magna autem, in hoc existentiam Dei probandi modo, per ejus scilicet ideam, est prærogativa, quod simul, quisnam sit, quantum naturæ nostræ fert infirmitas, agnoscamus. Nempe ad ejus ideam nobis ingenitam respicientes, videmus, illum esse æternum, omniscium, omnipotentem, omnis bonitatis veritatisque fontem, rerum omnium creatorem, ac denique illa omnia in se habentem, in quibus aliquam perfectionem infinitam, sive nulla imperfectione terminatam, clare possumus advertere.

XXIII.

*Deum non esse corporeum, nec sentire ut nos, nec velle militiam peccati.*

Nam sane multa sunt, in quibus etsi non nihil perfectionis agnoscamus, aliquid tamen etiam imperfectionis sive limitationis deprehendimus; ac proinde competere Deo non possunt. Ita in natura corporea, quia simul cum locali extensione divisibilitas includitur, estque imperfectio esse divisibilem; certum est, Deum non esse corpus. Et quamvis in nobis perfectio quædam sit, quod sentiamus, quia tamen in omni sensu passio est, & pati est ab aliquo pendere; nullo

nullo modo Deum sentire putandum est; sed tantummodo intelligere & velle: Neque hoc ipsum ut nos, per operationes quodammodo distinctas, sed ita, ut per unicam, semperque eandem & simplicissimam actionem, omnia simul intelligat, velit & operetur. Omnia, inquam, hoc est, res omnes: neque enim vult malitiam peccati, quia non est res.

Iam vero, quia Deus solus omnium, quæ sunt aut esse possunt, vera est causa; perspicuum est, optimam philosophandi viam nos sequuturos, si ex ipsius Dei cognitione rerum ab eo creatarum explanationem deducere conemur, ut ita scientiam perfectissimam, quæ est effectuum per causas, acquiramus. Quod ut satis tuto & sine errandi periculo aggrediamur, ea nobis cautela est utendum, ut semper quàm maxime recordemur, & Deum autorem rerum esse infinitum, & nos omnino finitos.

Ita si forte nobis Deus de se ipso, vel aliis, aliquid revelet, quod naturales ingenii nostri vires excedat, qualia jam sunt mysteria Incarnationis & Trinitatis, non recusabimus illa credere, quamvis non clare intelligamus; Nec ullo modo mirabimur, multa esse, tum in immensâ ejus naturâ, tum etiam in rebus ab eo creatis, quæ captum nostrum excedant.

Ita nullis unquam fatigabimur disputationibus de infinito: Nam sane cum simus finiti, absurdum esset nos aliquid de ipso determinare, atque sic illud quasi finire ac comprehendere conari. Non igitur respondere curabimus iis, qui quærent, an, si daretur linea infinita, ejus media pars esset etiam infinita; vel an numerus infinitus sit par, anve impar; & talia; quia de iis nulli videntur debere cogitare, nisi qui mentem suam infinitam esse arbitrantur. Nos autem illa omnia, in quibus sub aliqua consideratione nullum finem poterimus invenire, non quidem affirmabimus, esse infinita, sed ut indefinita spectabimus. Ita quia non possumus imaginari extensionem tam magnam, quin intelligamus adhuc majorem esse posse, dicimus, magnitudinem rerum possibilem esse indefinitam. Et quia non potest dividi aliquod corpus in tot partes, quin singulæ adhuc ex his partibus divisibiles intelligantur, putabimus, quantitatem esse indefinitè divisibilem. Et quia non potest fingi tantus stellarum numerus, quin plures adhuc à Deo creati potuisse credamus, illarum numerum indefinitum supponemus. Atque ita de reliquis.

XXIV.

*A Dei cognitione ad creaturarum cognitionem perveniri, recordando Deum esse infinitum, & nos finitos.*

XXV.

*Credenda esse omnia quæ à Deo revelata sunt, quamvis captum nostrum excedant.*

XXVI.

*Nunquam disputandum esse de infinito; sed tantum ea in quibus nullus finis adversimus, qualia sunt extensio mundi, divisibilitas partium materiae, numerus stellarum, &c. pro indefinitis habenda.*

Hæc-

XXVII.  
*Quæ differe-  
rentia sit  
inter indefi-  
nitum &  
infinitum.*

Hæcque indefinita dicemus potius quàm infinita; tum ut nomen infiniti soli Deo reservemus, quia in eo solo, omni ex parte, non modo nullos limites agnoscimus, sed etiam positive nullos esse intelligimus; tum etiam, quia non eodem modo positive tantum, alias res aliqua ex parte limitibus carere, sed, negative tantum, eorum limites, si quos habeant, inveniri à nobis non posse, confitemur.

XXVIII.  
*Non causas  
finales ve-  
rum creatu-  
rum, sed effi-  
cientes, esse  
examinan-  
das.*

Itadenique nullas unquam rationes circa res naturales, à fine, quem Deus aut natura in iis faciendis sibi proposuit, desumemus; quia non tantum nobis debemus arrogare, ut ejus consiliorum participes esse putemus: Sed ipsum ut causam efficientem rerum omnium considerantes, videbimus, quidnam ex iis ejus attributis, quorum nos nonnullam notitiam voluit habere, circa illos ejus effectus qui sensibus nobis apparent, lumen naturale quod nostris indidit, concludendum esse ostendat; memores tamen, ut jam dictum est, huic lumini naturali tamdiu tantum esse credendum, quandiu nihil contrarium à Deo ipso reveletur.

XXIX.  
*Deum non  
esse errorum  
causam.*

Primum Dei attributum quod hîc venit in considerationem, est, quod sit summe verax & dator omnis luminis; adeo ut plane repugnet ut nos fallat, sive ut proprie ac positive sit causa errorum, quibus nos obnoxios esse experimur. Nam quamvis forte, posse fallere, nonnullum ingenii argumentum apud nos homines esse videatur, nunquam certe fallendi voluntas nisi ex malitia vel metu & imbecillitate procedit, nec proinde in Deum cadere potest.

XXX.  
*Hinc sequi,  
omnia quæ  
clare perci-  
pimus, vera  
esse, ac tolli  
dubitatio-  
nis recen-  
sitas.*

Atque hinc sequitur, lumen naturæ, sive cognoscendi facultatem à Deo nobis datam, nullum unquam objectum posse attingere, quod non sit verum, quatenus ab ipsa attingitur, hoc est, quatenus clare & distincte percipitur. Merito enim deceptor esset dicendus, si perversam illam ac falsum pro vero sumentem nobis dedisset. Ita tollitur summa illa dubitatio, quæ ex eo petebatur, quod nesciremus, an forte talis essemus naturæ, ut falleremur etiam in iis, quæ nobis evidentissima esse videntur. Quin & aliæ omnes dubitandi causæ prius recensitæ, facile ex hoc principio tollentur. Non enim amplius Mathematicæ veritates nobis suspectæ esse debent, quia sunt maxime perspicuæ. Atque si advertamus, quid in sensibus, quid in vigilia, quidve in somno clarum sit ac distinctum, illudque ab eo, quod confusum est & obscurum, distinguamus; facile quid in qualibet re pro vero habendum sit agnoscemus. Nec opus est, ista pluribus verbis hoc

hoc in loco persequi, quoniam in Meditationibus Metaphysicis jam utcumque tractata sunt, & accuratior eorum explicatio ex sequentium cognitione dependet.

Quia vero, etsi Deus non sit deceptor, nihilominus tamen sæpe contingit nos falli; ut errorum nostrorum originem & causam investigemus, ipsosque præcavere discamus, advertendum est, non tam illos ab intellectu, quam à voluntate pendere; nec esse res, ad quarum productionem realis Dei concursus requiratur: sed cum ad ipsum referuntur, esse tantum negationes; & cum ad nos, privationes.

Quippe omnes modi cogitandi, quos in nobis experimur, ad duos generales referri possunt: quorum unus est, perceptio sive operatio intellectûs; alius vero, volitio sive operatio voluntatis. Nam sentire, imaginari, & pure intelligere, sunt tantum diversi modi percipiendi; ut & cupere, aversari, affirmare, negare, dubitare, sunt diversi modi volendi.

Cum autem aliquid percipimus, modo tantum nihil plane de ipso affirmemus vel negemus, manifestum est, nos non falli; ut neque etiam cum id tantum affirmamus, aut negamus, quod clare & distincte percipimus esse sic affirmandum aut negandum: sed tantummodo, cum, (ut fit) etsi aliquid non recte percipiamus, de eo nihilominus judicamus.

Atque ad judicandum requiritur quidem intellectus; quia de re, quam nullo modo percipimus, nihil possumus judicare: sed requiritur etiam voluntas, ut rei aliquo modo perceptæ assensus præbeat: Non autem requiritur (saltem ad quomodocunque judicandum) integra & omnimoda rei perceptio; multis enim possumus assentiri, quæ non nisi perobscure & confuse cognoscimus.

Et quidem intellectûs perceptio non nisi ad ea pauca quæ illi offeruntur, se extendit, estque semper valde finita. Voluntas vero infinita quodammodo dici potest: quia nihil unquam advertimus, quod alicujus alterius voluntatis, vel immensæ illius quæ in Deo est, objectum esse possit, ad quod etiam nostra non se extendat: adeo ut facile illam, ultra ea quæ clare percipimus, extendamus; hocque cum facimus, haud mirum est, quod contingat nos falli.

Neque tamen ullo modo Deus errorum nostrorum author fingi potest, propterea quod nobis intellectum non dedit omniscium.

XXXI.  
*Errores nostras, si ad Deum referantur, esse tantum negationes: si ad nos, privationes.*

XXXII.  
*Duos tantum in nobis esse modos cogitandi, perceptionem scilicet intellectus, & operationem voluntatis.*

XXXIII.  
*Nos non errare, nisi cum de re non satis percepta judicamus.*

XXXIV.  
*Non solum intellectum, sed etiam voluntatem requiri ad judicandum.*

XXXV.  
*Hanc illo latius patere, errorumque causam inde esse.*

XXXVI.  
*Errores nostros Deo*

*imputari  
non posse.*

Est enim de ratione intellectus creati, ut sit finitus; ac de ratione intellectus finiti, ut non ad omnia se extendat.

XXXVII.

*Summam  
esse hominis  
perfectio-  
nem, quod  
agat libere,  
sive per vo-  
luntatem,  
& per hoc  
laude vel  
vituperio  
dignum red-  
di.*

Quod vero latissime pateat voluntas, hoc etiam ipsius naturæ convenit; ac summa quædam in homine perfectio est, quod agat per voluntatem, hoc est libere; atque ita peculiari quodam modo sit author suorum actionum, & ob ipsas laudem mereatur. Non enim laudantur automata, quod motus omnes ad quos instituta sunt, accurate exhibeant, quia necessario illos sic exhibent; laudatur autem eorum artifex, quod tam accurata fabricarit, quia non necessario, sed libere ipsa fabricavit. Eademque ratione magis profecto nobis tribuendum est, quod verum amplectamur, cum amplectimur, quia voluntarie id agimus, quam si non possemus non amplecti.

XXXVIII.

*Esse defe-  
ctum in no-  
stra actione,  
non in nostra  
natura,  
quod erre-  
mus; Et sæ-  
pe subdito-  
rum culpas  
aliis domi-  
nis, nun-  
quam au-  
tem Deo,  
tribui posse.*

Quod autem in errores incidamus defectus quidem est in nostra actione sive in usu libertatis, sed non in nostra natura; utpote quæ eadem est, cum non recte, quam cum recte judicamus. Et quamvis tantam Deus perspicacitatem intellectui nostro dare potuisset, ut nunquam falleremur; nullo tamen jure hoc ab ipso possumus exigere. Nec quemadmodum inter nos homines, si quis habeat potestatem aliquod malum impediendi, nec tamen impediatur, ipsum dicimus esse ejus causam; ita etiam, quia Deus potuisset efficere, ut nunquam falleremur, ideo errorum nostrorum causa est putandus. Potestas enim, quam homines habent uni in alios, ad hoc est instituta, ut ipsa utantur ad illos à malis revocandos: ea autem, quam Deus habet in omnes, est quam maxime absoluta & libera: ideoque summas quidem ipsi debemus gratias pro bonis quæ nobis largitus est: sed nullo jure queri possumus, quod non omnia largitus sit, quæ agnoscimus largiri potuisse.

XXXIX.

*Libertatem  
arbitrii esse  
per se no-  
tam.*

Quod autem sit in nostra voluntate libertas, & multis ad arbitrium vel assentiri vel non assentiri possimus, adeo manifestum est, ut inter priinas & maxime communes notiones, quæ nobis sunt innatæ, sit recensendum. Patuitque hoc maxime paulo ante, cum de omnibus dubitare studentes, eo usque sumus progressi, ut fingere-mus, aliquem potentissimum nostræ originis authorem modis omnibus nos fallere conari. Nihilominus enim hanc in nobis libertatem esse experiebamur, ut possemus ab iis credendis abstinere, quæ non plane certa erant & explorata: Nec ulla magis per se nota & perfecta esse possunt, quam quæ tunc temporis non dubia videbantur.

Sed

Sed quia, iam Deum agnoscentes, tam immensam in eo potestatem esse percipimus, ut nefas esse putemus existimare, aliquid unquam à nobis fieri posse, quod non ante ab ipso fuerit præordinatum; facile possumus nos ipsos magnis difficultatibus intricare, si hanc Dei præordinationem cum arbitrii nostri libertate conciliare, atque utramque simul comprehendere conemur.

Illis vero nos expediemus, si recordemur, mentem nostram esse finitam; Dei autem potentiam, per quam non tantum omnia, quæ sunt aut esse possunt, ab æterno præcivit, sed etiam voluit ac præordinavit, esse infinitam; ideoque hanc quidem à nobis satis attingi, ut clare & distincte percipiamus, ipsam in Deo esse; non autem satis comprehendi, ut videamus quo pacto liberæ hominum actiones indeterminatas relinquat; libertatis autem & indifferentiæ quæ in nobis est, nos ita conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius & perfectius comprehendamus. Absurdum enim esset, propterea quod non comprehendimus unam rem, quam scimus ex natura sua nobis esse debere incomprehensibilem, de alia dubitare, quam intime comprehendimus, atque apud nos inet ipso experimur.

Iam vero, cum sciamus, errores omnes nostros à voluntate pendere, mirum videri potest, quod unquam fallamur, quia nemo est qui velit falli. Sed longe aliud est velle falli, quam velle assentiri iis, in quibus contingit errorem reperiri. Et quamvis revera nullus sit, qui expresse velit falli, vix tamen ullus est, qui non sæpe velit iis assentiri, in quibus error ipso inscio continetur. Quin & ipsa veritatis assequendæ cupiditas persæpe efficit, ut ii qui non recte sciunt qua ratione sit assequenda, de iis quæ non percipiunt iudicium ferant, atque idcirco ut errent.

Certum autem est, nihil nos unquam falsum pro vero admissuros, si tantum iis assensum præbeamus quæ clare & distincte percipimus. Certum, inquam, quia cum Deus non sit fallax, facultas percipiendi, quam nobis dedit, non potest tendere in falsum; ut neque etiam facultas assentiendi, cum tantum ad ea, quæ clare percipiuntur, se extendit. Et quamvis hoc nulla ratione probaretur, ita omnium animis à natura impressum est, ut quoties aliquid clare percipimus, ei sponte assentiamur, & nullo modo possumus dubitare, quin sit verum.

Certum etiam est, cum assentimur alicui rationi quam non percipimus, vel nos falli, vel casu tantum incidere in veritatem; atque

XL.  
*Certum etiam, omnia esse à Deo præordinata.*

XLI.  
*Quomodo arbitrii nostri libertas & Dei præordinatio simul conciliantur.*

XLII.  
*Quomodo quamvis nolumus falli, fallamur tamen per nostram voluntatem.*

XLIII.  
*Nos nunquam falli, cum solis clare & distincte percipis assentimur.*

XLIV.  
*Nos semper male iudic*

*care, cum  
assentimur  
non clare  
perceptis,  
etsi casu in-  
cidamus in  
veritatem:  
idque ex eo  
contingere, quod  
supponamus, ea  
fuisse antea satis à  
nobis perspecta.*

ita nescire nos non falli. Sed sane raro contingit, ut assentiamur iis, quæ advertimus à nobis non esse percepta; quia lumen naturæ nobis dicitur, nunquam nisi de re cognita esse judicandum. In hoc autem frequentissime erramus, quod multa putemus à nobis olim fuisse percepta, iisque memoriæ mandatis, tanquam omnino perceptis, assentiamur, quæ tamen revera nunquam percepimus.

**XLV.**  
*Quid sit perceptio clara,  
quid distincta.*

**Quin** & per multi homines nihil plane in tota vita percipiunt satis recte, ad certum de eo iudicium ferendum. Etenim ad perceptionem cui certum & indubitatum iudicium possit inniti, non modo requiritur ut sit clara, sed etiam ut sit distincta. Claram voco illam, quæ menti attendenti præsens & aperta est; sicut ea clare à nobis videri dicimus, quæ oculo intuenti præsentia, satis fortiter & aperte illum movent. Distinctam autem illam, quæ, cum clara sit, ab omnibus aliis ita sejuncta est & præcisa, ut nihil plane aliud, quam quod clarum est, in se contineat.

**XLVI.**  
*Exemplo doloris ostenditur, claram esse posse perceptionem, etsi non sit distincta; non autem distinctam, nisi sit clara.*

Ita dum quis magnum aliquem sentit dolorem, clarissima quidem in eo est ista perceptio doloris, sed non semper est distincta; vulgo enim homines illam confundunt cum obscuro suo iudicio de natura ejus, quod putant esse in parte dolente simile sensui doloris, quem solum clare percipiunt. Atque ita potest esse clara perceptio, quæ non sit distincta; non autem ulla distincta, nisi sit clara.

**XLVII.**  
*Ad primam ætatis præjudicia emendanda, simplices notionem esse considerandas, & quid in quaque sit clarum.*

Et quidem in prima ætate mens ita corpori fuit immerfa, ut quamvis multa clare, nihil tamen unquam distincte perceperit: cumque tunc nihilominus de multis judicaret; hinc multa hausimus præjudicia, quæ à plerisque nunquam postea deponuntur. Ut autem nos iis possimus liberare, summatim hic enumerabo simpliciter omnes notionem, ex quibus cogitationes nostræ componuntur; & quid in unaquaque sit clarum, quidque obscurum, sive in quo possimus falli, distinguam.

**XLVIII.**  
*Omnia que sub perceptionem nostram cadunt, spectari ut res rerumve affectiones,*

Quæcunque sub perceptionem nostram cadunt, vel tanquam res, rerumve affectiones quasdam consideramus; vel tanquam æternas veritates, nullam existentiam extra cogitationem nostram habentes. Ex iis quæ tanquam res consideramus, maxime generalia sunt substantia, duratio, ordo, numerus, & si quæ alia sunt ejusmodi, quæ ad omnia genera rerum se extendunt. Non autem plura quam duo summa genera rerum agnosco; unum est rerum intellectu-

tu-



Actualium sive cogitativarum, hoc est, ad mentem sive ad substantiam cogitantem pertinentium; aliud rerum materialium, sive quæ pertinent ad substantiam extensam, hoc est, ad corpus. Perceptio, volitio, omnesque modi tam percipiendi quam volendi, ad substantiam cogitantem referuntur; ad extensam autem magnitudo, sive ipsamet extensio in longum, latum & profundum; figura, motus, situs, partium ipsarum divisibilitas, & talia. Sed & alia quædam in nobis experimur, quæ nec ad solam mentem, nec etiam ad solum corpus referri debent, quæque, ut infra suo loco ostendetur, ab acta & intima mentis nostræ cum corpore unione proficiuntur; nempe appetitus famis, sitis, &c. Itemque commotiones, sive animi pathemata, quæ non in sola cogitatione consistunt, ut commotio ad iram, ad hilaritatem, ad tristitiam, ad amorem, &c. Ac denique sensus omnes, ut doloris, titillationis, lucis & colorum; sonorum, odorum, saporum, caloris, duritici, aliarumque tactilium qualitatatum.

Atque hæc omnia tanquam res, vel rerum qualitates seu modos consideramus. Cum autem agnoscimus, fieri non posse, ut ex nihilo aliquid fiat, tunc propositio hæc, Ex nihilo nihil fit, non tanquam res aliqua existens, neque etiam ut rei modus consideratur, sed ut veritas quædam æterna, quæ in mente nostra sedem habet, vocaturque communis notio, sive axiomata. Cujus generis sunt: Impossibile est; idem simul esse & non esse: Quod factum est, infectum esse nequit: Is qui cogitat, non potest non existere dum cogitat: Et alia innumera. Quæ quidem omnia recenseris facile non possunt, sed nec etiam ignorari, cum occurrit occasio ut de iis cogitemus, & nullis præjudiciis excæcamur.

Et quidem quantum ad has communes notiones, non dubium est, quin clare ac distincte percipi possint; alioqui enim communes notiones non essent dicenda: Ut etiam revera quædam ex ipsis, non æque apud omnes isto nomine dignæ sunt, quia non æque ab omnibus percipiuntur. Non tamen, ut puto, quod unius hominis cognoscendi facultas latius pateat quam alterius; sed quia forte communes istæ notiones adversantur præjudicatis opinionibus quorundam hominum, qui eas idcirco non facile capere possunt: etiamsi nonnulli alii, qui præjudiciis istis sunt liberi, evidentissime ipsas percipiant.

Quantum autem ad ea, quæ tanquam res vel rerum modos spe-

*vel ut æternas veritates. Et rerum enumerationis ratio.*

XLIX.  
*Æternas veritates non posse ita numerari, sed nec esse opus.*

L.  
*Eas clare percipi, sed non omnes ab omnibus, propter præjudicia.*

LI.  
*Quid sit substantia: &*

*quod istud  
nomen Deo  
& creaturis  
non conueni-  
at uni-  
uocè.*

ſtatim, operæ pretium eſt, ut ſingula ſeorſim conſideremus. Per ſubſtantiam nihil aliud intelligere poſſumus, quam rem quæ ita exiſtit, ut nulla alia re indigeat ad exiſtendum. Et quidem ſubſtantia quæ nulla plane re indigeat, unica tantum poteſt intelligi, nempe Deus. Alias vero omnes non niſi ope concurſus Dei exiſtere poſſe percipimus. Atque ideo nomen ſubſtantix non conuenit Deo & illis *uniuocè*, ut dici ſolet in Scholis, hoc eſt, nulla ejus nominis ſignificatio poteſt diſtinctè intelligi, quæ Deo & creaturis ſit communis.

LII.

*Quid menti  
& corpori  
uniuocè con-  
ueniat. &  
quomodo  
iſta cognoſ-  
catur.*

Poſſunt autem ſubſtantia corporea, & mens, ſive ſubſtantia cogitans, creata, ſub hoc communi conceptu intelligi; quod ſint res, quæ ſolo Dei concurſu egerint ad exiſtendum. Verum tamen non poteſt ſubſtantia primum animaduerſi ex hoc ſolo, quod ſit res exiſtens, quia hoc ſolum per ſe nos non afficit: ſed facile ipſam agnoſcimus ex quolibet ejus attributo, per communem illam notionem, quod nihil nulla ſint attributa, nullæve proprietates, aut qualitates. Ex hoc enim, quod aliquod attributum ad eſſe percipiamus, concludimus, aliquam rem exiſtentem, ſive ſubſtantiam cui illud tribui poſſit, neceſſario etiam ad eſſe.

LIII.

*Cuiusque  
ſubſtantix  
unum eſſe  
præcipuum  
attributum,  
ut mentis  
cogitatio,  
corporis ex-  
tenſio.*

Et quidem ex quolibet attributo ſubſtantia cognoſcitur: ſed una tamen eſt cuiusque ſubſtantix præcipua proprietas, quæ ipſius naturam eſſentiamque conſtituit, & ad quam alix omnes referuntur. Nempe extenſio in longum, latum & profundum, ſubſtantix corporeæ naturam conſtituit; & cogitatio conſtituit naturam ſubſtantix cogitantis. Nam omne aliud quod corpori tribui poteſt, extenſionem præſupponit, eſtque tantum modus quidam rei extenſæ; ut & omnia, quæ in mente reperimus, ſunt tantum diverſi modi cogitandi. Sic exempli cauſa, figura non niſi in re extenſa poteſt intelligi, nec motus niſi in ſpatio extenſo; nec imaginatio, vel ſenſus, vel voluntas, niſi in re cogitante. Sed è contra poteſt intelligi extenſio ſine figura vel motu, & cogitatio ſine imaginatione, vel ſenſu, & ita de reliquis: ut cuiſlibet attendenti ſit manifeſtum.

LIV.

*Quomodo  
claras &  
diſtinctas  
notiones ha-  
bere poſſi-  
mus ſubſtan-  
tiæ cogitan-  
tis, & cor-  
poris, item  
Dei.*

Atque ita facile poſſumus duas claras & diſtinctas habere notiones, ſive ideas, unam ſubſtantix cogitantis creatæ, aliam ſubſtantix corporeæ; ſi nempe attributa omnia cogitationis ab attributis extenſionis accurate diſtinguamus. Ut etiam habere poſſumus ideam claram & diſtinctam ſubſtantix cogitantis increatæ atque independentis, id eſt, Dei; modo ne illam adæquate omnia quæ in Deo ſunt exhibere ſupponamus, nec quidquam etiam in ea eſſe fin-

figamus, sed ea tantum advertamus, quæ revera in ipsa continentur, quæque evidenter percipimus ad naturam entis summe perfecti pertinere. Nec certe quisquam talem ideam Dei nobis inesse negare potest, nisi qui nullam plane Dei notitiam in humanis mentibus esse arbitretur.

Duratio, ordo, & numerus, à nobis etiam distinctissime intelliguntur, si nullum iis substantiæ conceptum affingamus, sed putemus, durationem rei cujusque, esse tantum modum, sub quo concipimus rem istam, quatenus esse perseverat; Et similiter, nec ordinem, nec numerum esse quicquam diversum à rebus ordinatis, & numeratis, sed esse tantum modos, sub quibus illas consideramus.

Et quidem hîc per modos plane idem intelligimus, quod alibi per attributa, vel qualitates. Sed cum consideramus substantiam ab illis affici, vel variari, vocamus modos; cum ab ista variatione talem posse denominari, vocamus qualitates; ac denique, cum generalius spectamus, tantum ea substantiæ inesse, vocamus attributa. Ideoque in Deo non proprie modos aut qualitates, sed attributa tantum esse dicimus, quia nulla in eo variatio est intelligenda. Et etiam in rebus creatis, ea quæ nunquam in iis diverso modo se habent, ut existentia & duratio, in re existente & durante, non qualitates, aut modi, sed attributa dici debent.

Alia autem sunt in rebus ipsis, quarum attributa vel modi esse dicuntur; alia vero in nostra tantum cogitatione. Ita cum tempus à duratione generaliter sumpta distinguiamus, dicimusque esse numerum motus, est tantum modus cogitandi. Neque enim profecto intelligimus in motu aliam durationem quam in rebus non motis: ut patet ex eo, quod si duo corpora, unum tarde, aliud celeriter, per horam moveatur, non plus temporis in uno quam in alio numeremus, etsi multo plus sit motus. Sed ut rerum omnium durationem metiamur, comparamus illam cum duratione motuum illorum maximorum, & maxime æquilibrium, à quibus fiunt anni & dies; hancque durationem tempus vocamus. Quod proinde nihil, præter modum cogitandi, durationi generaliter sumptæ superaddit.

Ita etiam cum numerus non in ullis rebus creatis, sed tantum in abstracto, sive in genere consideratur, est modus cogitandi duntaxat: Ut & alia omnia quæ universalia vocamus.

Fiunt-

L V.  
*Quomodo duratio, ordo, numerus etiam, distincte intelligantur.*

LVI.  
*Quid sint modi, qualitates, attributa.*

LVII.  
*Quaedam attributa esse in rebus: alia in cogitatione. Et quid duratio & tempus.*

LVIII.  
*Numerum, & universalis omnia, esse tantum modos cogitandi.*

LIX.  
*Quomodo  
 universalia  
 fiant: &  
 qua sint  
 quinque  
 vulgata;  
 genus, spe-  
 cies, diffe-  
 rentia, pro-  
 prium, ac-  
 cidentis.*

Fiuntque hæc universalia ex eo tantum, quod unâ & eâdem ideâ utamur ad omnia individua, quæ inter se similia sunt, cogitanda: Ut etiam unum & ideam nomen omnibus rebus per ideam istam præsentatis imponimus, quod nomen est universale. Ita cum videmus duos lapides, nec ad ipsorum naturam, sed ad hoc tantum quod duo sunt, attendimus, formamus ideam ejus numeri quem vocamus binarium; cumque postea duas aves, aut duas arbores videmus, nec etiam earum naturam, sed tantum, quod duæ sint, consideramus, repetimus eandem ideam quam prius, quæ ideo est universalis; ut & hunc numerum eodem universali nomine binarium appellamus. Eodemque modo, cum spectamus figuram tribus lincis comprehensam, quandam ejus ideam formamus, quam vocamus ideam trianguli; & eâdem postea ut universali utimur, ad omnes alias figuras tribus lincis comprehensas animo nostro exhibendas. Cumque advertimus, ex triangulis alios esse habentes unum angulum rectum, alios non habentes, formamus ideam universalem trianguli rectanguli, quæ, relata ad præcedentem ut magis generalem, species vocatur; Et illa anguli rectitudo, est differentia universalis, qua omnia triangula rectangula ab aliis distinguuntur; Et quod in iis basis potentia æqualis sit potentiis laterum, est proprietas iis omnibus & solis conveniens: Ac denique, si supponamus, aliquos ejusmodi triangulos moveri, alios non moveri, hoc erit in iis accidens universale. Atque hoc pacto quinque universalia vulgo numerantur, genus, species, differentia, proprium, & accidens.

LX.  
*De distin-  
 ctionibus.  
 Ac primo  
 de reali.*

Numerus autem in ipsis rebus oritur ab earum distinctione: quæ distinctio triplex est, realis, modalis, & rationis. Realis proprie tantum est inter duas vel plures substantias: Et has percipimus à se mutuo realiter esse distinctas, ex hoc solo, quod unam absque alterâ clare & distincte intelligere possimus. Deum enim agnoscentes, certi sumus, ipsum posse efficere; quicquid distincte intelligimus; adeo ut, exempli causâ, ex hoc solo, quod jam habeamus ideam substantiæ extensæ sive corporeæ, quamvis nondum certo sciamus, ullam talem revera existere, certi tamen simus, illam posse existere; atque si existat, unamquamque ejus partem à nobis cogitatione definitam realiter ab aliis ejusdem substantiæ partibus esse distinctam. Itemque ex hoc solo, quod unusquisque intelligat, se esse rem cogitantem, & possit cogitatione excludere à se ipso omnem aliam

aliam substantiam, tam cogitantem quàm extensam, certum est, unumquemque, sic spectatum, ab omni alia substantia cogitante, atque ab omni substantia corporea, realiter distingui. Ac etiamsi supponamus, Deum alicui tali substantiæ cogitanti substantiam aliquam corpoream tam arctè conjunxisse, ut arctius jungi non possint, & ita ex illis duabus unum quid confluxisse, manent nihilominus realiter distinctæ; quia quantumvis arctè ipsas univerit, potentia, quam ante habebat ad eas separandas, sive ad unam absque aliâ conservandam, se ipsum exuere non potuit, & quæ vel à Deo possunt separari, vel se junctim conservari, realiter sunt distincta.

Distinctio modalis est duplex, alia scilicet inter modum proprie dictum, & substantiam, cujus est modus; alia inter duos modos ejusdem substantiæ. Prior ex eo cognoscitur, quod possimus quidem substantiam clare percipere absque modo, quem ab illâ differre dicimus, sed non possumus vice versâ modum illum intelligere sine ipsâ. Vt figura & motus distinguuntur modaliter à substantiâ corporea, cui insunt; ut etiam affirmatio & recordatio à mente. Posterior vero cognoscitur ex eo, quod unum quidem modum absque alio possumus agnoscere, ac vice versa; sed neutrum tamen sine eâdem substantiâ cui insunt: Vt si lapis moveatur, & fit quadratus, possumus quidem intelligere ejus figuram quadratam sine motu, & vice versâ, ejus motum sine figurâ quadratâ; sed nec illum motum, nec illam figuram possumus intelligere sine lapidis substantia. Distinctio autem quâ modus unius substantiæ differt ab aliâ substantiâ, vel à modo alterius substantiæ, ut motus unius corporis ab alio corpore, vel à mente, atque ut motus à duratione; realis potius dicenda esse videtur, quam modalis; quia modi illi non clare intelliguntur sine substantiis realiter distinctis, quarum sunt modi.

Denique distinctio rationis, est inter substantiam & aliquod ejus attributum, sine quo ipsa intelligi non potest; vel inter duo talia attributa ejusdem alicujus substantiæ. Atque agnoscitur ex eo, quod non possumus clam & distinctam istius substantiæ ideam formare, si ab ea illud attributum excludamus; vel non possumus unius ex ejusmodi attributis ideam clare percipere, si illud ab alio separemus. Vt quia substantia quævis, si cesset durare, cessat etiam esse, ratione tantum à duratione sua distinguitur; Et omnes

LXI.  
*De Distinctione modalis.*

LXII.  
*De Distinctione rationis.*

modi cogitant, quos tanquam in objectis consideramus, ratione tantum differunt, tum ab objectis de quibus cogitantur, tum à se mutuo in uno & eodem objecto. Memini quidem, me alibi hoc genus distinctionis cum modali conjunxisse; nempe in fine responsionis ad primas objectiones, in Meditationes de primâ Philosophiâ; sed ibi non erat occasio de ipsis accurate discernendi, & sufficiebat ad meum institutum, quòd utramque à reali distinguerem.

LXIII.  
*Quomodo cogitatio & extensio distincte cognoscitur, ut constituentes naturam mentis & corporis.*

Cogitatio & extensio spectari possunt ut constituentes naturas substantiæ intelligentis & corporeæ; tuncque non aliter concipi debent, quam ipsa substantia cogitans & substantia extensa, hoc est, quam mens & corpus; quo pacto clarissime ac distinctissime intelliguntur. Quin & facilius intelligimus substantiam extensam, vel substantiam cogitantem, quam substantiam solam, omisso eo quod cogitet vel sit extensa. Nonnulla enim est difficultas, in abstrahenda notione substantiæ à notionibus cogitationis vel extensionis, quæ scilicet ab ipsa ratione tantum diversæ sunt; & non distinctior sit conceptus ex eo, quod pauciora in eo comprehendamus, sed tantum ex eo, quod illa quæ in ipso comprehendimus, ab omnibus aliis accurate distinguamus.

LXIV.  
*Quomodo etiam ut modi substantiæ.*

Cogitatio & extensio sumi etiam possunt pro modis substantiæ; quatenus scilicet una & eadem mens plures diversas cogitationes habere potest; atque unum & idem corpus, retinendo suam eandem quantitatem, pluribus diversis modis potest extendi; nunc scilicet magis secundum longitudinem, minusque secundum latitudinem, vel profunditatem, ac paulo post è contra magis secundum latitudinem, & minus secundum longitudinem. Tuncque modaliter à substantia distinguuntur, & non minus clare ac distincte quam ipsa possunt intelligi; modo non ut substantiæ, sive res quædam ab aliis separata, sed tantummodo ut modi rerum spectentur. Per hoc enim, quod ipsas in substantiis quarum sunt modi consideramus, eas ab his substantiis distinguimus, & quales revera sunt agnoscimus. At è contrario, si easdem absque substantiis, quibus insunt, vellemus considerare, hoc ipso illas ut res subsistentes spectaremus, atque ita ideas modi & substantiæ confunderemus.

LXV.  
*Quomodo ipsarum modis sunt etiam cognoscendi.*

Eâdem ratione diversos cogitationum modos, ut intellectiorem, imaginationem, recordationem, volitionem, &c. itemque diversos modos extensionis, sive ad extensionem pertinentes, ut figuras omnes, & situs partium, & ipsarum motus, optime percipimus,

piemus, si tantum ut modos rerum quibus insunt spectemus; & quantum ad motum, si de nullo nisi locali cogitemus, ac de vi, à qua excitatur, (quàm tamen suo loco explicare conabor) non inquiramus.

Superfunt sensus, affectus, & appetitus. Qui quidem etiam clare percipi possunt, si accurate caveamus, ne quid amplius de iis judicemus, quam id præcise, quod in perceptione nostra continetur, & cujus intime conscii sumus. Sed perdifficile est, id observare, saltē circa sensus; quia nemo nostrum est, qui non ab ineunte ætate judicârit, ea omnia quæ sentiebat, esse res quasdam extra mentem suam existentes, & sensibus suis, hoc est, perceptionibus, quas de illis habebat, plane similes; adeo ut, videntes, exempli gratia, colorem, putaverimus, nos videre rem quandam extra nos positam, & plane similem ideæ illi coloris, quam in nobis tunc experiebamur; idque, ob consuetudinem ita judicandi, tam clare & distincte videre nobis videbatur, ut pro certo & indubitato haberemus.

Idemque plane est de aliis omnibus quæ sentiuntur, etiam de titillatione ac dolore. Quavis enim hæc extra nos esse non putentur; non tamen ut in sola mente, sive in perceptione nostrâ, solent spectari, sed ut in manu, aut in pede, aut quavis alia parte nostri corporis. Nec sane magis certum est, cum, exempli causâ, dolorem sentimus, tanquam in pede, illum esse quid extra nostram mentem in pede existens, quàm cum videmus lumen tanquam in Sole, illud lumen extra nos in Sole existere; sed utraque ista præjudicia sunt primæ nostræ ætatis, ut infra clare apparebit.

Vt autem hic quod clarum est, ab eo quod obscurum, distinguamus, diligentissime est advertendum, dolorem quidem & colorem, & reliqua ejusmodi, clare & distincte percipi, cum tantummodo ut sensus sive cogitationes spectantur. Cum autem res quædam esse judicantur extra mentem nostram existentes, nullo plane modo posse intelligi quænam res sint, sed idem plane esse, cum quis dicit se videre in aliquo corpore colorem, vel sentire in aliquo membro dolorem, ac si diceret se id ibi videre vel sentire, quod quidnam sit plane ignorat, hoc est, se nescire, quid videat aut sentiat. Etsi enim minus attendendo, sibi facile persuadeat se nonnullam ejus habere noticiam, ex eo quod supponat esse quid simile sensui illi coloris, aut doloris, quem apud se experitur; si tamen examinet quidnam

LXVI.  
*Quomodo sensus, affectus & appetitus, clare cognoscantur; quavis sæpe de iis male judicemus.*

LXVII.  
*In ipso de dolore judicio sæpe nos falli.*

LXVIII.  
*Quomodo in istis id, quod clare cognoscimus, ab eo in quo falli possumus, sit distinguendum.*

fit, quod iste sensus coloris, vel doloris, tanquam in corpore colorato, vel in parte dolente existens repræsentet, omnino advertet se id ignorare.

LXIX.  
*Lange aliter cognoscitur magnitudinem, figuram, &c. quam colores, dolores, &c.*

Præsertim si consideret, se longe alio modo cognoscere, quidnam sit in viso corpore magnitudo, vel figura, vel motus, (saltem localis; Philosophi enim alios quosdam motus à locali diversos effingendo, naturam ejus sibi minus intelligibilem reddiderunt) vel situs, vel duratio, vel numerus; & similia, quæ in corporibus clare percipi jam dictum est; quàm quid in eodem corpore sit color, vel dolor, vel odor, vel sapor, vel quid aliud ex iis, quæ ad sensus dixi esse referenda. Quamvis enim videntes aliquod corpus, non magis certi simus illud existere, quatenus apparet figuratum, quàm quatenus apparet coloratum; longe tamen evidentius, agnoscimus, quid sit in eo esse figuratum, quam quid sit esse coloratum.

LXX.  
*Nos posse diuina modis de sensibilibus iudicium ferre, quorum uno errorem præcavimus, alio in errorem incidimus.*

Patet itaque, in re idem esse, cum dicimus, nos percipere colores in objectis, ac si diceremus, nos percipere aliquid in objectis, quod quidem quid sit ignoramus, sed à quo efficitur in nobis ipsis sensus quidam valde manifestus & perspicuus; qui vocatur sensus colorum. In modo autem judicandi permagna est divorsitas. nam quamdiu tantum judicamus aliquid esse in objectis (hoc est, in rebus, qualescunque demum illæ sint, à quibus sensus nobis advenit) quod quidnam sit ignoramus, tantum abest ut fallamur, quin potius in eo errorem præcavimus, quod advertentes nos aliquid ignorare, minus proclives simus ad temere de ipso judicandum. Cum vero putamus nos percipere colores in objectis, etsi revera nesciamus quidnam sit, quod tunc nomine coloris appellamus, nec ullam similitudinem intelligere possimus, inter colorem quem supponimus esse in objectis, & illum quem experimur esse in sensu; quia tamen hoc ipsum non advertimus, & multa alia sunt, ut magnitudo, figura, numerus, &c. quæ clare percipimus, non aliter à nobis sentiri vel intelligi, quam ut sunt, aut saltem esse possunt in objectis; facile in eum errorem delabimur, ut judicemus, id, quod in objectis vocamus colorem, esse quid omnino simile colori quem sentimus, atque ita ut id, quod nullo modo percipimus, à nobis clare percipi arbitremur.

LXXI.  
*Præcipuam errorum causam à præjudiciis infantia procedere.*

Hicque primam & præcipuam errorum omnium causam licet agnoscere. Nempe in prima ætate mens nostra tam arcte corpori erat alligata, ut non aliis cogitationibus vacaret, quàm ius solis, per



per quas ea sentiebat quæ corpus afficiebant, necdum ipsas ad quidquam extra se positum referebat, sed tantum ubi quid corpori incommodum occurrebat, sentiebat dolorem; ubi quid commodum sentiebat, voluptatem; & ubi sine magno comodo vel incommodo corpus afficiebatur, pro diversitate partium in quibus, & modorum quibus afficiebatur, habebat diversos quosdam sensus, illos scilicet quos vocamus sensus saporum, odorum, sonorum, caloris, frigoris, luminis, colorum, & similibus, quæ nihil extra cogitationem positum repræsentant: Simulque etiam percipiebat magnitudines, figuras, motus, & talia; quæ illi non ut sensus, sed ut res quædam, vel rerum modi, extra cogitationem existentes, aut saltem existendi capaces, exhibebantur, etsi hanc inter ista differentiam nondum notaret. Ac deinde cum corporis machinamentum, quod sic à natura fabricatum est, ut propriâ suâ vi variis modis moveri possit, hinc inde temere se contorquens, casu commodum quid affiquebatur, aut fugiebat incommodum, mens illi adhærens incipiebat advertere, id, quod ita affiquebatur, aut fugiebat, extra se esse; nec tantum illi tribuebat magnitudines, figuras, motus, & talia, quæ ut res aut rerum modos percipiebat, sed etiam sapes, odores, & reliqua, quorum in se sensum ab ipso effici advertebat. Atque omnia tantum referens ad utilitatem corporis, cui erat immersa, eo plus aut minus rei esse putabat in unoquoque objecto à quo afficiebatur, prout plus aut minus ab ipso afficiebatur. Vnde factum est, ut multo plus substantiæ, seu corporcitatæ, esse putaret in saxo aut metallo, quam in aqua vel aëre, quia plus duritiæ & ponderositatis in iis sentiebat. Quin & aërem, quandiu nullum in eo ventum, aut frigus, aut calorem experiebat, pro nihilo profus ducebat. Et quia non plus luminis à stellis, quam ab exiguis flammis lucernarum ipsi affulgebat, idcirco nullas stellas flammis istis majores sibi repræsentabat. Et quia nec terram in gyrum verti, nec ejus superficiem in globum curvatam esse notabat, ideo proclivior erat ad putandum, & eam immobilem, & ejus superficiem planam esse. Milleque aliis ejusmodi præjudiciis, à prima infantia mens nostra imbuta est; quæ deinde in pueritia non recordabatur fuisse à se sine sufficienti examine recepta, sed tanquam sensu cognita, vel à natura sibi indita, pro verissimis, evidentissimisque adunifit.

LXXII.  
*Alteram errorum causam esse, quod præjudiciorum obliuisci nequeamus.*

Et quamvis jam maturis annis, cum mens non amplius tota corpori seruit, nec omnia ad illud refert, sed etiam de rerum, in se ipsi spectatarum, veritate inquiri, per multa ex iis, quæ sic antea iudicauit, falsa esse deprehendat; non tamen ideo facile ipsa ex memoria sua expungit; & quamdiu in ea hærent, variorum errorum causæ esse possunt. Ita, exempli causa, quoniam à prima ætate stellas imaginati sumus perexiguas, etsi jam rationes Astronomicæ perspicue nobis ostendant, ipsas esse quam maximas, tantum tamen præjudicata opinio adhuc valet, ut nobis perdifficile sit, ipsas aliter quam prius imaginari.

LXXIII.  
*Tertiam causam esse, quod defatigemur, ad ea quæ sensibus præsentia non sunt attendendo: Et ideo assueti sumus de illis non ex præsentis perceptione, sed ex præconceptione iudicare.*

Præterea mens nostra non sine aliqua difficultate ac defatigatione potest ad ulla res attendere; oniniumque difficillime ad illa attendit, quæ nec sensibus, nec quidem imaginationi præsentia sunt: Sive quia talem ex eo quod corpori conjuncta sit, habet naturam; sive quia in primis annis, cum tantum circa sensus & imaginationes occuparetur, maiorem de ipsis quam de cæteris rebus cogitandi usum & facilitatem acquisiuit. Hinc autem fit, ut jam multi nullam substantiam intelligant, nisi imaginabilem, & corpoream, & etiam sensibilem. Neque enim norunt, ea sola esse imaginabilia, quæ in extensione, motu & figura consistunt, etsi alia multa intelligibilia sint; nec putant, quidquam posse subsistere quod non sit corpus; nec denique ullum corpus non sensibile. Et quia reuera nullam rem, qualis ipsa est, sensu solo percipimus, ut infra clare ostendetur, hinc accidit, ut plerique in tota vita nihil nisi confuse percipiant.

LXXIV.  
*Quartam causam esse, quod conceptus nostros verbis, quæ rebus accurate non respondent, alligemus.*

Et denique propter loquelæ usum, conceptus omnes nostros verbis, quibus eos exprimimus, alligamus, nec eos nisi simul eum istis verbis memoriæ mandamus: Cumque facilius postea verborum quam rerum recordemur, vix unquam ullius rei conceptum habemus tam distinctum, ut illum ab omni verborum conceptu separemus: cogitationesque hominum fere omnium, circa verba magis, quam circa res, versantur; adeo ut persæpe vocibus non intellectis præbeant assensum, quia putant, se illas olim intellexisse, vel ab aliis qui eas recte intelligebant accepisse. quæ omnia, quamvis accurate hic tradi non possint, quia natura humani corporis nondum fuit exposita, necdum probatum est, ullum corpus existere, videntur tamen satis posse intelligi, ut iuuent ad claros & distinctos conceptus ab obscuris & confusis dignoscendos.

Ita-

Itaque ad serio philosophandum, veritatemque omnium rerum cognoscibilem indagandam, primo omnia præjudicia sunt deponenda; sive, accurate est cavendum, ne ullis ex opinionibus olim à nobis receptis fidem habeamus, nisi prius, iis ad novum examen revocatis, veras esse comperiamus. Deinde ordine est attendendum ad notiones, quas ipsimet in nobis habemus, eaque omnes & solæ, quas sic attendendo clare ac distincte cognoscemus, judicandæ sunt veræ. Quod agentes, inprimis advertemus, nos existere, quatenus sumus naturæ cogitantis; Et simul etiam, & esse Deum, & nos ab illo pendere, & ex ejus attributorum consideratione cæterarum rerum veritatem posse indagari, quoniam ille est ipsarum causa; Et denique præter notiones Dei & mentis nostræ, esse etiam in nobis noticiam multarum propositionum æternæ veritatis, ut quod ex nihilo nihil fiat, &c. itemque naturæ cujusdam corporeæ, sive extensæ, divisibilis, mobilis, &c. itemque sensuum quorundam qui nos afficiunt, ut doloris, colorum, saporum, &c. quamvis nondum sciamus quæ sit causa, cur ita nos afficiant. Et hæc conferentes cum iis quæ confusius antea cogitabamus, usum claros & distinctos omnium rerum cognoscibilem conceptus formandi acquiremus. Atque in his paucis, præcipua cognitionis humanæ principia contineri mihi videntur.

LXXV.  
Summa eorum  
quæ  
observanda  
sunt ad re-  
fle-  
tendum  
philoso-  
phandum.

Præter cætera autem, memoriæ nostræ pro summa regula est infigendum, ea quæ nobis à Deo revelata sunt, ut omnium certissima esse credenda; Et quanvis forte lumen rationis, quam maxime clarum & evidens, aliud quid nobis suggerere videretur, soli tamen auctoritati divinæ potius, quam proprio nostro judicio, fidem esse adhibendam: Sed in iis, de quibus fides divina nihil nos docet, minime decere hominem philosophum aliquid pro vero assumere, quod verum esse nunquam perspexit; & magis fidere sensibus, hoc est, inconsideratis infantæ lux judiciis, quam maturæ rationi.

LXXVI.  
Aurora-  
tem divi-  
nam perce-  
ptioni nostræ  
esse præfe-  
rendam: sed  
in seclusa  
non decere  
Philosophum  
aliis quam  
perceptis  
asseniri.

PRINCIPIORVM  
PHILOSOPHIÆ

PARS SECVNDA.

*De Principiis rerum materialium.*

I.  
*Quibus ra-  
tionibus re-  
rum mate-  
rialium exi-  
stentia certo  
cognoscatur.*



¶ Si nemo non sibi satis persuadeat, res materiales exi-  
stere, quia tamen hoc à nobis paulo ante in dubium  
revocatum est, & inter primæ nostræ ætatis præjudi-  
cia numeratum, nunc opus est, ut rationes investige-  
mus, per quas id certo cognoscatur. Nempe quicquid  
sentimus, præcui dubio nobis advenit à re aliqua, quæ à mente no-  
stra diversa est. Neque enim est in nostra potestate efficere, ut unum  
potius quam aliud sentiamus; sed hoc à re illa quæ sensus nostros  
afficit plane pendet. Quæri quidem potest an res illa sit Deus, an  
quid à Deo diversum; Sed quia sentimus, sive potius à sensu impulsî  
clare ac distincte percipimus materiam quandam extensam in lon-  
gum, latum & profundum, cujus variæ partes variis figuris præditæ  
sunt, ac variis motibus cidentur; ac etiam efficiunt ut varios sensus  
habeamus, colorum, odorum, doloris, &c. si Deus immediate per  
se ipsum istius materiæ extensæ ideam menti nostræ exhiberet, vel  
tantum si efficeret, ut exhiberetur à re aliqua, in qua nihil esset ex-  
tensionis, nec figuræ, nec motus; nulla ratio potest excogitari, cur  
non deceptor esset putandus. Ipsam enim clare intelligimus tan-  
quam rem, à Deo, & à nobis sive à mente nostra, plane diversam;  
ac etiam clare videre nobis videmur, ejus ideam à rebus extra nos  
positis, quibus omnino similis est, advenire: Dei autem naturæ pla-  
ne repugnare ut sit deceptor, jam ante est animadvertum. Atque  
ideo hic omnino concludendum est, rem quandam extensam in lon-  
gum, latum & profundum, omnesque illas proprietates quas rei  
extensæ convenire clare percipimus habentem, existere. Estque hæc  
res extensa, quam corpus sive materiam appellamus.

II.  
*Quibus es-  
sentiæ cogno-*

Eadem ratione menti nostræ corpus quoddam magis actum, quam  
reliqua alia corpora, conjunctum esse, concludi potest, ex eo quod  
per-

perspicue advertamus, dolores, aliosque sensus nobis ex improviso advenire; quos mens est conscia non à se sola proficisci, nec ad se posse pertinere ex eo solo quod sit res cogitans, sed tantum ex eo quod alteri cuidam rei extensæ ac mobili adjuncta sit, quæ res humanum corpus appellatur. Sed accuratior ejus rei explicatio non est hujus loci.

Satis erit, si advertamus, sensuum perceptiones non referri, nisi ad istam corporis humani cum mente conjunctionem, & nobis quidem ordinarie exhibere, quid ad illam externa corpora professe possint, aut nocere; non autem, nisi interdum & ex accidenti, nos docere, qualia in se ipsis existant. Ita enim sensuum præjudicia facile deponemus; & solo intellectu, ad ideas sibi à natura inditas diligenter attendente, hic utemur.

Quod agentes, percipiemus, naturam materiæ, sive corporis in universum spectati, non consistere in eo quod sit res dura, vel ponderosa, vel colorata, vel alio aliquo modo sensus afficiens; sed tantum in eo, quod sit res extensa in longum, latum & profundum. Nam quantum ad duritiem, nihil aliud de illa sensus nobis indicat, quam partes durorum corporum resistere motui manuum nostrarum, cum in illas incurrunt. Si enim quotiescunque manus nostræ versus aliquam partem moventur, corpora omnia ibi existentia recederent eadem celeritate, qua illæ accedunt, nullam unquam duritiem sentiremus. Nec ullo modo potest intelligi, corpora quæ sic recederent idcirco naturam corporis esse amissura, nec proinde ipsa in duritie consistit. Eademque ratione ostendi potest, & pondus, & colorem, & alias omnes ejusmodi qualitates, quæ in materia corporea sentiuntur, ex ea tolli posse, ipsa integra remanente: unde sequitur, à nulla ex illis ejus naturam dependere.

Dux vero adhuc causæ supersunt, ob quas potest dubitari, an vera natura corporis in sola extensione consistat. Vna est, quod multi existimant, pleraque corpora sic posse rarefieri, ac condensari, ut rarefacta plus habeant extensionis quam condensata; sintque etiam nonnulli adeo subtiles, ut substantiam corporis ab ejusdem quantitate, atque ipsam quantitatem ab extensione distinguant. Altera est, quod ubi nihil aliud esse intelligimus, quam extensionem in longum, latum & profundum, non soleamus dicere ibi esse corpus, sed tantummodo spatium, & quidem spatium inane; quod fere omnes sibi persuadent esse purum nihil.

*scatur, corpus humanum menti esse arte conjunctum.*

III.  
*Sensuum perceptiones, non quid verum sit in rebus; sed quid humano composito proficiat vel obfit, docere.*

IV.  
*Naturam corporis non in pondere, in duritie, colore, aut similibus; sed in sola extensione consistere.*

V.  
*Præjudicia de rarefactione, & de vacuo, hanc corporis naturam obscuriorem facere.*

D

Sed

VI.  
*Quando  
has rarefa-  
tio.*

Sed quantum ad rarefactionem & condensationem, quicumque ad cogitationes suas attendet, ac nihil volet admittere nisi quod clare percipiat, non putabit in ipsis aliud quidquam contingere, quam figuræ mutationem; ita scilicet, ut rara corpora illa sint, inter quorum partes multa intervalla existunt, corporibus aliis repleta; & per hoc tantum densiora reddantur, quod ipsorum partes, ad invicem accedentes, intervalla ista inminuant, vel plane tollant: quod ultimum si aliquando contingat, tunc corpus tam densum evadit, ut repugnet ipsum densius reddi posse. Atqui non ideo minus tunc extensum est, quam cum partes habens à se inutuo diffitas majus spatium amplectitur: quia quicquid extensionis in poris, sive intervallis à partibus ejus relictis, continetur, nullo modo ipsi tribui debet, sed aliis quibusvis corporibus, à quibus intervalla ista replentur. Ut cum videmus spongiam, aqua vel alio liquore turgentem, non putamus, ipsam secundum singulas suas partes magis extensam, quam cum compressa est & sicca; sed tantummodo poros habere magis patentes, ac ideo per majus spatium esse diffusam.

VII.  
*Eam non  
posse ullo  
alio modo  
intelligibi-  
licari.*

Et sane non video, quid moverit nonnullos, ut mallent dicere, rarefactionem fieri per augmentationem quantitatis, quam ipsam hoc spongiæ exemplo explicare. Nam etsi cum aër aut aqua rarefunt, non videamus ullos ipsorum poros qui ampliores reddantur, nec ullum novum corpus, quod ad illos replendos accedat; non est tamen rationi tam consentaneum, aliquid non intelligibile effingere, ad eorum rarefactionem verbotenus explicandam, quam ex hoc, quod rarefiant, concludere, in ipsis esse poros, sive intervalla quæ ampliora redduntur, & novum aliquod corpus accedere, quod ipsa implet, etsi hoc novum corpus nullo sensu percipiamus. nulla enim ratio nos cogit ad credendum, corpora omnia quæ existunt debere sensus nostros afficere. Ac rarefactionem per facile hoc modo, non autem ullo alio, fieri posse percipimus. Ac denique plane repugnat, aliquid nova quantitate, vel nova extensione augeri, quin simul etiam nova substantia extensa; hoc est, novum corpus ei accedat: Neque enim ullum additamentum extensionis vel quantitatis, sine additamento substantiæ, quæ sit quanta & extensa, potest intelligi, ut ex sequentibus clarius patebit.

VIII.  
*Quantita-  
tem & nu-*

Quippe quantitas à substantia extensa in re non differt, sed tantum ex parte nostri conceptus, ut & numerus à re numerata. Ita scili-

scilicet ut totam naturam substantiæ corporeæ, quæ est in spatio decem pedum, possimus considerare, quamvis ad istam mensuram decem pedum non attendamus; quia plane eadem intelligitur in qualibet istius spatii parte ac in toto. Et vice versa, potest intelligi numerus denarius, ut etiam quantitas continua decem pedum, etsi ad istam determinatam substantiam non attendamus: quia plane idem est conceptus numeri denarii, sive ad hanc mensuram decem pedum, sive ad quilibet aliud referatur; & quantitas continua decem pedum, etsi non possit intelligi sine aliqua substantia extensa, cujus sit quantitas, potest tamen sine hac determinata. In re autem fieri non potest, ut vel minimum quid ex ista quantitate aut extensione tollatur, quin tantundem etiam de substantia detrahatur; nec vice versa, ut tantillum de substantia detrahatur, quin tantundem de quantitate ac extensione tollatur.

Et quamvis forte nonnulli aliud dicant, non puto tamen ipsos aliud ea de re percipere; sed cum substantiam ab extensione, aut quantitate distinguunt, vel nihil per nomen substantiæ intelligunt, vel confusam tantum substantiæ incorporeæ ideam habent, quam falso tribuunt corporeæ; hujusque substantiæ corporeæ veram ideam extensioni relinquunt, quam tamen accidens vocant: atque ita plane aliud efferunt verbis, quam mente comprehendant.

Non etiam in re differunt spatium, sive locus internus, & substantia corporea in eo contenta, sed tantum in modo, quo à nobis concipi solent. Revera enim extensio in longum, latum & profundum, quæ spatium constituit, eadem plane est cum illa, quæ constituit corpus. Sed in hoc differentia est, quod ipsam in corpore ut singularem consideremus, & putemus semper mutari quoties mutatur corpus; in spatio vero unitatem tantum genericam ipsi tribuamus, adeo ut mutato corpore quod spatium implet, non tamen extensio spatii mutari censeatur, sed remanere una & eadem, quamdiu manet ejusdem magnitudinis ac figuræ, servatque eundem situm inter externa quædam corpora, per quæ illud spatium determinamus.

Et quidem facile agnoscemus, eandem esse extensionem, quæ naturam corporis & naturam spatii constituit, nec magis hæc duo à se mutuo differre, quàm natura generis aut speciei differre à natura individui, si attendentes ad ideam, quam habemus, alicujus corporis, exempli causâ lapidis, rejiciamus ab illa id omne, quod ad cor-

*merum differre tantum ratione à re quantitate & numerata.*

IX.

*Substantiam corpoream, cum à quantitate sua distinguitur, confuse concipitur, quam incorpoream.*

X.

*Quid sit spatium, sive loci interni.*

XI.

*Quomodo in re non differat à substantiâ corporeâ.*

poris naturam non requiri cognoscimus: nempe rejiciamus primo duritiem, quia si lapis liquefiat, aut in pulvisculos quàm minutissimos dividatur; illam amittet, neque tamen ideo desinet esse corpus; rejiciamus etiam colorem, quia vidimus sæpe lapides adeo pellucidos, ut nullus in iis esset color; rejiciamus gravitatem, quia quanvis ignis sit levissimus, non ideo minus putatur esse corpus: ac denique rejiciamus frigus, & calorem, aliasque omnes qualitates, quia vel non considerantur in lapide, vel iis mutatis, non ideo lapis corporis naturam amisisse existimatur. Ita enim advertemus, nihil plane in ejus idea remanere, præterquam quod sit quid extensum in longum, latum & profundum; quod idem continetur in idea spatii, non modo corporibus plenis, sed ejus etiam quod vacuum appellatur.

XII.  
*Quomodo  
ab eadem  
differat in  
modo, quo  
conspicitur.*

Est autem differentia in modo concipiendi. nam sublato lapide ex spatio vel loco in quo est, putamus, etiam ejus extensionem esse sublata, utpote quam ut singularem & ab ipso inseparabilem spectamus; sed interim extensionem loci, in quo erat lapis, remanere arbitramur, eandemque esse, quanvis jam ille locus lapidis à ligno, vel aquâ, vel aëre, vel alio quovis corpore occupentio in gepetur, vel etiam vacuum esse credatur. Quia ibi consideratur exnere, censeturque eadem esse lapidis, ligni, aquæ, aëris, aliorumque corporum, vel etiam ipsius vacui, si quod datur, modo tantum sit ejusdem magnitudinis ac figuræ, servetque eundem situm inter corpora externa, quæ spatium illud determinant.

XIII.  
*Quid sit lo-  
cus exter-  
nus.*

Quippe nomina loci aut spatii, non significant quicquam diversum à corpore, quod dicitur esse in loco; sed tantum ejus magnitudinem, figuram, & situm inter alia corpora designant. Et quidem ut ille situs determinetur, respicere debemus ad alia aliqua corpora, quæ ut immobilia spectemus: Ac prout ad diversa respicimus, dicere possumus, eandem rem eodem tempore locum mutare, ac non mutare. Ut cum navis in mari provehitur, qui sedet in puppi manet semper uno in loco, si ratio habeatur partium navis, inter quas eundem situm servat; & ille idem assidue locum mutat, si ratio littorum habeatur, quoniam assidue ab unis recedit, & ad alia accedit. Ac præterea, si putemus, terram moveri; tantumque præcise procedere ab Occidente versus Orientem, quantum navis interim ex Oriente in Occidentem promovetur;

dice-



dicemus rursus, illum qui sedet in puppi, locum suum non mutare: quia nempe loci determinationem ab inmotis quibusdam cœli punctis desumimus. Sed si tandem cogitemus, nulla ejusmodi puncta vere immota in universo reperi, ut probabile esse infra ostendetur; inde concludemus, nullum esse permanentem ullius rei locum, nisi quatenus à cogitatione nostra determinatur.

Differunt autem nomina loci & spatii, quia locus magis expresse designat situm, quàm magnitudinem aut figuram; & è contra, magis ad has attendimus, cum loquimur de spatio. Dicimus enim frequenter, unam rem in locum alterius succedere, quamvis non sit accurate ejusdem magnitudinis, nec figuræ; sed tunc negamus, illam idem spatium occupare; ac semper, cum ille situs mutatur, dicimus, locum mutari, quamvis eadem magnitudo ac figura permaneat: Cumque dicimus, rem esse in hoc loco, nihil aliud intelligimus, quam illam obtinere hunc situm inter alias res; & cum addimus, ipsam implere hoc spatium, vel hunc locum, intelligimus præterea, ipsam esse hujus determinatæ magnitudinis, ac figuræ.

Atque ita spatium quidem semper sumimus pro extensione in longum, latum & profundum. Locum autem aliquando consideramus, ut rei, quæ in loco est, internum, & aliquando ut ipsi externum. Et quidem internus idem plane est quod spatium; externus autem sumi potest pro superficie quæ proxime ambit locatum. Notandumque est, per superficiem non hîc intelligi ullam corporis ambientis partem, sed solum terminum; qui medius est inter ipsum corpus ambiens; & id quod ambitur; quique nihil aliud est quàm modus: vel certe intelligi superficiem in communi, quæ non sit pars unius corporis magis quàm alterius, sed eadem semper esse censeatur, cum retinet eandem magnitudinem & figuram. Etsi enim omne corpus ambiens cum sua superficie mutetur; non ideo res quam ambit, locum mutare existimatur, si eundem interim situm servet inter illa externa, quæ tanquam immobilia spectantur. Ut si navim à vento, tam æqualiter impelli supponamus, ut situm suum inter ripas non mutet, facile aliquis credet, ipsam manere in eodem loco, quamvis omnis superficies ambiens mutetur.

Vacuum autem philosophico more sumptum, hoc est, in quo

XIV.

*In quo differunt locus & spatium.*

XV.

*Quomodo locus externus pro superficie corporis ambientis recte sumatur.*

XVI.

*Repugnare*

*ut detur  
vacuum si-  
ve in quo  
nulla plane  
sit res.*

nulla plane sit substantia, dari non posse, manifestum est **ex eo**, quod extensio spatii vel loci interni non differat ab extensione corporis. Nam cum ex hoc solo, quod corpus sit extensum in longum, latum & profundum, recte concludamus, illud esse substantiam; quia omnino repugnat ut nihil sit aliqua extensio: idem etiam de spatio, quod vacuum supponitur, est concludendum; quod nempe cum in eo sit extensio, necessario etiam in ipso sit substantia.

XVII.  
*Vacuum ex  
vulgi usu  
non exclu-  
dere omne  
corpus.*

Et quidem ex vulgi usu per nomen vacui non solemus significare locum vel spatium in quo nulla plane sit res, sed tantummodo locum in quo nulla sit ex iis rebus, quas in eo esse debere cogitamus. Sic quia urna facta est ad aquas continendas, vacua dicitur, cum aëre tantum est plena; Sic nihil est in piscina, licet aquis abundet, si in eâ defint pisces; Sic inane est navigium, quod comparatum erat ad vehendas merces, si solis arenis, quibus frangat impetus venti, sit onustum; Sic denique inane est spatium, in quo nihil est sensibile, quamvis materia creata & per se subsistente plenum sit; quia non solemus considerare, nisi eas res quæ à sensibus attinguntur. Atqui si postea, non attendentes, quid per nomina vacui & nihili sit intelligendum, in spatio quod vacuum esse diximus, non modo nihil sensibile, sed omnino nullam rem contineri existimemus; in eundem errorem incidemus, ac si ex eo quod usitatum sit dicere, urnam in quâ nihil est nisi aër, vacuum esse, ideo judicaremus, aërem in ea contentum non esse rem subsistentem.

XVIII.  
*Quomodo  
emendan-  
dum sit præ-  
iudicium de  
vacuo abso-  
lute siempro.*

Lapsique sumus fere omnes à prima ætate in hunc errorem, propterea quod non advertentes, ullam esse inter vas & corpus in eo contentum necessariam conjunctionem; non putavimus, quicquam obstare, quo minus saltem Deus efficiat, ut corpus, quod vas aliquod replet, inde auferatur, & nullum aliud in ejus locum succedat: jam autem, ut errorem illum emendemus, considerare oportet, nullam quidem esse connexionem inter vas & hoc vel illud corpus particulare quod in eo continetur, sed esse maximam ac omnino necessariam inter vasis figuram concavam & extensionem in genere sumptam, quæ in eâ cavitate debet contineri; adeo ut non magis repugnet nos concipere montem sine valle, quàm intelligere istam cavitatem absque extensione in eâ contentâ, vel hanc extensionem absque substantia quæ sit extensa: quia, ut sæpe dictum est, nihili nulla potest esse extensio. Ac proinde si quæretur, quid fiet, si Deus aufe-

auferat omne corpus quod in aliquo vase continetur, & nullum aliud in ablati locum venire permittat? respondendum est, vasis latera sibi invicem hoc ipso fore contigua. cum enim inter duo corpora nihil interjacet, necesse est ut se mutuo tangant. ac manifeste repugnat, ut distent, sive ut inter ipsa sit distantia, & tamen ut ista distantia sit nihil; quia omnis distantia est modus extensionis, & ideo sine substantiâ extensâ esse non potest.

Postquam sic advertimus, substantiâ corporeâ naturam in eo tantum consistere, quod sit res extensa; ejusque extensionem non esse diversam ab ea, quæ spatio quantumvis inani tribui solet; facile cognoscimus, fieri non posse, ut aliqua ejus pars plus spatii occupet unâ vice quàm aliâ, sicque aliter rarefat, quàm modo paullo ante explicato; vel ut plus sit materiæ, sive substantiâ corporeâ in vase, cum plumbo, vel auro, vel alio quantumvis gravi ac duro corpore plenum est, quàm cum aërem tantum continet, vacuumque existinat. quia partium materiæ quantitas non pendet ab earum gravitate, aut duritie, sed à sola extensione, quæ semper in eodem vase est æqualis.

Cognoscimus etiam, fieri non posse ut aliquæ atomi, sive materiæ partes ex natura sua indivisibiles existant. Cum enim, si quæ sint, necessario debeant esse extensæ, quantumvis parvæ fingantur, possumus adhuc unamquamque ex ipsis in duas aut plures minores cogitatione dividere, ac proinde agnoscere esse divisibiles. Nihil enim possumus cogitatione dividere, quin hoc ipso cognoscamus esse divisibile; atque ideo, si judicaremus, id ipsum esse indivisibile, judicium nostrum à cognitione dissentiret. Quin etiam si fingamus, Deum efficere voluisse, ut aliqua materiæ particula in alias minores dividi non possit, non tamen illa proprie indivisibilis erit dicenda. Ut etenim effecerit eam a nullis creaturis dividi posse, non certe sibi ipsi ejusdem dividendæ facultatem potuit adimere; quia fieri plane non potest, ut propriam suam potentiam imminuat: queinadmodum supra notatum est. Atque ideo absolute loquendo, illa divisibilibis remanebit, quoniam ex natura sua est talis.

Cognoscimus præterea, hunc mundum, sive substantiâ corporeâ universitatem, nullos extensionis suæ fines habere. Vbicunque enim fines illos esse fingamus, semper ultra ipsos aliqua spatia indefinite extensa, non modo imaginamur, sed etiam vere imaginabilia, hoc est, realia esse percipimus; ac proinde etiam substantiam corporeâ,

XIX.  
*Ex his ea confirmari, que de rarefactione dicta sunt.*

XX.  
*Ex his etiam demonstrari, nullos atomos dari posse.*

XXI.  
*Item mundum esse indefinite extensum.*

corpoream indefinite extensam in iis contineri. Quia, ut jam fufe ostensum est, idea ejus extensionis, quam in spatio qualicumque concipimus, eadem plane est cum idea substantiæ corporeæ.

XXII.  
*Item unam  
& eandem  
esse mate-  
riam cali &  
terre; ac  
plures mun-  
dos esse non  
posse.*

Hincque etiam colligi facile potest, non aliam esse materiam cœli quam terræ; atque omnino si mundi essent infiniti, non posse non illos omnes ex una & eadem materiâ constare; nec proinde plures, sed unam tantum esse posse: quia perspicue intelligimus, illam materiam cujus natura in eo solo consistit quod sit substantia extensa, omnino omnino spatia imaginabilia, in quibus alii isti mundi esse deberent, jam occupare; nec ullius alterius materiæ ideam in nobis reperimus.

X XIII.  
*Omniem ma-  
teriam varia-  
tionem, sive  
omnem ejus  
formarum  
diversitatem  
pendere à motu.*

Materia itaque in toto universo una & eadem existit, utpote quæ omnis per hoc unum tantum agnoscitur, quod sit extensa. Omnesque proprietates, quas in eâ clare percipimus, ad hoc unum reducuntur quod sit partibilis, & mobilis secundum partes; & proinde capax illarum omnium affectionum, quas ex ejus partium motu sequi posse percipimus. Partitio enim, quæ fit solâ cogitatione, nihil mutat; sed omnis materiæ variatio, sive omnium ejus formarum diversitas, pendet à motu. Quod passim etiam à Philosophis videtur fuisse animadversum; quia dixerunt naturam esse principium motus & quietis. Tunc enim per naturam intellexerunt id, per quod res omnes corporeæ tales evadunt quales ipsas esse experiunt.

XXIV.  
*Quid sit mo-  
tus juxta  
vulgarem  
sensum.*

Motus autem, (scilicet localis. neque enim ullus alius sub cogitationem meam cadit; nec ideo etiam ullum alium in rerum natura fingendum puto) motus, inquam, ut vulgo sumitur, nihil aliud est quam *actio, quâ corpus aliquod ex uno loco in alium migrat.* Et idcirco, quemadmodum supra monuimus, eandem rem eodem tempore dici posse locum mutare ac non mutare; ita eadem etiam dici potest moveri & non moveri. Vt qui sedet in navi, dum ea solvit è portu, putat quidem se moveri, si respiciat ad littora, eaque ut immota consideret; non autem si ad ipsam navim, inter cujus partes eundem semper situm servat. Quin etiam, quatenus vulgo putamus in omni motu esse actionem, in quiete vero cessationem actionis, magis proprie tunc dicitur quiescere quàm moveri, quia nullam in se actionem sentit.

XXV.  
*Quid sit mo-  
tus proprie  
sumptus.*

Sed si non tam ex vulgi usu, quàm ex rei veritate, consideremus, quid per motum debeat intelligi, ut aliqua ei determinata natura tribuatur; dicere possumus, esse *translationem unius partu materia, sive*

unum corporis, ex vicinia eorum corporum, quæ illud immediate contingunt, & tanquam quiescentia spectantur, in viciniam aliorum. Vbi per unum corpus, sive unam partem materiæ, intelligo id omne quod simul transfertur; etsi rursus hoc ipsum constare possit ex multis partibus, quæ alios in se habeant motus; Et dico esse translationem, non vim vel actionem quæ transfert; ut ostendam, illum semper esse in mobili, non in movente, quia hæc duo non satis accurate solent distinguui; ac esse duntaxat ejus modum, non rem aliquam subsistentem, licet figura est modus rei figuratæ, ac quies rei quiescentis.

Quippe notandum est, in magno nos, in hoc præjudicio laborare, quod plus actionis ad motum requiri arbitremur, quàm ad quietem. Hocque ideo nobis ab ineunte ætate persuasimus, quod corpus nostrum soleat moveri à nostra voluntate, cujus intime conscii sumus, & quiescere ex hoc solo, quod terræ adhæreat per gravitatem, cuius vim non sentimus. Et quidem quia ista gravitas, aliæque plures causæ è nobis non animadvertæ, motibus quos in membris nostris ciere volumus, resistunt, efficiuntque ut fatigemur, putamus, majore actione sive majore vi opus esse ad motum ciendum, quàm ad illum sistendum; sumentes scilicet actionem pro conatu illo quo utimur ad membra nostra & illorum ope alia corpora permovenda. Quod tamen præjudicium facile exuemus, si consideremus, non modo conatu nobis opus esse ad movenda corpora externa, sed sæpe etiam ad eorum motus sistendos, cum à gravitate aliave causa non sistuntur. Vt exempli gratiâ non majori utimur actione ad navigium in aqua stagnante quiescens impellendum, quam ad idem, cum movetur, subito retinendum, vel certe non multo majori: hinc enim demenda est aquæ ab eo sublevatæ gravitas; & ejusdem lentor, à quibus paulatim silti posset.

Cum autem hic non agatur de illa actione, quæ intelligitur esse in movente, vel in eo qui motum sistit, sed de sola translatione, ac translationis absentia, sive quiete; manifestum est, hanc translationem extra corpus motum esse non posse, atque hoc corpus alio modo se habere, cum transfertur, & alio cum non transfertur, sive cum quiescit: adeo ut motus & quies nihil aliud in eo sint, quam duo diversi modi.

Addidi præterea, translationem fieri ex vicinia corporum continguorum, in viciniam aliorum, non autem ex uno loco in alium: quia, ut supra explicui, loci acceptio variâ est, ac pendet à nostra cogitatione:

XXVI.

*Non plus  
actionis re-  
quiri ad mo-  
tum, quàm  
ad quietem.*

XXVII.

*Motum &  
quietem ef-  
fe tantum  
diversos  
modos cor-  
poris moti.*

XXVIII.

*Motum pro-  
prie sicutum  
non referri,*


*nisi ad cor-  
pora conti-  
gua ejus  
quod move-  
tur.*

XXIX.  
*Nec referri  
nisi ad ea  
corpora con-  
tigua, quæ  
tanquam  
quiescentia  
spectantur.*

tione: sed cum per motum intelligimus eam translationem, quæ fit ex vicinia corporum contiguorum, quoniam una tantum corpora, eodem temporis momento ejusdem mobilis, contigua esse possunt, non possumus isti mobili plures motus eodem tempore tribuere, sed unum tantum.

Addidi denique, translationem illam fieri ex vicinia, non quorumlibet corporum contiguorum, sed eorum duntaxat, quæ tanquam quiescentia spectantur. Ipsa enim translatio est reciproca, nec potest intelligi corpus A B transferri ex vicinia corporis C D, quin simul etiam intelligatur corpus C D transferri ex vicinia corporis A B: Ac plane eadem vis & actio requiritur ex una parte atque ex altera. Quapropter si omnino propriam, & non ad aliud relictam naturam motui tribuere vellemus, cum duo corpora contigua, unum in unam, aliud in aliam partem transferuntur, sicque à se mutuo separantur, tantumdem motus in uno quam in altero esse diceremus. Sed hoc à communi loquendi usu nimium abhorreret. cum enim assueti simus stare in terra, eamque ut quiescentem considerare, quamvis aliquas ejus partes aliis minoribus corporibus contiguas ab eorum vicinia transferri videamus, non tamen ipsam ideo moveri putamus.

XXX.  
*Cur ex duobus corporibus contiguis quæ separantur ab invicem, novum potius quam aliud moveri dicatur.*



Hujusque rei præcipua ratio est, quod motus intelligatur esse totius corporis quod movetur, nec possit ita intelligi esse totius terræ, ob translationem quarundam ejus partium, ex vicinia minorum corporum quibus contiguæ sunt; quoniam sæpe plures ejusmodi translationes sibi mutuo contrarias in ipsa licet advertere. Ut si corpus E F G H sit terra, & supra ipsam eodem tempore corpus A B transferatur ab E versus F, ac C D ab H versus G, quamvis hoc ipso partes terræ corpore A B contiguæ, à B versus A transferantur, neque minor vel alterius naturæ actio in eis esse debeat ad illam translationem, quam in corpore A B; non ideo intelligimus, terram moveri à B versus A, sive ab Occidente versus Orientem; quia pari ratione ob id quod ejus partes corpore C D contiguæ transferantur à C versus D, intelligendum esset, eam


eam etiam in aliam partem moveri, nempe ab Oriente in Occidentem; quæ duo inter se pugnant. Ita ergo, ne nimium à communi usu loquendi recedamus, non huc dicemus, terram moveri, sed sola corpora AB & CD; atque ita de reliquis. Sed interim recordabimur, id omne quod reale est ac positivum in corporibus quæ moventur, propter quod moveri dicuntur, reperiri etiam in aliis ipsorum contiguis, quæ tamen ut quiescentia tantum spectantur.

Et si autem unumquodque corpus habeat tantum unum motum sibi proprium, quoniam ab unis tantum corporibus sibi contiguis & quiescentibus recedere intelligitur, participare tamen etiam potest ex aliis innumeris, si nempe sit pars aliorum corporum alios motus habentium. Vt si quis ambulans in navi horologium in peragestet, ejus horologii rotulæ nisi tantum motu sibi proprio movebuntur, sed participabunt etiam ex alio, quatenus adjunctæ homini ambulanti unam cum illo materiæ partem componunt, & ex alio quatenus erunt adjunctæ navigio in mari fluctuanti, & ex alio quatenus adjunctæ ipsi mari, & denique alio quatenus adjunctæ ipsi terræ, si quidem tota terra moveatur: Omnesque hi motus revera erunt in rotulis istis; sed quia non facile tam multi simul intelligi, nec etiam omnes agnosci possunt, sufficiet, unicum illum, qui proprius est cujusque corporis, in ipso considerare.

Ac præterea ille unicus cujusque corporis motus, qui ei proprius est, instar plurium potest considerari: ut cum in rotis curruum duos diversos distinguimus, unum scilicet circularem circa ipsarum axem, & alium rectum, secundum longitudinem viæ per quam feruntur. Sed quod ideo tales motus non sint revera distincti, patet ex eo, quod unumquodque punctum corporis quod movetur, unam tantum aliquam lineam describat. Nec refert, quod ista linea sæpe sit valde contorta, & ideo à pluribus diversis motibus genita videatur, quia possumus imaginari, eodem modo quamcunque lineam, etiam rectam, quæ omnium simplicissima est, ex infinitis diversis motibus ortam esse. Vt si linea AB feratur versus CD, & eodem tempore punctum A feratur versus B, linea recta AD, quam hoc punctum A describet, non minus pendebit à duobus motibus rectis, ab A in B, & ab AB in CD, quam linea curva, quæ à quo-

XXXI.  
*Quomodo in eodem corpore innumeri diversi motus esse possint.*

XXXII.  
*Quomodo etiam motus proprie sumptus, qui in quoque corpore unicus est, pro pluribus sumi possit.*





vis rotæ puncto describitur, pendet à motu recto & circulari. Ac proinde quamvis sæpe utile sit unum motum in plures partes hoc pacto distinguere, ad faciliorem ejus perceptionem, absolute tamen loquendo, unus tantum in unoquoque corpore est numerandus.

XXXIII.

*Quantitas  
in omni mo-  
tu integer  
circulus cor-  
porum simul  
mouetur.*

Ex hoc autem, quod supra fuerit animadvertum, loca omnia corporibus plena esse, semperque eandem materiæ partes æqualibus locis coæquari; sequitur, nullum corpus moveri posse nisi per circulum, ita scilicet, ut aliud aliquod corpus ex loco quem ingreditur expellat, hocque rursus aliud, & aliud, usque ad ultimum, quod in locum à primo derelictum, eodem temporis momento, quo derelictus est, ingrediatur. Hocque facite intelligimus in circulo perfecto, quia videmus, nullum vacuum, nullamque rarefactionem, aut



condensationem requiri, ut pars circuli A moveatur versus B, modo eodem tempore pars B moveatur versus C, C versus D, ac D versu A. Sed idem intelligi etiam potest in circulo non perfecto, & quantumlibet irregulari: modo advertatur, quo pacto omnes locorum inæqualitates inæquali motuum celeritate possint compensari. Sic tota materia contenta in spatio EFGH, circulariter moveri potest absque ulla condensatione vel vacuo, & eodem tempore ejus pars quæ est versus E, transire versus G, ac ea quæ est versus G; transire versus E; modo tantum ut spatium in G supponitur esse quadruplo latius quam in E, ac duplo quam in F & H, ita etiam quadruplo celerius moveatur in E quam in G,

ac



ac duplo celerius quam in F vel H; Atque ita reliquis omnibus in locis motus celeritatem angustiam loci compenset: Hoc enim pacto, in quovis determinato tempore, tantundem materiæ per unam istius circuli partem, quam per alteram, transibit.

Fatendum tamen est, in motu isto aliquid reperiri, quod mens quidem nostra percipit esse verum, sed tamen, quo pacto fiat, non comprehendit, nempe divisionem quarundam particularum materiæ in infinitum, sive indefinitam, atque in tot partes, ut nullam cogitatione determinare possimus tam exiguam, quin intelligamus, ipsam in alias adhuc minores re ipsa esse divisam. Fieri enim non potest, ut materia quæ jam implet spatium G, successive impleat omnia spatia innumeris gradibus minora, quæ sunt inter G & E; nisi aliqua ejus pars, ad innumerabiles illorum spatiorum mensuras figuram suam accommodet: quod ut fiat, necesse est omnes imaginabiles ejus particulas, quæ sunt revera innumeræ, à se mutuo aliquantum removeri, & talis quantulacunque remotio, vera divisio est.

Notandum autem, me hîc non loqui de tota materia, sed tantum de aliqua ejus parte. Quamvis enim supponamus, duas aut tres ejus partes esse in G, tantæ latitudinis, quantæ est spatium E, itemque etiam plures alias minores, quæ maneant indivisæ; nihilominus intelligi potest eas moveri circulariter versus E, modo quædam aliæ ipsis admixtæ sint, quæ se quomodolibet inflectant, & figuras suas sic mutant, ut junctæ istis figuras suas non ita mutantibus, sed solam celeritatem motus ad rationem loci occupandi accommodantibus, omnes angulos quos istæ aliæ non occupabunt accurate compleant. Et quamvis, quomodo fiat indefinita ista divisio, cogitatione comprehendere nequeamus, non ideo tamen debemus dubitare quin fiat; quia clare percipimus, illam necessario sequi ex natura materiæ nobis evidentissimè cognita, percipimusque etiam, eam esse de genere eorum quæ à mente nostra, utpote finita, capi non possunt.

Motus natura sic animadversa, considerare oportet ejus causam, eamque duplicem: Primo scilicet universalem & primariam, quæ est causa generalis omnium motuum qui sunt in mundo; ac deinde particularem, à qua fit, ut singulæ materiæ partes motus, quos prius non habuerunt, acquirant. Et generalem quod atinet, manifestum mihi videtur illam non aliam esse, quam Deum ipsum, qui

XXXIV.  
*Hinc sequi  
divisionem  
materiæ in  
particulas  
revera in-  
definitas,  
quamvis  
eæ nobis sint  
incompre-  
hensibiles.*

XXXV.  
*Quomodo  
fiat ista di-  
visio; &  
quod non sit  
dubitandum,  
quod  
fiat, etsi non  
comprehendatur.*

XXXVI.  
*Deum esse  
primariam  
motus cau-  
sam; &  
eamdem sem-  
per motus  
quantita-  
tem in uni-  
verso con-  
servare.*

materiam simulcum motu & quiete in principio creavit, jamque per solum suum concursuum ordinarium tantundem motus & quietis in ea tota quantum tunc posuit conservat. Nam quamvis ille motus nihil aliud sit in materia mota quam ejus modus; certam tamen & determinatam habet quantitatem, quam facile intelligimus eandem semper in tota rerum universitate esse, quamvis in singulis ejus partibus mutetur. Ita scilicet ut putemus, cum una pars materiæ duplo celerius movetur quam altera, & hæc altera duplo major est quam prior, tantundem motus esse in minore quam in majore, ac quanto motus unius partis lentior sit, tanto motum alicujus alterius ipsi æqualis fieri celeriores. Intelligimus etiam, perfectionem esse in Deo, non solum quod in se ipso sit immutabilis, sed etiam quod modo quam maxime constanti & immutabili operetur: A deo utiis mutationibus exceptis, quas evidens experientia, vel divina revelatio certas reddit, quasque sine ulla in creatore mutatione fieri percipimus, aut credimus, nullas alias in ejus operibus supponere debemus, ne qua inde inconstantia in ipso arguatur. Vnde sequitur quam maxime rationi esse consentaneum, ut putemus ex hoc solo, quod Deus diversimode moverit partes materiæ, cum primum illas creavit, jamque totam istam materiam conservet, eodem plane modo, eademque ratione qua prius creavit, eum etiam tantundem motus in ipsa semper conservare.

XXXVII.

*Prima lex  
naturæ  
quod una-  
queque res  
quantum in  
se est, semper  
in eodem  
statu perse-  
veret; sique  
quod semel  
moveretur  
semper mo-  
veri pergat.*

Atque ex hac eadem immutabilitate Dei, regulæ quædam sive leges naturæ cognosci possunt, quæ sunt causæ secundariæ ac particulares diversorum motuum, quos in singulis corporibus advertimus. Harum prima est, unamquamque rem, quatenus est simplex & indivisa, manere quantum in se est in eodem semper statu, nec unquam mutari nisi à causis externis. Ita si pars aliqua materiæ sit quadrata, facile nobis persuademus, illam perpetuo mansuram esse quadratam, nisi quid aliunde adveniat quod ejus figuram mutet; Si quiescat, non credimus, illam unquam incepsuram moveri, nisi ab aliqua causa ad id impellatur; Nec ulla major ratio est si moveatur, cur putemus, ipsam unquam sua sponte, & à nullo alio impeditam, motum illum suum esse intermissuram. Atque ideo concludendum est, id quod movetur, quantum in se est semper moveri. Sed quia hic versamur circa terram, cujus constitutio talis est, ut motus omnes qui prope illam fiunt, brevi sistantur, & sæpe ob causas quæ sensus nostros latent; ideo ab incunte ætate sæpe judicavimus, eos motus, qui

qui sic à causis nobis ignotis sistebantur, sua sponte desinere: Iamque proclives sumus ad illud de omnibus existimandum; quod videtur in multis esse experti; nempe illos ex natura sua cessare, si-ve tendere ad quietem. Quod profecto legis naturæ quam maxime aduersatur; quies enim motui est contraria, nihilque ad suum contrarium, siue ad destructionem sui ipsius, ex propria natura ferri potest.


Et vero quotidiana experientia in iis quæ projiciuntur, regulam nostram omnino confirmat. Neque enim alia ratio est, cur projecta perseverent aliquandiu in motu, postquam à manu jaciente separata sunt, quam quia semel mota pergunt moveri, donec ab obviis corporibus retardentur. Et manifestum est, ipsa solere ab aëre, aliisve quibuslibet fluidis corporibus in quibus moventur, paulatim retardari, atque ideo motum ipsorum diu durare non posse. Aërem enim motibus aliorum corporum resistere, ipso sensu tactus possumus experiri, si flabello ipsum percutiamus; idemque volatus avium confirmat. Et nullus alius est liquor, quin non manifestius adhuc aër motibus projectorum resistat.

Altera lex naturæ est; unamquamque partem materiæ seorsum spectatam non tendere unquam, ut secundum ulla lines obliquas pergat moveri, sed tantummodo secundum rectas, etsi multæ sæpe cogantur deflectere propter occursum aliarum, atque, ut paulo ante dictum est, in quolibet motu fiat quodammodo circulus ex omni materia simul mota. Causa hujus regulæ eadem est quæ præcedentis, nempe immutabilitas, & simplicitas operationis, per quam Deus motum in materia conservat; Neque enim illum conservat, nisi præcise qualis est eo ipso temporis momento quo conservat, nullâ habitâ ratione ejus qui forte fuit paulo ante. Ac quamvis nullus motus fiat in instanti, manifestum tamen est, omne id quod movetur, in singulis instantibus, quæ possunt designari dum movetur, determinatum esse ad motum suum continuandum versus aliquam partem, secundum lineam rectam, non autem unquam secundum ullam lineam curvam. Ut ex causâ, lapis A, in funda EA per circulum ABF rotatus, eo instanti, quo est in puncto A, determinatus quidem est ad motum versus aliquam partem, nempe secundum lineam rectam versus C, ita scilicet ut linea recta AC, sit tangens circuli. Non autem fingi potest illum determinatum esse ad ullum motum curvum: etsi enim prius venerit

XXXVIII.  
*De motu  
projectorum.*

XXXIX.  
*Altera lex  
naturæ;  
quod omnis  
motus ex se  
ipso sit re-  
ctus. Et ideo  
quæ circula-  
riter moven-  
tur, tendere  
semper, ne  
cedant à  
centro cir-  
culi quem  
describunt.*

ex



ex L ad A, per lineam curvam, nihil tamen istius curvitatæ intelligi potest in eo remanere, dum est in puncto A. Hocque etiam experienciâ confirmatur; quia si tunc è funda egrediatur; non perget moveri versus B, sed versus C. Ex quo sequitur, omne corpus quod circulariter movetur, perpetuo tendere, ut recedat à centro circuli quem describit. Ut ipso manûs sensu experimur in lapide, dum illum fundâ circumagimus. Et quia consideratione istâ in sequentibus sæpe utemur, diligenter erit advertenda, fufusque infra exponetur.

XL.

*Tertia lex: quod unum corpus alteri forti occurrendo nihil amittat de suo motu, occurrendo vero minus forti, tantum amittat, quantum in illud transfert.*

Tertia lex naturæ hæc est. Vbi corpus quod movetur alteri occurrit, si minorem habeat vim ad pergendum secundum lineam rectam, quam hoc alterum ad ei resistendum, tunc deflectitur in aliam partem, & motum suum retinendo solam motus determinationem amittit; si vero habeat majorem, tunc alterum corpus secum movet, ac quantum ei dat de suo motu, tantumdem perdit. Ita experimur, dura quælibet corpora projecta, cum in aliud durum corpus impingunt, non ideo à motu cessare, sed versus contrariam partem reflecti; contra vero, cum occurrunt corpori molli, quia facile in illud motum omnem suum transmittunt, ideo statim ad quietem reduci.

duci. Atque omnes causæ particulares mutationum, quæ corporibus accidunt, in hac tertia lege continentur; saltem eæ quæ ipsæ corporeæ sunt. an enim & qualem mentes humanæ vel Anglicæ vim habeant corpora movendi, non jam inquirimus; sed ad tractationem de homine reservamus.

Demonstratur autem prior pars hujus legis ex eo, quod differentia sit inter motum in se spectatum, & ipsius determinationem versus certam partem; qua fit, ut ista determinatio possit mutari, motu integro remanente. Cum enim, ut ante dictum est, unaquæque res, non composita, sed simplex, qualis est motus, semper esse perseveret, quamdiu à nulla causâ externa destruitur; & in occurfu duri corporis appareat quidem causâ quæ impediât, ne motus alterius corporis, cui occurrit, maneat determinatus versus eandem partem; non autem ulla, quæ motum ipsum tollat, vel minuat, quia motus motui non est contrarius; hinc sequitur, illum idcirco minui non debere.

Demonstratur etiam pars altera, ex immutabilitate operationis Dei, mundum eâdem actione, quâ olim creavit, continuo jam conservantis. Cum enim omnia corporibus sint plena, & nihilominus uniuscujusque corporis motus tendat in lineam rectam, perspicuum est, Deum ab initio mundum creando, non modo diversas ejus partes diversimode movisse, sed simul etiam effecisse, ut unæ alias impellerent, motusque suos in illas transferrent: adeo ut jam ipsum conservando eâdem actione, ac cum iisdem legibus, cum quibus creavit, motum non iisdem materiæ partibus semper infixum, sed ex unis in alias, prout sibi mutuo occurrunt, transcurrentem conservet. Sicque hæc ipsa creaturarum continua mutatio, immutabilitatis Dei est argumentum.

Hic vero diligenter advertendum est, in quo consistat vis cujusque corporis ad agendum in aliud, vel ad actioni alterius resistendum: nempe in hoc uno, quod unaquæque res tendat, quantum in se est, ad permanendum in eodem statu in quo est, juxta legem primo loco positam. Hinc enim id quod alteri conjunctum est, vim habet nonnullam, ad impediendum ne disjungatur; id quod disjunctum est, ad manendum disjunctum; id quod quiescit, ad perseverandum in sua quiete, atque ex consequenti ad resistendum iis omnibus quæ illam possunt mutare; id quod movetur, ad perseverandum in suo motu, hoc est, in motu ejusdem celeritatis, & versus eandem partem.

F

XLI.

*Probatio  
prioris par-  
tis hujus re-  
gulæ.*

XLII.

*Probatio  
posteroris  
partis.*

XLIII.

*In quo con-  
sistat vis  
cujusque  
corporis ad  
agendum  
vel resisten-  
dum.*

42 PRINCIPIORVM PHILOSOPHIÆ  
 tem. Visque illa debet æstimari tum à magnitudine corporis in quo  
 est, & superficiæ, secundum quam istud corpus ab alio disjungitur;  
 tum à celeritate motûs, ac naturâ, & contrarietate modi, quo di-  
 versa corpora sibi mutuo occurrunt.

XLIV. *Motum non esse motui contrarium, sed quieti, & determinationem in unam partem determinationem in partem oppositam.* Atque notandum est, unum motum alteri motui æque veloci nullo modo esse contrarium: sed proprie tantum duplicem hinc inveniri contrarietatem. Vnam inter motum & quietem, vel etiam inter motus celeritatem & tarditatem, quatenus scilicet ista tarditas de quietis natura participat: Alteram inter determinationem motus versus aliquam partem, & occursum corporis in illa parte quiescentis, vel aliter moti, atque pro ratione partis, in corpus alteri occurrens movetur. Hæc contrarietas est major vel minor.

XLV. *Quomodo possit determinari, quantum cuiusque corporis motus mutetur propter aliorum corporum occursum; idque per regulas sequentes.* Ex quibus ut possimus determinare, quo pacto singula corpora motus suos augeant vel minuant, vel in alias partes convertant, ob aliorum corporum occursum, oportet tantum calculo subducere, quantum in unoquoque sit virium, sive ad movendum, sive ad motui resistendum, ac pro certo statuere, illud semper, quod valentius est, sortiri suum effectum. Hocque facile calculo subduci posset, si duo tantum corpora sibi mutuo occurrerent, eaque essent perfecte dura, & à reliquis omnibus sic divisa, ut eorum motus à nullis aliis circumjacentibus impedirentur, nec juvarentur; ea enim regulas sequentes observarent.

XLVI. *Prima.* Primo, si duo illa corpora, puta B & C, essent plane æqualia, & æque velociter moverentur, B quidem à dextra versus sinistram, & C illi in directum à sinistra versus dextram, cum sibi mutuo occurrerent, reflecterentur, & postea pergerent moveri, B versus dextram, & C versus sinistram, nullâ parte suæ celeritatis amissâ.



Secundo, si B esset tantillo major quam C, cæteris positis ut prius, tunc solum C reflecteretur, & utrumque versus sinistram eadem celeritate moveretur.

XLVII. *Secunda.*

Tertio, si mole essent æqualia, sed B tantillo celerius moveretur quam C, non tantum ambo pergerent moveri versus sinistram, sed etiam transferretur ex B in C media pars celeritatis quâ hoc ab illo excederet: hoc est, si fuissent prius sex gradus celeritatis in

XLVIII. *Tertia.*

in

in B, & quatuor tantum in C, post motuum occursum unum-  
quodque tenderet versus sinistram, cum quinque gradibus ce-  
leritatis.

Quarto, si corpus C plane quiesceret, essetque paulo majus XLIX.  
quàm B; quacumque cum celeritate B moveretur versus C, nun- *Quarta.*  
quam ipsum C moveret; sed ab eo repelleretur in contrariam par-  
tem; quia corpus quiescens magis resistit magnæ celeritati quàm  
parvæ, idque pro ratione excessus unius supra alteram; & idcirco  
semper major esset vis in C ad resistendum, quàm in B ad im-  
pellendum.

Quinto, si corpus quiescens C, esset minus quàm B, tunc L.  
quantumvis tarde B versus C moveretur, illud secum moveret, *Quinta.*  
partem scilicet sui motus ei talem transferendo, ut ambo postea  
æque celeriter moverentur: nempe si B esset duplo majus quam  
C, transferret ipsi tertiam partem sui motus, quia una illa tertia  
pars tam celeriter moveret corpus C, quàm duæ aliæ residuæ cor-  
pus B duplo majus. Et ita postquam B ipsi C occurrisset, unâ  
tertiâ parte tardius moveretur, quàm prius, hoc est, tantundem  
temporis requireret, ut moveretur per spatium duorum pedum,  
quàm prius ut moveretur per spatium trium. Eodem modo, si B  
esset triplo majus quàm C, transferret ipsi quartam partem sui  
motus; & sic de cæteris.

Sexto, si corpus C quiescens esset accuratissime æquale corpo- L I.  
ri B versus illud moto, partim ab ipso impelleretur, & partim *Sexta.*  
ipsum in contrariam partem repelleret: nempe si B veniret ver-  
sus C, cum quatuor gradibus celeritatis communicaret ipsi C  
unum gradum, & cum tribus residuis reflecteretur versus partem  
adversam.

Denique, si B & C versus eandem partem moverentur, C L II.  
quidem tardius, B autem illud insequens celerius, ita ut ipsum *Septima.*  
tandem attingeret, essetque C majus quàm B; sed excessus ce-  
leritatis in B esset major, quàm excessus magnitudinis in C;  
tunc B transferret tantum de suo motu in C, ut ambo postea æque  
celeriter, & in eandem partes moverentur. Si autem è contra  
excessus celeritatis in B, minor esset quàm excessus magnitudi-  
nis in C, B in contrariam partem reflecteretur, & motum om-  
nium suum retineret. Atque hi excessus ita computantur; Si C  
esset duplo majus quàm B, & B non moveretur duplo celerius

quàm C, ipsum non pelleret, sed in contrariam partem reflecteretur; Si vero magis quàm duplo celerius moveretur, ipsum pelleret. Nempe si C haberet tantum duos gradus celeritatis, & B haberet quinque, demerentur duo gradus ex B: qui translati in C, unum tantum gradum efficerent; quia C est duplo majus quàm B: quo fieret ut duo corpora B & C cum tribus gradibus celeritatis postea moverentur; & ita de cæteris est judicandum. Nec ista egent probatione, quia per se sunt manifesta.

## LIII.

*Harum regularum usum esse difficilem, propterea quod unumquodque corpus a multis simul angitur.*

Sed quia nulla in mundo corpora esse possunt, à reliquis omnibus ita divisa, & nulla circa nos esse solent plane dura, ideo multo difficilius iniri potest calculus, ad determinandum quantum cujusque corporis motus ob aliorum occursum mutetur. Simul enim habenda est ratio eorum omnium quæ illud circumquaque contingunt, eaque quantum ad hoc valde diversos habent effectus, prout sunt dura, vel fluida, quorum ideo diversitas in quo consistat hic est quærendum.

## LIV.

*Quæ sint corpora dura, quæ fluida.*

Nempe sensu teste, non aliam agnoscimus, quàm quod fluidorum partes facile recedant ex locis suis, atque ideo manibus nostris versus illa se inoventibus non resistant; contra autem durorum partes ita sibi mutuo cohæreant, ut non sine vi, quæ sufficiat ad istam illorum cohærentiam superandam, se jungi possint. Et ulterius investigantes, qui fiat, ut quædam corpora sine ulla difficultate loca sua corporibus aliis relinquunt, alia non item; facile advertimus, ea quæ jam sunt in motu, non impedire, ne loca quæ sponte deserunt, ab aliis occupentur; sed ea quæ quiescunt, non sine aliqua vi ex locis suis extrudi possent. Vnde licet colligere, corpora divisa in multas exiguas particulas, motibus à mutuo diversis agitate, esse fluida; ea vero, quorum omnes particule juxta se mutuo quiescunt, esse dura.

## LV.

*Durorum partes nulli nisi glutino simul jungi, quam e arum quies.*


Neque profecto ullum glutinum possumus excogitare, quod particulas durorum corporum firmiter inter se conjungat, quàm ipsarum quies. Quid enim esse posset glutinum istud? non substantia, quia cum particule istæ sint substantiæ, nulla ratio est cur per aliam substantiam potius quàm per se ipsas jungerentur: non etiam est modus ullus diversus à quiete; nullus enim alius magis adversari potest motui, per quem istæ particule separentur, quàm ipsarum quies. Atque præter substantias, & earum modos, nullum aliud genus rerum agnoscimus.

Quan-



Quantum autem ad fluida, etsi sensu non advertamus, ipsorum particulas moveri, quia sunt nimis exiguae, facile tamen ex effectibus id colligitur, praecipue in aëre & aqua, ex eo quod alia multa corpora corrumpant: Neque enim actio ulla corporea, qualis ista corruptio est, sine motu locali esse potest; & causae ipsorum motus infra dicentur. Sed in eo est difficultas, quod istae fluidorum particulae non possint omnes eodem tempore in unamquamque partem ferri; quod tamen requiri videtur, ut non impediant motum corporum ex qualibet parte venientium; quem admodum videmus illas eum non impedire. Nam si, exempli causa, corpus durum B moveatur versus C, ac quaedam ex parti-

tibus fluidi intermedii D ferantur in contrarium à C versus B, hae motum ejus non juvabunt, sed contra magis impedient, quam, si plane essent sine motu. Quae difficultas ut solvatur, recordandum est, non motum, sed quietem, esse motui contrariam; & motus determinationem versus unam partem, esse contrariam ejusdem determinationi versus partem oppositam, ut jam dictum est; itemque omne id quod movetur, tendere semper, ut pergat moveri secundum lineam rectam. Ex his enim patet primo, corpus durum B, dum quiescit, magis opponi sua illa quiete motibus particularum corporis fluidi D simul spectatis, quam iisdem opponeretur suo motu, si moveretur. Ac deinde quantum ad determinationem, verum quidem est, tot esse ex particulis ipsius D, quae moventur à C versus B, quot sunt quae moventur in contrarium. quippe eaedem sunt quae venientes à C, impingunt in superficiem corporis B, ac deinde retorquentur versus C. & quidem singulae ex istis seorsum spectatae, impingentes in B, pellunt ipsum versus F, atque ita magis impediunt, ne moveatur versus C, quam si essent sine motu. sed quia totidem etiam ab F tendunt in B; illudque pellunt versus C; idcirco, quantum ad hoc atinet, B non magis pellitur versus unam partem quam versus alteram, & ideo, nisi quid aliud atcedat, manet immotum. Cujuscunque enim figurae ipsum esse supponamus, semper accu-




rate à totidem particulis fluidi ex una parte pelletur quam ex altera;

LVI.  
*Fluidorum  
 particulas  
 aequali vi  
 versus omnes partes  
 moveri, Et  
 corpus durum in fluido  
 existens,  
 à minimâ  
 vi posse de-  
 terminari  
 ad motum.*

môdo ne fluidum ipsum in ullam partem magis feratur quam in reliquas. Et supponere debemus, B omni ex parte à fluido DF circumdari; Atque si forte non tanta sit istius fluidi quantitas in F quam in D, nihil refert; quia non agit in B se toto, sed duntaxat iis suis partibus quæ superficiem ejus attingunt. Hactenus vero spectavimus B ut innotum; jam si ponamus, ipsum ab aliqua vi, aliunde adveniente, impelli versus C, hæc vis (quantumvis exigua) sufficiet, non quidem ad ipsum se sola movendum, sed ad concurrendum cum particulis corporis fluidi FD, ipsasque determinandas ad illud etiam pellendum versus C, eique partem sui motus communicandam.

L.VII.  
Ejusdem rei  
demonstratio.

Quod ut clarius intelligatur, fingamus primo, corpus durum B nondum esse in fluido FD, sed hujus fluidi particulas *aeioa*, dispositas in modum annuli, moveri circulariter secundum ordinem notarum *aei*; aliasque *onyao* moveri eodem modo secundum ordinem notarum *ony*. Ut enim corpus aliquod sit fluidum, debet ejus particulae moveri pluribus modis, ut jam dictum est. Quiescat deinde corpus durum B in hoc fluido FD inter *a* & *o*, quid fiet? nempe particulae *aeio* impediuntur ab ipso, ne possint transire ab *o* versus *a*, ut absolvant circulum sui motus; itemque particulae *ony*, impediuntur ne pergant ab *a* versus *o*; ac venientes ab *i* versus *o* pellent B versus C; itemque venientes



ab *y* versus *a*, ipsum tantundem repellent versus F; ideoque nullam solæ habebunt vim ad illud movendum, sed reflectentur ab *o* versus *u*, & ab *a* versus *e*, fietque una circulatio ex duabus, secundum ordinem notarum

*aeio* *ony*; Et ita propter occursum corporis B, non quidem sistetur ullo modo ipsarum motus, sed mutabitur tantum determinatio, nec incedent per lineas tam rectas, vel tam prope accedentes ad rectam, quam si in B non impingerent. Tandem denique accedat nova aliqua vis pellens B versus C, hæc vis, quantumvis exigua, juncta ei qua particulae fluidi venientes ab *i* versus *o*, ipsum etiam pellunt versus C, superabit eam qua venientes ab *y* versus *a*, illud in contrariam partem repellunt; atque ideo suffi-

ciet

ciet ad ipsarum determinationem mutandam, & efficiendum ut te-  
 rantur secundum ordinem notarum *ayuo*, in quantum hoc requi-  
 ritur ad motum corporis B non impediendum: quia cum duo cor-  
 pora determinantur ad motum versus partes plane contrarias, & sibi  
 mutuo oppositas, illud in quo major est vis, alterius determinatio-  
 nem debet mutare. Atque quod hic dico de particulis *aeiony*,  
 de omnibus etiam aliis fluidi FD, quæ in B impingunt, est in-  
 telligendum: quod nempe singulæ, ex iis quæ illud pellunt versus  
 C, oppositæ sint totidem aliis, id ipsum in contrariam partem pel-  
 lentibus; quodque perexigua vis illis adjuncta, sufficiat ad harum  
 determinationem mutandam; quodque quamvis nullæ forte descri-  
 bant tales circulos, quales hic repræsentantur *aeio & oiny*, haud  
 dubie tamen omnes circulariter, & aliquibus modis huic æquipol-  
 lentibus moveantur.

Ita ergo mutata determinatione particularum fluidi, quæ impe-  
 diebant ne corpus B moveretur versus C, hoc corpus B omni-  
 no incipiet moveri; & quidem eadem cum celeritate, qua vis à flu-  
 ido diversa illud pellit, si supponamus, in isto fluido nullas esse par-  
 ticulas, quæ non celerius, vel saltem æque celeriter moveantur.  
 Nam si quæ tardius agantur, quatenus ex illis constat, rationem flu-  
 idi non habet, neque tunc sufficit minima quæque vis, ad corpus  
 durum in hoc fluido existens movendum, sed tanta requiritur, ut  
 superet resistantiam quæ oritur ab istarum fluidi particularum tar-  
 ditate. Ac ideo sæpe videmus aërem, aquam & alia fluida multum  
 resistere corporibus, quæ in ipsis valde celeriter aguntur, iisdemque  
 sine ulla difficultate cedere, cum lentius procedunt.

Cum autem corpus B sic movetur versus C, non putandum  
 est, illud accipere suum motum à sola vi externa ipsum impellente,  
 sed maxima ex parte à fluidi particulis; ita scilicet, ut eæ quæ com-  
 ponunt circulos *aeio & ayuo*, tantum amittant de suo motu,  
 quantum acquirunt eæ particulae corporis duri B, quæ sunt inter  
 o & a; quippe quæ jam faciunt partem motuum circularium *aeio a*  
 & *ayuo a*: quamvis prout ulterius procedent versus C, novis  
 semper fluidi particulis jungantur.

Supereft tantum hic explicandum, cur paulo ante non dixerim,  
 mutari absolute determinationem particularum *ayuo*, sed mutari  
 in quantum hoc requiritur, ad motum corporis B non impediendu-  
 dum. Quippe hoc corpus B, non potest celerius moveri, quam à

LVIII.  
*Si quæ fluidi  
 particula  
 tardius mo-  
 veantur,  
 quam corpus  
 durum in eo  
 existens, il-  
 lud hac in  
 parte fluidi  
 rationem  
 non habere.*

LIX.  
*Corpus du-  
 rum ab alio  
 duro impul-  
 sum, non  
 omnem suum  
 motum ab eo  
 mutuari,  
 sed partim  
 etiam à flu-  
 ido circum-  
 jacente.*

LX.  
*Non posse  
 tamen ab  
 isto fluido  
 majorem*

*celeritatem  
acquirere,  
quam hâ-  
beat à duro,  
à quo impul-  
sum est.*

vi adventitia impulsus est; quamvis sæpe omnes particule fluidi FD multo plus habeant agitationis. Hocque unum est ex iis, quæ nobis inter philosophandum præcipue sunt observanda, ut ne cui causæ ullum effectum tribuamus, qui potentiam ejus excedat. Ita ponentes corpus durum B in medio fluidi FD prius iuotum, nunc ab externa aliqua vi, exempli causa, à manu mea, tardo motu impelli, cum hæc sola impulsio meæ manûs sit causa cur moveatur; credi non debet, ipsum celerius moveri quam impellitur. & quavis omnes fluidi particule multo celerius moveantur, non putandum est, eas determinari ad motus circulares *αειοα* & *αγυοα* & similes, qui sint celeriores hac impulsione, sed ipsas, quatenus celerius aguntur, in quaslibet alias partes, ut prius, ferri.

## LXI.

*Cum corpus  
fluidum in-  
tum simul  
versus ali-  
quam par-  
tem fertur,  
necessario  
secum defer-  
re corpus du-  
rum quod in  
se continet.*

Atque ex his clare percipitur, corpus durum undique fluido circum, & in illo quiescens, ibi tanquam in æquilibrio consistere; ac quantumvis sit magnum, semper tamen à minima vi posse in hanc vel illam partem impelli; sive illa vis aliunde adveniat, sive in hoc sit sita, quod fluidum istud totum simul versus aliquem locum feratur, ut flumina feruntur versus mare, ac totus aer Euro flante fertur versus occidentem. Quod ubi contingit, omnino necesse est, corpus durum, in tali fluido existens, simul cum ipso deferri. Nec obstat regula illa quarta, juxta quam, ut paulo ante dictum est, corpus quiescens à nullo alio se minori, quantumvis celeriter actò, potest ad motum impelli.

## LXII.

*Cum corpus  
durum à  
fluido sic de-  
fertur, non  
idcirco mo-  
veri.*

Quinimo si ad veram & absolutam motus naturam attendamus, quæ consistit in translatione corporis moti, ex vicinia corporum aliorum sibi contiguorum, & in utroque ex corporibus, quæ se mutuo contingunt, est æqualis, quavis non eodem modo soleat nominari, plane agnoscemus, non tam proprie moveri corpus durum, cum sic à fluido ipsum continente deferretur, quam si non ab eo deferretur; quia tunc nempe à vicinis istius fluidi particulis minus recedit.

## LXIII.

*Cur qua-  
dam corpo-  
ra tam du-  
ra sint, ut  
quantumvis  
parva, non  
facile ma-  
nibus nostris  
dividantur.*

Vnum autem adhuc est, in quo experientia regulis motus, paulo ante traditis, valde videtur adversari; nempe quod videamus, multa corpora, manibus nostris longe minora, tam firmiter sibi mutuo adhærere, ut nulla eorum vi se jungi possint. Si enim illorum partes nullo alio glutino sibi invicem adhærerent, quam quod singula juxta vicinas quiescant, & omne corpus quod quiescit, ab alio se majore quod movetur, possit ad motum impelli; non apparet prima fronte ratio, cur (exempli causa) clavus ferreus, vel aliud quodlibet, non magnum,

gnum, sed valde durum corpus, sola vi manuum nostrarum in duas partes dividi non possit. Licet enim unamquamque mediam partem istius clavi pro uno corpore numerare. cumque ista media pars manu nostra sit minor, videtur ejus vi debere posse moveri, atque sic ab alia media parte divelli. Sed notandum est, manus nostras esse admodum molles, sive ad naturam corporum fluidorum, magis quam durorum, accedentes; ideoque non totas simul agere solere in corpus ab iis movendum, sed eam tantum ipsarum partem, quæ corpus istud tangens, tota simul in illud incumbit. Quippe sicuti media pars clavi ferrei, quatenus ab alia ejus media parte est dividenda, rationem habet unius corporis; sic pars manus nostræ proxime illam tangens, & ipsa minor, quatenus à reliquis ejusdem manus partibus se jungi potest, habet rationem alterius corporis: Et quia facilius à reliqua manu potest separari, quam pars clavi à reliquo clavo, & ista separatio sine doloris sensu fieri nequit, ideo clavum ferreum sola manu frangere non possumus: sed si illam malleo, lima, forfice, aliove instrumento muniamus, ut ita ejus vis ad partem corporis dividendi, minorem corpore quo utitur, ad illud dividendum applicetur, quamlibet ejus duritiem poterit superare.

Nihil hic addam de figuris, nec quomodo ex earum infinita varietate, motuum quoque varietates innumeræ consequantur, quia satis ista per se patebunt, ubicunque usus veniet ut de ipsis agamus. Et suppono, meos lectores vel prima elementa Geometriæ jam novisse, vel saltem ingenium satis aptum habere ad Mathematicas demonstrationes intelligendas. Nam plane profiteor, me nullam aliam rerum corporearum materiam agnoscere, quam illam omnimode divisibilem, figurabilem & mobilem, quam Geometriæ quantitatem vocant, & pro objecto suarum demonstrationum assumunt; ac nihil plane in ipsa considerare, præter istas divisiones figuras & motus; nihilque de ipsis ut verum admittere, quod non ex communibus illis notionibus, de quarum veritate non possumus dubitare, tam evidenter deducatur, ut pro Mathematica demonstratione sit habendum. Et quia sic omnia Naturæ Phænomena possunt explicari, ut in sequentibus apparebit, nulla alia Physicæ principia puto esse admittenda, nec alia etiam optanda.

LXIV.  
Non alia  
principia in  
Physica,  
quam in  
Geometria,  
vel in Ma-  
thesi abstra-  
cta à me ad-  
mitti, nec  
optari, quia  
sic omnia na-  
turæ phæ-  
nomena ex-  
plicantur,  
& certæ de  
his demon-  
strationes  
dari possunt.

G

P R I N -

d a r i p o s s u n t .

PRINCIPIORVM  
PHILOSOPHIÆ

PARS TERTIA.

De Mundo aspectabili.

I.  
*Opera Dei  
nimis am-  
pla cogitari  
non posse.*



Inventis jam quibusdam principiis rerum materialium, quæ non à præjudiciis sensuum, sed à lumine rationis ita petita sunt, ut de ipsorum veritate dubitare nequeamus, examinandum est, an ex iis solis omnia naturæ phænomena possimus explicare; Incipiendumque ab iis quæ maxime universalia sunt, & à quibus reliqua dependent; nempe à generali totius hujus mundi aspectabilis constructione. De qua ut recte philosophemur, duo sunt inprimis observanda: Vnum, ut attendentes ad infinitam Dei potentiam, & bonitatem, ne vereamur nimis ampla, & pulchra, & absoluta ejus opera imaginari; sed è contrario caveamus, ne si quos forte limites, nobis non certo cognitos, in ipsis supponamus, non fatis magnifice de creatoris potentia sentire videamur.

II.  
*Cavendum  
esse, ne ni-  
mis superbe  
de nobis ipsis  
sentientes,  
fines quos  
Deus sibi  
proposuit in  
creando  
mundo à no-  
bis intelli-  
gi supponamus.*

III.  
*Quo sensu  
dici possit  
omnia pro-  
pter homi-  
nem facta  
esse.*

Alterum, ut etiam caveamus, ne nimis superbe de nobis ipsis sentiamus. Quod fieret non modo, si quos limites, nobis nulla cognitos ratione, nec divina revelatione, mundo vellemus affingere, tanquam si vis nostræ cogitationis ultra id, quod à Deo revera factum est, ferri posset; sed etiam maxime si res omnes propter nos solos ab illo creatas esse fingeremus; vel tantum, si fines quos sibi proposuit in creando universo, ingenii nostri vi comprehendi posse putaremus.

Quantis enim in Ethicis sit pium, dicere, omnia à Deo propter nos facta esse, ut nempe tanto magis ad agendas ei gratias impellamur, ejusque amore incendamur: ac quamvis etiam suo sensu sit verum, quatenus scilicet rebus omnibus uti possumus aliquo modo; saltem ad ingenium nostrum in iis considerandis exercendum, Deumque ob admiranda ejus opera suspiciendum: Nequaquam tamen est verisimile, sic omnia propter nos facta esse,

ac

ut nullus alius sit eorum usus. Effetque plane ridiculum & ineptum, id in Physica consideratione supponere; quia non dubitamus, quin multa existant, vel olim extiterint, jamque esse deserint, quæ nunquam ab ullo homine visa sunt aut intellecta, nunquamque ullum usum ulli præbuerunt.

Principia autem quæ jam invenimus, tam vasta sunt & tam secunda, ut multo plura ex iis sequantur, quam in hoc mundo aspectabili contineri videamus; ac etiam multo plura, quam mens nostra cogitando perillustrare unquam possit. Sed jam brevem historiam præcipuorum naturæ phænomenon (quorum causæ hîc sunt investigandæ) nobis ob oculos proponemus; non quidem ut ipsis tanquam rationibus utamur ad aliquid probandum; cupimus enim rationes effectuum à causis, non autem è contrario, causarum ab effectibus deducere; sed tantum ut ex innumeris effectibus, quos ab iisdem causis produci posse judicamus, ad unos potius, quam alios considerandos mentem nostram determinemus.

Nobis quidem, primo intuitu, terra cæteris omnibus mundi corporibus multo major esse videtur, & Sol & Luna cæteris stellis: sed visus defectus indubitatis ratiociniis emendantes, in primis advertimus, Lunæ à terra distantiam circiter triginta terræ diametros æquare, Solis vero sexcentas aut septingentas. Quas distantias cum apparentibus Solis & Lunæ diametris conferentes, facile ex ipsis colligimus, Lunam quidem esse multo minorem terrâ, sed Solem esse multo majorem.

Agnoscimus etiam, visu ratione adjuto, Mercurium plus ducentis terræ diametris à Sole distare; Venerem plus quadringentis; Martem nongentis aut mille; Iovem tribus millibus & amplius; ac Saturnum quinque aut sex millibus.

Quantum autem ad fixas, non permittunt quidem phænomena, ut ipsas à Sole aut terrâ non magis quam Saturnum distare arbitremur, sed nulla obstant, quo minus ad quantumlibet immensam distantiam remotas esse supponamus: colligiturque ex motibus cæli infra explicandis, eas à nobis esse adeo distantes, ut Saturnus ad ipsas comparatus videatur admodum propinquus.

Ex quibus manifestum est, Lunam & terram, si ex Iove vel Saturno conspicerentur, multo minores esse apparituras, quàm appareant Jupiter & Saturnus è terra conspecti; nec forte etiam Solem majorem visum iri, si respiceretur ex Fixis, quam Fixæ nobis è terra videntur;

IV.

*De phænomenis, sive experimentis; & quorum usus ad philosophandum.*

V.

*Quæ sit ratio distantie & magnitudinis inter Solem, Terram & Lunam.*

VI.

*Quæ sit distantia reliquorum planetarum à Sole.*

VII.

*Fixas non posse supponi nimis remotas.*

VIII.

*Terram e celo conspectam, non apparituram esse.*

*nisi ut Planetas, Iove aut Saturno minorem.*

**IX.**  
*Solem & Fixas propriam lucem fulgere.*

dentur; atque idcirco, ut sine præiudicio partes mundi aspectabilis inter se comparemus, cavendum esse ne Lunam, vel Terram, vel Solem magnitudine Stellarum superare arbitremur.

Differunt autem inter se Stellæ non modo quod unæ aliis sint maiores; sed etiam quod quædam propriâ luce fulgeant, aliæ vero tantum alienâ. Ut imprimis de Sole dubium esse non potest, quin lucem quâ oculis nostros perstringit in se habeat. neque enim tantam ab omnibus Fixis simul sumptis mutuari potest, cum ipsæ tantam ad nos non mittant, nec tamen à nobis magis distent quam à Sole; ac nullum aliud corpus apparet magis radiosum, à quo illam accipiat; si quod autem esset, procul dubio appareret. Idem de omnibus Stellarum fixis facile credetur ab iis, qui considerabunt quàm vividos radios vibrent, ac quantum à nobis & à Sole sint remotæ: si enim alicujus Stellæ fixæ tam vicini essemus quàm Solis, credibile est eam ipso non minorem, nec minus lucidam esse apparituram.

**X.**  
*Terram & alios Planetas lucem à Sole mutuari.*

Contra vero Lunam videmus, ea tantum parte splendere quam Soli habet obversam; unde cognoscimus, illam esse proprio lumine destitutam, & tantum radios à Sole acceptos versus oculos nostros reflectere. Quod idem etiam de Venere perspicillorum ope observatur. Idemque de Mercurio, Marte, Iove & Saturno non difficulter persuadetur, ex eo quod eorum lumen obtusius sive placidius sit quam fixarum, & à Sole non adeo distent, quin possint ab ipso illuminari.

**XI.**  
*Terram ratione luminis à Planetis non differre.*

Denique idem de terra experimur; conflata enim est ex opacis corporibus, quæ Solis radios excipientia, illos non minus valide quàm Luna reflectunt; quin etiam nubibus est involuta, quæ licet multo minus opacæ sint, quàm pleræque aliæ ejus partes, sæpe tamen ipsas videmus, cum à Sole illustrantur, non minus albicantes esse quam Lunam; adeo ut sit satis manifestum, eam ratione luminis à Luna, Venere, Mercurio, aliisque planetis, non differre.

**XII.**  
*Lunam, cum nova esset, à Terrâ illuminari.*

Quod etiam confirmatur ex eo, quod Lunâ existente inter Solem & Terram, ejus facies quæ à Sole non illustratur, debile quoddam lumen ostendat, quod facile conjicimus ad illam pervenire, à terrâ, quæ tunc radios à Sole receptos eam versus reflectit: minuitur enim paulatim, prout pars terræ, à Sole illuminata, ab ea se avertit.

**XIII.**  
*Solem inter*

Atque omnino si terram ex Iove respiceremur, minor quidem, sed



sed forte non minus lucida nobis appareret, quàm hinc Iupiter appareat; ex vicinioribus autem planetis major videretur; sed ex Fixis, propter nimiam earum distantiam, omnem conspectum effugeret. Ex quibus sequitur, ipsam inter Planetas, & Solem inter Stellas fixas posse numerari.

Differunt etiam inter se Stellæ in eo, quod illæ quas fixas vocamus, eandem semper à se mutuo distantiam, eundemque ordinem servent; aliæ autem assidue inter se situm mutant; unde Planetæ sive errantes appellantur.

Equidem, ut in medio mari tempore tranquillo, cum quis ex unâ navi alias eminens respicit, inter se situm mutantem, sæpe potest dubitare quibus sitam ex illis, & an non etiam suæ, motus (à quo procedit ista sitûs variatio) sit tribendus: ita errores Planetarum à terra conspecti, tales apparent, ut ex ipsis solis cognosci non possit, quibusnam corporibus sint proprie tribuendi; Cumque sint valde inæquales & implicati, non facile est illos explicare, nisi ex variis modis, quibus possunt intelligi, unum aliquem eligamus, secundum quem ipsos fieri supponamus. In quem finem inventæ sunt ab Astronomis tres diversæ hypotheseis, hoc est, positiones, quæ non ut veræ, sed tantum ut phænomenis explicandis idoneæ, considerantur.

Harum prima est Ptolemæi. quæ quoniam multis phænomenis adversatur, (ut imprimis incremento & decremento luminis, quod in Venere sicut in Lunâ observatur) jam vulgo ab omnibus Philosophis rejici solet, ideoque hinc à me prætermittetur.

Secunda est Copernici, & tertia Tychois Brahe: quæ duæ quatenus sunt tantum hypotheseis, eodem modo phænomenis satisfaciunt, & non magna inter ipsas differentia est, nisi quod illa Copernici aliquanto simplicior sit & clarior; adeo ut Tycho non habuerit occasionem illam mutandi, nisi quia non hypothesein dumtaxat, sed ipsam rei veritatem explicare conabatur.

Quippe cum Copernicus non dubitasset motum terræ tribuere, hoc Tycho tanquam in Physica valde absurdum, atque à communi hominum sensu alienum voluit emendare: sed, quia veram motus naturam non satis consideravit, verbo tantum asseruit, terram quiescere, ac re ipsa plus motus ei concessit quàm alter.

Quapropter ego, in hoc tantum ab utroque dissentiens, quod omnem motum verius quàm Tycho, & curiosius quàm Copernicus

*Fixas, & Terram inter Planetas posse numerari.*

XIV. *Fixas eandem semper à se mutuo distantiam retinere, non autem Planetarum.*

XV. *Essentiam Planetarum apparentias per varias hypotheseis posse explicari.*

XVI. *Hypothesein Ptolemæi apparentiis non satisfacere.*

XVII. *Hypotheseis Copernici & Tychois non differre in quantum hypotheseis.*

XVIII. *Tychoem, verbumini- nus, sed re plus motus Terræ tribuere, quàm Copernicum.*

XIX. *Me accurat-*

*sicut quàm  
Copernicum,  
& verius  
quàm Tycho-  
nem, Terræ  
motum ne-  
gare.*

lum terræ detracturus; illam hîc proponam hypothesin, quæ omnium simplicissima, & tam ad phænomena intelligenda, quam ad eorum causas naturales investigandas accommodatissima esse videtur; ipsamque tantum pro hypothesi, non pro rei veritate haberi velim.

XX.  
*Fixas sup-  
ponendas ef-  
se à Saturno  
quam ma-  
xime di-  
stantes.*


Primo, quia nondum certi sumus, quantum à nobis distent stellarum fixarum, nec possumus eas fingere tam remotas, ut hoc phænomenis repugnet, ne simus contenti supponere, ipsas esse supra Saturnum, ut vulgo omnes admittunt, sed libertatem sumamus quantumlibet altiores existimandi. Si enim earum altitudinem cum distantis hîc supra terram nobis notis vellemus comparare, illa, quæ jam iis ab omnibus conceditur, non esset minus incredibilis quam quævis major; si vero ad Dei creatoris omnipotentiam respiciamus, nulla potest cogitari tam magna, ut ideo sit minus credibilis quam quævis minor. Atque non tantum ad Planetarum, sed etiam ad Cometarum phænomena commode explicanda, maximum spatium inter illas & spheram Saturni ponendum esse, infra ostendani.

XXI.  
*Solem instar  
flammæ ex  
materiâ  
quidem val-  
de mobili  
constare, sed  
non ideo ex  
uno loco in  
alium mi-  
grare.*

Secundo, quia Sol in hoc convenit cum fixis, & cum flammâ, quod lumen à se ipso emittat; putemus, eundem etiam in motu cum flamma, & in situ cum fixis, venire. Neimpe nihil quidem hîc supra terram videmus esse mobilium flamma; nam & alia corpora, juxta quæ posita est, nisi sint admodum solida & dura, particulatim dissolvit, ac secum movet; sed tamen ejus motus sit tantum secundum partes, & tota migrare non solet ex uno loco in alium, nisi ab aliquo alio corpore, cui adhæreat, deferatur: qua ratione possumus etiam existimare, Solem constare quidem ex materia valde fluida & mobili, quæ omnes cœli circumjacentis partes secum rapit, sed in hoc nihilominus stellas fixas imitari, quod non ex una cœli regione in aliam migret.

XXII.  
*Solem à  
flamma dif-  
ferre, quod  
non ita  
eget ali-  
mento.*

Neque incongrua videri debet Solis cum flamma comparatio, ex eo quod nullam flammam hîc videamus quæ non continuo eget alimento; quod idem de Sole non observatur. Ex legibus enim naturæ, non minus flamma, quam quodvis aliud corpus, ubi semel existit, semper existere perseverat, nisi ab aliqua causa externa destruat: sed, quia constat materia quam maxime fluida & mobili, assidue hîc supra terram à materia circumjacentente dissipatur; atque ideo eget alimento, non ut eadem quæ jam existit conservetur, sed tantum ut dum ipsa extinguitur, semper alia nova in ejus locum substituat:



stituat: Solem autem non ita destruunt partes cœli ei vicinæ, ideoque non ita eget alimento quo reparetur. Sed tamen etiam infra ostendetur, novam semper materiam in Solem ingredi, & aliam ex eo elabi.

**XXIII.** Hicque notandum est, si Sol in situ non differat à fixis, ipsas omnes in unius alicujus sphaeræ circumferentia non versari, quemadmodum multi supponunt, quia ille in eadem ista sphaeræ circumferentia esse non potest: Sed ut Sol vastum quoddam circa se spatium habet, in quo nulla Stella fixa continetur; ita singulæ fixæ ab omnibus aliis valde remotæ esse debent, & unæ multo magis quam aliæ à nobis & à Sole distare. Sic in hac figura si S sit Sol, F f erunt stellæ fixæ; atque aliæ innumeræ, supra & infra, & ultra hujus figuræ planum, per omnes spatii dimensiones sparsæ intelliguntur.

**XXIV.** Tertio, putandum est, non tantum Solis & Fixarum, sed totius etiam cœli materiam fluidam esse, sive liquidam: quod jam vulgo omnes Astronomi concedunt, quia vident, phænomena Planetarum vix aliter posse explicari.

**XXV.** Sed in hoc multi mihi videntur errare, quod fluiditatem cœlo tribuentes, illud tanquam spatium plane vacuum imaginentur, ita ut motibus quidem aliorum corporum non resistat, sed præterea nullam habeat vim ad ipsa secum deferenda: neque enim in rerum natura ullum tale vacuum esse potest; ac fluidis omnibus hoc est commune, ut ideo tantum non resistent aliorum corporum motibus, quod in se ipsis etiam habeant motum; Et quia hic motus facile in omnes partes determinatur, ejus vi, cum in unam aliquam partem est determinatus, necessario secum deferunt alia omnia corpora in se contenta, quæ à nulla causa externa retinentur, quantumvis ipsa sint solida & quiescentia & dura; ut ex ante dictis est manifestum.

**XXVI.** Quarto, cum videamus, Terram nullis columnis suffultam, nullisque funibus appensam, sed circumquaque fluidissimo tantum cœlo circumam esse, putemus quidem, illam quiescere, ac nullam habere propensionem ad motum, quandoquidem nullam advertimus; sed ne putemus, hoc obstare, quo minus ab isto cœlo deferatur, & ejus motibus immota obsequatur: Vt navis, nullis ventis nec remis impulsæ, nullisque anchoris alligatæ, in medio mari quiescit, etsi forte aquæ ingens moles, occulto cursu delabens, ipsam secum ferat.

Et

Et quemadmodum cæteri planetæ in hoc cum terra conveniunt, quod sint opaci, & radios Solis reflectant, non immerito arbitrari-  
 mur, illos etiam in hoc ei similes esse, quod unusquisque quiescat in  
 ea cæli regione in qua versatur; quodque omnis variatio situs quæ in  
 illis observatur, ex eo tantum procedat, quod omnis materia cæli,  
 quæ illos continet, moveatur.

Hicque oportet eorum meminisse quæ de natura motus supra  
 dicta sunt; nempe illum quidem (si proprie loquamur, & secun-  
 dum rei veritatem) esse tantum translationem unius corporis ex  
 vicinia eorum corporum, quæ ipsum immediate contingunt, &  
 tanquam quiescentia spectantur, in viciniam aliorum; sed sæpe etiam  
 ex usu vulgi actionem omnem, qua corpus aliquod ex uno loco in  
 alium migrat, motum vocari; & hoc sensu dici posse, eandem rem  
 eodem tempore moveri ac non moveri, prout ejus locum varie de-  
 terminamus. Vnde sequitur, nullum in terra, nec etiam in aliis  
 planetis, motum proprie dictum reperiri; quia non transferuntur  
 ex vicinia partium cæli quæ illos immediate contingunt, quatenus  
 istæ partes cæli ut immotæ considerantur. Ad hoc enim deberent  
 ab omnibus simul seungi. Quod non fit; sed quia materia cæli fluida  
 est, nunc unæ ex ejus particulis, nunc aliæ, à Planeta quem con-  
 tingunt removentur, idque per motum qui illis tantum tribui de-  
 bet, non autem Planetæ: Quemadmodum partiales translationes  
 aquæ & aëris, quæ in terræ superficie fiunt, non tribui solent ipsi ter-  
 ræ, sed illis aquæ & aëris partibus quæ transferuntur.

Motum autem sumendo juxta usum vulgi, dicendum quidem est,  
 Planetas alios omnes moveri, nec non etiam Solem & Fixas; sed  
 non nisi admodum incongrue. Idem de Terra dici potest. Vulgus  
 enim à Terræ partibus, ut immobilibus spectatis, stellarum loca de-  
 terminat; hæcque eatenus moveri judicat, quatenus à locis ita deter-  
 minatis recedunt: quod commodum est ad usum vitæ, ideoque rati-  
 onis consentaneum. Quin etiam omnes ab ineunte ætate putavi-  
 mus, terram non esse globosam, sed planam, & in ea esse ubique  
 idem sursum, & idem deorsum, eosdemque mundi cardines, Orien-  
 tem, Occidentem, meridiem, & Septentrionem; quibus idcirco  
 usi sumus ad reliquorum omnium corporum loca designanda. Sed si  
 quis Philosophus, animadvertens, terram esse globum in cælo fluido  
 & mobili contentum, Solem autem & Stellæ fixas eundem semper  
 inter se situm servare, his utatur ut immotis ad illius locum de-

XXVII.  
*Idemque  
 sentiendum  
 esse de omni-  
 bus Planetis.*

XXVIII.  
*Terram, pro-  
 prie loquen-  
 do, non mo-  
 veri, nec  
 illos Plane-  
 tas, quam-  
 vis à cælo  
 transferan-  
 tur.*

XXIX.  
*Nullum et-  
 iam motum  
 Terræ esse  
 tribuendum,  
 quamvis  
 motus im-  
 proprie jux-  
 ta usum  
 vulgi sumat-  
 ur, sed tunc  
 esse dici,  
 alios Plane-  
 tas moveri.*


terminandum, & ideo affirmet, ipsam moveri, absque ratione loquetur. Nam primo, juxta philosophicum sensum, locus determinari non debet per corpora valde remota, quales sunt fixæ, sed per contigua ejus quod dicitur moveri. Ac deinde, juxta usum vulgi, non est cur Fixas consideret ut immotas, potius quam terram, nisi quod putet, ultra ipsas non esse ulla alia corpora, à quibus separentur, & quorum respectu dici possint moveri, terra autem quiescere, illo sensu, quo dicit, terram moveri respectu Fixarum. Atqui hoc putare, à ratione est alienum. cum enim mens nostra sit talis naturæ, ut nullos in mundo limites agnoscat; quisquis ad immensitatem Dei, & sensuum nostrorum infirmitatem attendet, æquius esse judicabit, suspicari, ultra illas omnes stellas fixas quas videmus forte esse alia corpora, ad quæ comparata terra quiescere, ipsæ autem omnes simul moveri dici possint, quam suspicari, nulla posse talia esse.

XXX.  
Planetarum  
omnes circa  
Solem à cælo  
deferri.

Sic itaque sublato omni scrupulo de terræ motu, putemus, totam materiam cæli in qua Planetæ versantur, in modum cujusdam vorticis, in cujus centro est Sol, assidue gyrare, ac ejus partes Soli viciniores celerius moveri quam remotiores, Planetasque omnes (è quorum numero est Terra) inter easdem istius cælestis materiæ partes semper versari. Ex quo solo, sine ullis machinamentis, omnia ipsorum phænomena facillime intelligentur. Ut enim in iis fluminum locis, in quibus aqua in se ipsam contorta vorticem facit, si varix festucæ illi aquæ incumbant, videbimus, ipsas simul cum ea deferri, & nonnullas etiam circa propria centra converti, & eo celerius integrum gyrum absolvere, quo centro vorticis erunt viciniores; & denique, quamvis semper motus circulares affectent, vix tamen unquam circulos omnino perfectos describere, sed nonnihil in longitudinem & latitudinem aberrare. Ita eadem omnia de Planetis absque ulla difficultate possumus imaginari. Et per hoc unum cuncta eorum phænomena explicantur.

XXXI.  
Quomodo  
singuli Plan-  
etæ a de-  
ferantur.

Sit itaque S Sol, & omnis materia cælestis eum circumjacens ita moveatur in easdem partes, nempe ab Occidente per Meridiem versus Orientem, sive ab A per B versus C; supponendo, polum Borealem supra hujus figuræ planum eminere; ut ea quæ est circa Saturnum, impendat fere annos triginta ad eum per totum circumulum H deferendum; ea vero quæ est circa Iovem, inter annos 12 illum cum ejus asseclis deferat per circumulum M; sicque Mars duobus



bus annis , Terra cum Luna uno anno , Venus octo mensibus , & Mercurius tribus , circuitus suos in circulis ♂ , T , ♀ ; ♀ , materiâ cœli eos deferente , absolvant .

Nec non etiam corpora quædam opaca , perspicillorum ope nobis perspicua , quæ dicuntur Solis maculæ , ipsiusque superficiæ contigua sunt , spatio viginti sex dierum eum circumeant .

Ac præterea , ut sæpe in aquarum vorticibus vidi contingere , in majori illo cœlestis materiæ vortice , sint alii minores vortices , unus in cujus centro sit Iupiter , alter in cujus centro sit Terra , qui in eadem partes ac major vortex ferantur , & ille qui habet Iovem in centro , deferat circa ipsum quatuor ejus asseclas , tali celeritate , ut remotissimus diebus 16 , sequens diebus 7 , tertius horis 85 , & centri proximus horis 42 unum circuitum perficiat ; sicque , dum semel in majori circulo circa Solem ferentur , minores suos circulos circa Iovem aliquoties percurrant ; Eodemque modo vortex , qui habet Terram in centro , efficiat ut Luna mensis spatio eam circumeat , ipsa autem terra singulis diebus circa proprium axem integrum gyrum absolvat ; ita ut eodem tempore quo Terra & Luna cir-

XXXII.

*Quomodo etiam Solis macule.*

XXXIII.

*Quomodo etiam Terra circa proprium centrum , & Luna circa Terram vehatur.*

culum communem semel peragrabunt, terra 365 vicibus circa proprium centrum, & Luna duodecies circa terram, vertatur.

XXXIV.

*Motus ca-  
lorum non  
esse perfecte  
circulares.*

Denique ne putemus, omnia centra Planetarum accurate in eodem plano semper consistere, nec, circulos quos describunt esse omnino perfectos; sed, ut in omnibus aliis rebus naturalibus contingere videmus, ista tantum præterpropter talia esse, ac etiam labentibus seculis continuo mutari, arbitremur.

XXXV.

*De aberratione Plane-  
tarum in lati-  
tudinem.*

Nempe si hæc figura repræsentet planum in quo centrum Terræ toto anno versatur, quod vocatur planum Eclipticæ, atque ope Fixorum in cælo determinatur, putandum est, unumquemque ex aliis Planetis in alio quodam plano versari, ad hoc nonnihil inclinato, & ipsum interfecantem in linea quæ transit per centrum Solis; ita ut Sol in omnibus istis planis reperiatur. Exempli causa: Orbita Saturni secat nunc Eclipticam in signis Cancris & Capricorni, supra ipsam autem attollitur, hoc est, versus Boream inclinatur in Libra, & infra eandem versus Austrum deprimitur in Ariete, angulusque ipsius inclinationis est circiter graduum  $2\frac{1}{2}$ . sicque aliorum Planetarum orbitæ secant Eclipticam in aliis locis. sed inclinatio in Iove & Marte est minor, in Venere uno circiter gradu major, & in Mercurio maxima: est enim fere 7 graduum. Ac præterea etiam Solis maculæ (saltem si veræ sint observationes Scheineri S. I. post cujus diligentiam nihil circa istarum macularum phænomena desiderari posse videtur) in planis 7 gradibus aut amplius ad Eclipticam inclinatis, circa Solem volvuntur; adeo ut earum motus hæc in re non differat à motibus Planetarum. Luna etiam circa terram fertur in plano quod 5 gradibus ab Ecliptica deflectit; & terra circa proprium axem in plano Æquatoris  $23\frac{1}{2}$  gradibus ab Ecliptica deflectente; quod planum Æquatoris ipsa secum defert. Atque hæc Planetarum aberrationes ab Ecliptica, vocantur motus in latitudinem.

XXXVI.

*De motu in  
longitudi-  
nem.*

Ipsorum autem circuitiones circa Solem, vocantur motus in longitudinem: Hicque etiam in eo aberrant, quod non æqualiter ubique à Sole distent; sed hæc ætate Saturnus ab eo remotior est in Sagittario quàm in Geminis, vicissimã circiter distantia suæ parte; Iupiter in Libra remotior est quàm in Ariete; sicque alii Planetæ habent Aphelia & Perihelia sua aliis in locis. Post aliquot autem sæcula, hæc omnia mutata esse deprehenduntur; ac singuli Planetæ, nec non etiam Terra, planum in quo nunc est Ecliptica, diversis in locis secabunt, & paulo magis vel minus ab illa deflectent,



ctent, & illorum maximæ ac minimæ à Sole distantiz in aliis signis reperientur.

Iam vero non opus est ut ostendam, quo pacto ex hac hypothesi sequantur phænomena diei & noctis, æstatis & hyemis, sive accessus Solis ad Tropicos, & ejusdem recessus, phasium Lunæ; Eclipsium, stationum & retrogradationum quæ apparent in Planetis; præcessionis æquinoctiorum, variationis in obliquitate Eclipticæ; ac similia; facile enim ab illis, qui vel prima elementa Astronomiæ didicerunt, intelliguntur.

Sed breviter adhuc dicam, quo pacto ex hypothesi Braheana, quam vulgo jam admittunt illi omnes, qui Copernicanam repudiant, plus motus Terræ quam per hanc, tribuatur. Primo, manente Terra juxta eorum opinionem immobili, necesse est ut totum cælum una cum stellis circa ipsam singulis diebus volvatur. quod intelligi non potest, quin simul intelligatur, fieri translationem omnium partium terræ, ex vicinia partium cæli quas tangunt, in viciniam aliarum. cumque hæc translatio sit reciproca, ut supra dictum est, & eadem plane vis, sive actio, ad illam requiratur in terra atque in cælo, nulla ratio est, cur propter ipsam cælo potius quam terræ motum tribuamus; quinimo, juxta superius dicta, terræ duntaxat est tribuendus; quia sit secundum totam ejus superficiem, non autem eodem modo secundum totam superficiem cæli, sed tantum secundum partem concavam, terræ contiguam, quæ ad convexam comparata perexigua est. Nec refert si dicant, se non tantum putare, concavam cæli stellati superficiem à terra separari, sed simul etiam convexam ab alio cælo illud ambiente, nempe à cælo crystallino vel empyreo; atque hanc esse rationem cur illum motum cælo potius tribuant quam terræ. Nullum enim haberi potest argumentum, quo probetur, fieri talem separationem totius superficiæ convexi cæli stellati ab alio cælo ipsi ambiente; sed plane ex arbitrio illam fingunt. Atque ita, juxta ipsorum hypothesin, ratio cur motus sit terræ tribuendus est certa & evidens; ratio vero cur illum cælo tribuant, & terræ quietem, est incerta, & à sola illorum imaginatione efficta.

Ex eadem Tychonis hypothesi Sol, motu annuo circa Terram gyrans, non modo Mercurium & Venerem, sed etiam Martem, Jovem & Saturnum, qui ab eo remotiores sunt quam terra, secum ducit: quod intelligi non potest, præsertim in cælo fluido,

XXXVII.  
*Phænomena omnia per hanc hypothesin facillime intelligi.*

XXXVIII.  
*Juxta Tychonis hypothesin dicendum esse, Terram moveri circa proprium centrum.*

XXXIX.  
*Ac etiam illum moveri circa Solem, motu annuo.*

quale istud supponunt, quin tota cœli materia interjacens simul feratur, & interim Terra vi aliqua separetur à partibus istius materiæ sibi contiguæ, atque in ea circulum describat. quapropter hæc rursus separatio, quæ est totius Terræ, ac peculiarem in ea actionem requirit, ejus motus erit dicendus.

**XL.** Vnus autem adhuc in mea hypothesi scrupulus manet, ex eo, quod si Sol eundem semper situm inter Fixas seruet, necesse sit, Terram quæ circa illum fertur, ad ipsas accedere ac recedere toto suæ orbitæ intervallo. quod tamen ex phænomenis non potuit hactenus deprehendi. Sed hoc excusatur per immensam distantiam, quam inter nos & fixas esse supponimus; talem scilicet, ut totus ille circulus qui à Terrâ describitur circa Solem, si ad eam comparatur, instar puncti sit habendus. Quod fateor incredibile videri posse, magnalia Dei considerare non assuetis, & terram, ut præcipuam partem universi, ac domicilium hominis propter quem cætera omnia facta sint, spectantibus: sed Astronomis, qui jam omnes sciunt, illam ad cœlum comparatam instar puncti esse, non ita mirum videri debet.

**XL I.** Ac præterea Cometæ, quos jam fatis constat in nostro aëre non versari, ut nimis rudis antiquitas opinabatur, vastissimum istud spatium inter sphæram Saturni & Fixas requirunt, ad omnes suas excursionses absolvendas. adeo enim variæ sunt, adeo innumerae, & à Fixarum stabilitate, atque à regulari Planetarum circa Solem circuitione adeo discrepantes, ut absque eo ad nullas Naturæ leges revocari posse videantur. Neque nos movere debet, quod Tycho & alii Astronomi, qui diligenter eorum parallaxes investigarunt, dixerint, tantum illos esse supra Lunam, versus sphæram Veneris aut Mercurii, non autem supra ipsum Saturnum: hoc enim non minus recte ex suis calculis concludere potuissent, quàm illud; sed cum disputarent contra veteres, qui Cometæ inter meteora sublunaria numerabant, contenti fuerunt ostendere, illos in cœlo esse; nec ausi sunt omnem altitudinem quam calculo deprehendebant iis tribuere, ne minus facile crederetur.

**XL II.** Præter hæc autem generaliora possent adhuc particularia multa, non modo circa Solem, Planetas, Cometæ & Fixas, sed præcipue etiam circa Terram, (nempe illa omnia quæ in ejus superficie videmus) inter phænomena hic recenseri. Ut enim veram hujus mundi aspectabilis naturam agnoscamus, non fatis est, aliquas causas invenire, sed

*XL.*  
*Terra trans-*  
*lationem*  
*nullam effi-*  
*cere aspectus*  
*diversita-*  
*tem in Fixis,*  
*propter ma-*  
*ximam ipsa-*  
*rum distan-*  
*tiam.*

*XL I.*  
*Hanc etiam*  
*fixarum di-*  
*stantiam re-*  
*quiri ad mo-*  
*tus Cometa-*  
*rum, quos*  
*jam constat*  
*esse in cælo.*

*XL II.*  
*Omnia quæ*  
*hic in Terra*  
*videmus, ad*  
*phænomena*  
*etiam perti-*  
*nere, sed*

nire, per quas ea quæ in cælo eminus aspiciuntur explicentur; sed ex iisdem etiam illa omnia, quæ in terra cominus intuemur, deduci debent. Atqui non opus est ut illa omnia consideremus ad rerum generaliorum causas determinandas; sed tum demum ipsas postea recte à nobis determinatas fuisse cognoscimus, cum ex iisdem non ea duntaxat ad quæ respeximus, sed alia etiam omnia, de quibus antea non cogitavimus, explicari advertemus.

Et certe, si nullis principiis utamur nisi evidentissime perspectis, si nihil nisi per Mathematicas consequentias ex iis deducamus, & interim illa quæ sic ex ipsis deducemus, cum omnibus naturæ phænomenis accurate consentiant, injuriam Deo facere videremur, si causas rerum hoc pacto à nobis inventas falsas esse suspicaremur, tanquam si nos tam imperfectos genuisset, ut ratione nostra recte utendo fallamur.

Verumtamen ne etiam nimis arrogantes esse videamur, si de tantis rebus philosophando, genuinam earum veritatem à nobis inventam esse affirmemus, malim hoc, in medio relinquere, atque omnia quæ deinceps sum scripturus, tanquam hypothelin proponere; quæ quamvis falsa esse existimantur, satis magnum operæ pretium me fecisse arbitror, si omnia quæ ex ipsa deducuntur cum experimentis consentiant. Ita enim ex ea tantundem utilitatis ad vitam, atque ex ipsius veritatis cognitione, percipiuntur.

Quinimo etiam, ad res naturales melius explicandas, earum causas altius hinc repetam, quam ipsas unquam extitisse existimem. Non enim dubium est, quin mundus ab initio fuerit creatus cum omni sua perfectione; ita ut in eo & Sol & Terra & Luna, & Stellæ extiterint; ac etiam in terra non tantum fuerint semina plantarum, sed ipsæ plantæ; nec Adam & Eva nati sint infantes, sed facti sint homines adulti. Hoc fides Christiana nos docet; hocque etiam ratio naturalis plane persuadet. Attendendo enim ad immensam Dei potentiam, non possumus existimare, illum unquam quidquam fecisse, quod non omnibus suis numeris fuerit absolutum. Sed nihilominus, ut ad plantarum vel hominum naturas intelligendas longe melius est considerare, quo pacto paulatim ex seminibus nasci possint, quam quo pacto à Deo in prima mundi origine creati sint; ita si quæ principia possumus excogitare valde simplicia & cognitu facilia, ex quibus tanquam ex seminibus quibusdam, & sidera, & terram, & denique omnia quæ in hoc mundo aspectabili deprehendimus,

oriri

*non opus esse initio ad cuncta respicere.*

XLIII.


*Vix fieri posse quin causa, ex quibus omnia phænomena clare deducuntur, sint vera.*

XLIV.

*Me tamen esse, quas hic exponam, pro hypothesebus tantum haberi velle.*

XLV.

*Meque etiam hic nonnullas assumptionum, quas constas falsas esse.*



oriri potuisse demonstremus, quamvis ipsa nunquam sic orta esse probesciamus; hoc pacto tamen eorum naturam longe melius exponemus, quam si tantum, qualia jam sint, describeremus. Et quia talia principia mihi videor invenisse, ipsa breviter hic exponam.

Ex antedictis jam constat, omnium mundi corporum unam & eandem esse materiam, in quaslibet partes divisibilem, ac jam re ipsa in multas divisam, quæ diversimode moventur, motusque habent aliquo modo circulares, & semper eandem motuum quantitatem in universo conservant. At quam magnæ sint istæ partes materiæ, quam celeriter moveantur, & quales circulos describant, non possumus sola ratione determinare; quia potuerunt ista innumeris modis diversis à Deo temperari, & queminam præ cæteris elegerit, sola experientia docere debet: lanque idcirco nobis liberum est, quidlibet de illis assumere, modo omnia, quæ ex ipso consequentur, cum experientia consentiant. Itaque si placet, supponemus, omnem illam materiam, ex qua hic mundus adspectabilis est compositus, fuisse initio à Deo divisam in particulas quam proxime inter se æquales, & magnitudine mediocres, sive medias inter illas omnes, ex quibus jam cæli atque astra componuntur, easque omnes tantundem motus in se habuisse, quantum jam in mundo reperitur; & æqualiter fuisse motas, tum singulas circa propria sua centra, & separatim à se mutuo, ita ut corpus fluidum componerent, quale cœlum esse putamus; tum etiam plures simul, circa alia quædam puncta æque à se mutuo remota, & eodem modo disposita, ac jam sunt, centra fixarum; nec non etiam circa alia aliquanto plura, quæ æquent numerum planetarum. Ita scilicet ut illæ omnes, quæ continebantur in spatio A E I, verterentur circa punctum S, & quæ continebantur in spatio A E V, circa F, & ita de cæteris: sicque tot varios vortices componerent, quot jam astra sunt in mundo.

Quæ pauca sufficere mihi videntur, ut ex iis, tanquam causis, omnes qui in hoc mundo apparent effectus secundum leges naturæ supra expositas oriuntur. Et non puto alia simpliciora, vel intellectus facilia, vel etiam probabiliora rerum principia posse excogitari. Etsi enim forte etiam ex Chao per leges Naturæ idem ille ordo qui jam est in rebus deduci posset, idque olim susceperim explicandum; quia tamen confusio minus videtur convenire cum summa Dei rerum creatoris perfectione, quam proportio vel ordo, & minus distincte etiam à nobis percipi potest; nullaque proportio, nullusve

XLVI.  
*Quamquam  
sint ea, quæ  
hic assumo  
ad phenomena  
omnia  
explicanda.*

XLVII.  
*Harum  
suppositio-  
num falsi-  
tatem non  
improbre,  
quo minus  
ea qua ex  
ipsis dedu-  
centur, ve-  
ra & certa  
esse possint.*

ordo simplicior est, & cognitu facilior, quam ille qui constat omnimoda æqualitate: idcirco hic suppono, omnes materiæ particulas initio fuisse tam in magnitudine, quam in motu inter se æquales; & nullam in universo inæqualitatem relinquo, præter illam quæ est in situ Fixarum, & quæ unicuique cælum noctu insistenti tam clare apparet, ut negari plane non possit. Atque omnino parum refert, quid hoc pacto supponatur, quia postea juxta leges naturæ est mutandum. Et vix aliquid supponi potest, ex quo non idem effectus (quanquam fortasse operosius) per eandem naturæ leges deduci possit: Cum enim illarum ope materia formas omnes quarum est capax, successive assumat, si formas istas ordine consideremus, tandem ad illam quæ est hujus mundi, poterimus devenire: adeo ut hic nihil erroris ex falsa suppositione sit timendum.

XLVIII.

*Quomodo  
omnes cæ-  
lestis mate-  
riæ particu-  
le factæ sint  
sphærica.*

Itaque, ut naturæ legum efficacitatem in proposita hypothesi ostendere incipiamus, considerandum est, illas particulas, in quas totam hujus mundi materiam initio divisam fuisse supponimus, non potuisse quidem initio esse sphæricas, quia plures globuli simul juncti, spatium continuum non replent; sed cujuscunque figuræ tunc fuerint, eas non potuisse successu temporis non fieri rotundas, quandoquidem varios habuerunt motus circulares. Cum enim in principio satis magna vi motæ fuerint, ut unæ ab aliis se jungerentur, eadem illa vis perseverans, haud dubie satis magna etiam fuit ad earum omnes angulos, dum sibi mutuo postea occurrerunt, atterendos: ad hoc enim non tanta, quam ad illud, requirebatur. Et ex hoc solo, quod alicujus corporis anguli sic atterantur, facile intelligimus, illud tandem fieri rotundum: quia hoc in loco nomen anguli, ad omne id, quod in tali corpore ultra figuram sphæricam prominet, est extendendum.

XLIX.

*Circa istas  
particulas  
sphæricas  
aliam esse  
debere ma-  
teriam sub-  
tiliorem.*

Cum autem nullibi spatia omni corpore vacua esse possint, cumque rotundæ illæ materiæ particule, simul junctæ, per exigua quadam intervalla circa se relinquant, necesse est, ista intervalla quibusdam aliis materiæ ramentis minutissimis, figuras ad ipsa implenda aptas habentibus, easque pro ratione loci occupandi perpetuo mutantibus, impleri. Nempe dum earum materiæ particularum, quæ sunt rotundæ, anguli paulatim atteruntur, id quod ex ipsis eraditur adeo est minutum, & tantam celeritatem acquirit, ut sola vi sui motus in ramenta innumerabilia dividatur, sicque impleat omnes angulos, quos alix materiæ particule subire non possunt.

Notan-

Notandum enim est, quo minora sunt ista particularum aliarum ramenta, eo facilius moveri atque in alia adhuc minutiora comminui posse: Quia quo minora, eo plus habent superficiæ, pro ratione suæ molis: & occurrunt aliis corporibus secundum superficiem; dividuntur vero secundum molem.

Notandum etiam est, ipsa multo celerius agitari, quam alias materiæ particulas, à quibus tamen suam agitationem acquirunt: quia dum hæc per rectas, & patentias vias feruntur, expellunt ista per obliquas & angustas. Eadem ratione, qua videmus ex folle, quamvis lente claudatur, aërem tamen valde celeriter egredi, propter angustiam viæ per quam transit. Iamque supra demonstratum est, aliquam materiæ portionem celerrime moveri, ac in partes re ipsa indefinitas dividi debere, ut varii motus circulares & inæquales sine rarefactione vel vacuo fieri possint, nec ulla alia præter hanc ad id apta reperitur.

Iam itaque duo habemus genera materiæ valde diversa, quæ duo prima elementa hujus mundi aspectabilis dici possunt. Primum est illius, quæ tantam vim habet agitationis, ut aliis corporibus occurrendo, in minutias indefinitæ parvitatæ dividatur, & figuras suas ad omnes angulorum ab iis relictorum angustias implendas accommodet. Alterum est ejus, quæ divisa est in particulas sphericas, valde quidem minutas, si cum iis corporibus, quæ oculis cernere possumus, comparentur; sed tamen certæ ac determinatæ quantitatis, & divisibiles in alias multo minores. Tertiumque paulo post invenimus, constans partibus vel magis crassis, vel figuras minus ad motum aptas habentibus. Et ex his tribus omnia hujus mundi aspectabilis corpora componi ostendemus: Nempe Solem & Stellæ fixas ex primo, cælos ex secundo, & Terram cum Planetis & Cometis ex tertio. Cum enim Sol & Fixæ lumen ex se emittant; cæli illud transmittant; Terra, Planetæ, ac Cometæ remittant: triplicem hanc differentiam in aspectum incurrentem non male ad tria elementa referemus.

Non male etiam omnem materiam, in spatio AEI comprehensam, quæ gyrat circa centrum S, pro primo cælo sumemus; & omnem illam, quæ circa centra F, f, innumerabiles alios vortices componit, pro secundo; Et denique quidquid ultra illos duos cælos reperitur, pro tertio. Existimamusque, hoc tertium, respectu secundi, esse immensum, & secundum respectu primi permagnum.

L.

*Hujus subtilioris materiæ particularis facilitas dividendi.*

L I.


*Eisdem celerrime moveri.*

L II.

*Tria esse hujus mundi aspectabilis elementa.*

L III.

*Tres etiam in illo cælo distinguuntur.*





gnum. Sed tertii cœli consideratio non est hujus loci; quia nullo modo à nobis spectari potest in hac vita, & de mundo tantum aspectabili tractamus. Vortices autem, quorum centra F, f, omnes simul pro uno tantum cœlo numeramus, quia sub una & eadem ratione à nobis considerantur; Sed vorticem S, licet hic non appareat ab aliis diversus, pro peculiari tamen cœlo & quidem omnium primo, sumimus: quia Terram habitationem nostram paulo post in illo inveniemus, ideoque multo plura in ipso habebimus spectanda quam in reliquis, & nomina rebus non propter ipsas, sed tantum ad nostras de iis cogitationes explicandas imponere solemus.

Crevit autem initio paulatim materia primi elementi ex eo, quod particulæ secundi assiduo motu se invicem magis ac magis attererent. cuiusque major ejus quantitas fuit in universo, quam necesse erat ad implenda exigua illa spatia, quæ inter particulas sphericas secundi elementi, sibi mutuo incumbentes, reperiuntur, quidquid ex ea residui fuit, postquam spatia ista impleta sunt, ad centra S, F, f, confluit: ibique corpora quædam spherica fluidissima composuit; nempe Solem in centro S, ac Stellas fixas in aliis centris. Postquam enim particulæ secundi elementi fuerunt magis attritæ, minus spatii occupant quam prius, nec ideo ad centra usque se extenderunt, sed ab iis æqualiter omni ex parte recedentes, loca ibi spherica reliquerunt, à materia primi elementi, ex omnibus circumjacentibus locis eo affluente, replenda.

Ea enim est lex Naturæ, ut corpora omnia quæ in orbem aguntur, quantum in se est, à centris sui motus recedant. Atque hic illam vim, qua sic globuli secundi elementi, nec non etiam materia primi circa centra S F congregata, recedere conantur ab istis centris, quam potero accuratissime explicabo: In ea enim sola lucem consistere, infra ostendetur; & ab ipsius cognitione multa alia dependent.

Cum dico, globulos secundi elementi recedere conari à centris circa quæ vertuntur, non putandum est, idcirco me illis aliquam cogitationem affingere, ex qua procedat iste conatus; sed tantum ipsos ita esse sitos, & ad motum incitatos, ut revera sint eo versus ituri, si à nulla alia causa impediantur.

Quia vero frequenter multæ causæ diversæ agunt simul in idem corpus, atque unæ aliarum effectus impediunt, prout ad has vel illas respicimus, dicere possumus, ipsum eodem tempore tendere, sive

LIV.  
Quomodo  
Sol & Fixæ  
formatae  
sunt.


L V.  
Quid sit lux.

LVI.  
Quis conatus ad motum in rebus inanimatis sit intelligendus.

LVII.  
Quomodo in eodem corpore conatus ad

*diversos motus simul esse possint.*

ire conari, versus diversas partes. Vt exempli causa, lapis A, in funda EA, circa centrum E rotatus, tendit quidem ab A versus B, si omnes causæ quæ concurrunt ad ejus motum determinandum, simul spectentur, quia revera eo versus fertur; Sed si respiciamus ad solam vim motus quæ in ipso est, dicemus, illum cum est in puncto A, tendere versus C, juxta legem motus supra expositam: ponentes scilicet, lineam AC esse rectam, quæ tangit cir-




culum in puncto A. Si enim lapis è funda egrederetur, eo temporis momento, quo veniendo ex L pervenit ad punctum A, revera pergeret ab A versus C, non versus B; ac quamvis funda hunc effectum impediat, non tamen impedit conatum. Si denique non respiciamus ad totam istam vim motus, sed tantum ad illam ejus partem quæ à funda impeditur, eam scilicet distinguentes ab alia ejus parte quæ sortitur suum effectum, dicemus, hunc lapidem, dum est in puncto A, tendere tantum versus D, sive recedere conari à centro E, secundum lineam rectam EAD.

LVIII.  
*Quomodo*

Quod ut clare intelligatur, conferamus motum quo lapis in puncto

cto A existens, ferretur versus C, si à nulla alia vi impediretur, cum motu quo formica in eodem puncto A existens, moveretur etiam versus C, si linea EY esset baculus, supra quem recta incederet ab A versus Y, dum interim ipse baculus verteretur circa centrum E, ac ejusdem baculi punctum A describeret circu-

*ea quæ circulariter moventur, conentur recedere à centro sui motus.*




lum ABF, essentque hi duo motus ita inter se contemperati, ut formica perveniret ad X cum baculus esset in C, & ad Y cum baculus esset in G, atque ita ipsa semper existeret in lineâ rectâ ACG. Ac deinde conferamus etiam eam vim, quâ idem lapis, actus in funda secundum lineam circulearem ABF, recedere conatur à centro E, secundum lineas rectas AD, BC, FG, cum conatu qui remaneret in formica, si vinculo vel glutino aliquo detineretur in puncto A, supra baculum EY, dum interim iste baculus eam deferret circa centrum E, per lineam circulearem ABF, ac ipsa totis viribus conaretur ire versus Y, atque ita recedere à centro E, secundum lineas rectas EAY, EBY, & similes.

Scio quidem, motum istius formicæ fore initio tardissimum, atque ideo ejus conatum, si tantum ad principium motus referatur, non videri magnum esse posse: atqui profecto non plane nullus est, & dum

LIX.  
*Quanta sit vis istius conatus.*

dum fortitur effectum, augetur, adeo ut motus ex eo proveniens fatis celer esse possit. Nam ut adhuc alio utamur exemplo, si E Y



- sit canalis, in quo globulus

A contineatur, primo quidem temporis momento, quo iste canalis agetur in gyrum, circa centrum E, globulus A motu tantum tardissimo progredietur versus Y; sed secundo momento paulo celerius incedet: priorem enim vim retinebit, ac præterea novam acquirat à novo conatu recedendi à centro E: quia

quandiu durat motus circularis, tamdiu ille conatus durat, & quasi renovatur singulis momentis. Atque hoc experientia confirmat. si enim canalis EY valde celeriter agatur circa centrum E, brevi globulus, in eo existens, ab A ad Y perveniet. Idemque etiam experimur in funda. quo celerius enim lapis in ea rotatur, eo magis funis intenditur; atque ista tensio, à sola vi qua lapis recedere conatur à centro sui motus exorta, exhibet nobis istius vis quantitatem.


LX.  
Hunc conatum reperi in materia calorum.

Quod vero hic de lapide in fundâ, vel de globulo in canali circa centrum E rotato, dictum est, facile intelligitur eodem modo de omnibus globulis secundi elementi, quod nempe unusquisque fati magna vi recedere conetur à centro vorticis in quo gyrat: retinetur enim hinc inde ab aliis globulis circumpositis, non aliter quàm lapis à funda. Sed præterea ista vis in illis multum augetur, ex eo quod superiores ab inferioribus, & omnes simul à materia primi elementi, in centro cuiusque vorticis congregata, premantur. Ac primo quidem, ut accurate omnia distinguantur, de solis istis globulis hic agemus; nec ad materiam primi elementi magis attendemus, quam si spatia omnia, quæ ab illa occupantur, vacua essent, hoc est, quam si plena essent materia, quæ aliorum corporum motus nullo modo juvaret, nec impediret. Nullam enim aliam esse posse spatii vacui veram ideam, ex ante dictis est manifestum.

Cum

Cum globuli omnes qui volvuntur circa S, in vortice AEI, conentur recedere ab S, ut jam demonstratum est, satis patet, il-

LXI.  
Ipsium efficiere, ut corpora Solis & Fixarum sint vortunda.



los qui sunt in linea recta SA, premere se mutuo omnes versus A; & illos qui sunt in linea recta SE, premere se versus E: atque ita de cæteris: Adeo ut, si non sint satis multi ad occupandum omne spatium inter S, & circumferentiam AEI, totum id quod non occupant, relinquatur versus S. Et quoniam ii qui sibi mutuo incumbunt, (exempli causa, ii qui sunt in linea recta SE,) non omnes instar baculi simul vertuntur, sed uni citius, alii tardius circuitum suum absolvent, ut infra fusius exponetur, spatium quod relinquunt versus S, non potest non esse rotundum. Etsi enim fingereimus, plures globulos initio fuisse in linea recta SE, quam in SA, vel SI, adeo ut infimi lineæ SE viciniores essent centro S, quam infimi lineæ SI; quia tamen infimi illi citius circuitum suum absolvisset quam superiores, nonnulli ex ipsis adjunxissent se statim extremitati lineæ SI, ut sic tanto magis recederent ab S, ideoque nunc omnes infimi istarum linearum æqualiter remoti sunt à puncto S, & ita spatium BCD, quod circa illud relinquunt, est rotundum.


Præterea notandum est, non modo globulos omnes qui sunt in linea recta SE, se invicem premere versus E; sed etiam unumquemque ex ipsis premi ab omnibus aliis, qui continentur inter lineas rectas ab illo ad circumferentiam BCD ductas, & ipsam tangentes. Ita exempli causa globulus F premitur ab omnibus aliis, qui sunt intra lineas BF & DF, sive in spatio triangulari BFD; non autem sic à reliquis: adeo ut si locus F esset vacuus, uno & eodem temporis momento globuli omnes, in spatio BFD contenti, accederent quantum possent ad illum replendum, non autem ulli alii. Nam quemadmodum videmus, eandem vim gravitatis, quæ lapidem in libero aëre cadentem recta du-

LXII.  
Eandem efficiere, ut materia caelestis ab omnibus punctis circumferentiae cuiusque stellæ, vel Solis, recedere conatur.

cit ad centrum terræ, illum etiam oblique eo deferre, cum impeditur ejus motus rectus à plani alicujus declivitate; ita non dubium est quin eadem vis, qua globuli omnes, in spatio BFD contenti, recedere conantur à centro S, secundum lineas rectas ab illo centro eductas, sufficiat ad ipsos etiam inde removendos per lineas à centro isto declinantes.

LXIII.  
Globulos  
materie  
caelestis se  
mutuo non  
impedire in  
istò conatu.

Hocque exemplum gravitatis, rem aperte declarabit, si consideremus globos plumbeos in vase BFD contentos, & sibi mutuo sic incumbentes, ut foramine facto in fundo vasis F, globus 1 vi gravitatis suæ descendat: simul enim alii duo 2, 2, illum sequentur, & hos subsequenter alii tres 3, 3, 3, & sic de cæteris; ita ut eodem temporis momento, quo infimus 1 incipiet moveri, alii omnes, in spatio triangulari BFD contenti, simul descendant, reliquis immotis. Vbi quidem notare licet, duos globos 2, 2, postquam aliquantulum sequuti sunt globum 1 descendentem, se



mutuo impedire ne ulterius pergant. Sed idem in globulis secundi elementi locum non habet: cum enim in perpetuo sint motu, quamvis aliquando possit contingere, ut eodem plane modo sint dispositi, ac globi plumbei in hac figura depicti; hoc non nisi per minimum temporis punctum, quod instans vocant, durare potest, & ideo continuitatem earum motus non interruptit. Ac præterea notandum est, vim luminis non in aliqua motus duratione consistere, sed tantummodo in pressione sive in prima præparatione ad motum, etli forte ex ea motus ipse non sequatur.

LXIV.  
Omnes lucis  
proprietates  
in isto  
conatu inveniri:  
adeo

Ex quibus clare percipitur, quo pacto actio illa, quam pro luce accipio, à Solis vel cujuscunque Stellæ fixæ corpore in omnes partes æqualiter se diffundat, & in minimo temporis momento ad quamlibet distantiam extendatur; & id quidem secundum lineas rectas, non

non à solo corporis lucidi centro, sed etiam à quibuslibet aliis ejus superficiei punctis, eductas. Vnde reliquæ omnes lucis proprietates deduci possunt. Quodque forte multis paradoxum videbitur, hæc omnia ita se habent in materia cœlesti, etiamsi nulla plane esset vis in Sole, aliove astro circa quod gyratur; adeo ut, si corpus Solis nihil aliud esset quam spatium vacuum, nihilominus ejus lumen, non quidem tam forte, sed, quantum ad reliqua, non aliter, quam nunc, cerneremus, saltem in circulo secundum quem in materia cœli movetur: nondum enim hic omnes sphaeræ dimensiones consideramus. Ut autem etiam possimus explicare, quidnam sit in ipso Sole ac Stellaris, quo ista vis luminis augeatur, & secundum omnes sphaeræ dimensiones diffundatur, nonnulla de cœlorum motu sunt præmittenda.

Quacunquæ ratione moti fuerint ab initio singuli eorum vortices, jam debent esse ita inter se compositi, ut unusquisque in eam partem feratur, secundum quam reliquorum omnium circumstantium motus minus illi adversantur: quia tales sunt leges naturæ, ut motus cujusque corporis alterius occursum facile possit inflecti. Quamobrem si ponamus, primum vorticeum, cujus centrum S, ferri ab A per E versus I, alius vortex ei vicinus, cujus centrum F, ferri debet ab A per E versus V, si nulli alii circumjacentes impediunt; sic enim eorum motus optime inter se consentient. Eodemque modo tertius vortex, cujus centrum non sit in plano S A F E, sed supra illud extans, cum centris S & F triangulum constituat, & qui duobus aliis vorticibus A E I & A E V in linea A E jungatur, ferri debet ab A per E sursum versus. Quo posito, quartus vortex, cujus centrum f, ferri non potest ab E versus I, ut ejus motus conveniat cum motu primi, quia sic adversaretur motibus secundi & tertii, nec ab E versus V, quemadmodum secundus, quia repugnarent primus & tertius; nec denique ab E sursum versus, ut tertius, quia repugnarent primus & secundus: Atque ideo superest, ut unum ex polis suis habeat versus E, aliumque in parte opposita versus B, vertaturque circa axem E B, ab I ad V.


Atque hic etiam notari debet, nonnihil adhuc contrarietatis in istis motibus fore, si trium priorum vorticum eclipticæ, hoc est, circuli à polis remotissimi, sibi mutuo directe occurrant in puncto E, in quo sit polus quarti vorticis. Nam si, exempli causa, I V X sit illa ejus pars quæ est circa polum E, vertiturque in orbem secundum

*ut lux ejus  
ope cerni pos-  
set tanquam  
ex stellis ma-  
nans, esset  
nulla vis ef-  
fet in ipsa  
stelle.*

LXV.  
*Cujusque  
vorticis.  
cœlorum po-  
los tange-  
re partes  
aliorum  
vorticum  
ab eorum po-  
lis remotas.*



NB.  
Vide fig.  
pag. seq.

LXVI.  
*Motus isto-  
rum vorti-  
cum a liquo  
modo inflecti,  
ut inter se  
consentiant.*





dum ordinem notarum IVX, prius vortex radet illam secundum lineam rectam EI, aliaque ipsi parallelas, & secundus vortex eandem radet secundum lineam EV, & tertius secundum lineam EX, qua ratione motui ejus circulari nonnihil repugnabunt. Sed hoc facile natura per leges motus emendat, trium priorum vorticum eclipticas nonnihil inflectendo in eam partem, secundum quam vertitur quartus. IVX; quo fit ut illi postea ipsum radant non secundum lineas rectas EI, EV, EX, sed secundum obliquas 1 I, 2 V, 3 X, & ita cum ipsius motu plane consentiant.




LXVII.  
Duorum  
vorticum  
polos se mu-  
tuo tangere  
non posse.

Nec sane ullus mihi videtur excogitari posse alius modus, secundum quem variorum istorum vorticum motus sibi mutuo minus adversentur. Si enim duorum polos se mutuo tangere supponamus, vel ambo in eandem partes ferentur; & ita in unum vorticem coalescent; vel in contrarias; & ita sibi mutuo quam-maxime repugnabunt. Atque ideo quamvis non tantum mihi assumam, ut omnium cœli vorticum situs & motus ausum determinare, puto tamen, generaliter posse affirmari, atque hic satis esse demonstratum, polos cujusque vorticis non tam vicinos esse polis aliorum vorticum contiguorum, quam partibus ab ipsorum polis valde remotis.

Præterea, in explicabilis illa varietas quæ apparet in situ fixarum, plane ostendere videtur, illos vortices qui circa ipsas voluntur, non esse inter se æquales. Quod autem nulla stella fixa esse possit, nisi in centro alicujus talis vorticis, ex ipsarum luce judico esse manifestum: lucem enim accuratissimè per tales vortices, ac sine illis nullâ aliâ ratione posse explicari, partim ex jam dictis, partim ex infra dicendis patebit. Et cum nihil plane aliud in Fixis sensu percipiamus, præter ipsarum lucem & apparentem situm, nullam habemus rationem aliud iis tribuendi, quam quod ad hæc duo explicanda requiri judicamus. At non magis requiritur ad lucem explicandam, ut vortices materiæ cœlestis circa ipsas voluntur, quam ad apparen-

LXVIII.  
Vortices ipsos  
esse magni-  
tudine inæ-  
quales.



tem earum situm, ut isti vortices sint magnitudine inæquales. Sed sane si sunt inæquales, necesse est, ut quorundam partes, à polis remotæ, tangant aliorum partes polis vicinas: quia majorum & minorum similes partes ad invicem applicari non possunt.

Ex his autem cognosci potest, materiam primi elementi fluere continuo versus centrum cuiusque vorticis, ex aliis circumjacentibus vorticibus, per partes ejus polis vicinas; ac vice versa, ex ipso in alios circumjacentes vortices effluere, per partes ab ejusdem polis remotas. Nam si ponamus, exempli causa, A Y B M esse vorticem primi cæli, in cuius centro est Sol, ejusque polos esse A australem, & B borealem, circa quos totus gyrat, quatuorque circumjacentes vortices K O L C gyrate circa axes TT, YY, ZZ, & MM, ita ut ille tangat duos O & C in ipsorum polis, & alios duos K & L in partibus ab eorum polis valde remotis: patet ex antedictis, omnem ejus materiam recedere conari ab axe AB, atque ideo majori vitendere versus partes Y & M, quam versus A & B. Cumque in Y & M occurrat polis vorticum O & C, in quibus non magna est vis ad ei resistendum; & in A & B occurrat partibus vorticum K & L, quæ ab eorum polis sunt remotissimæ; ac proinde majorem habent vim ad eundem ab L & K versus S, quam partes circumpolares vorticis S ad eundem versus L & K: non dubium est, quin materia quæ est in K & L, progredi debeat versus S, atque illa quæ est in S, versus O & C.

Atque id quidem non tantum de materia primi elementi, sed etiam de globulis secundi, esset intelligendum, si nullæ causæ peculiariter horum motum eo versus impedirent. Verum, quia multo celerior est agitatio primi elementi quam secundi, semperque ipsi liber est transitus per illos exiguos angulos, qui à globulis secundi occupari non possunt, etsi fingeremus, omnem materiam, tam primi quam secundi elementi, contentam in vortice L, uno & eodem tempore à loco medio inter centra S & L progredi cœpisse versus S; intelligeremus tamen, illam primielementi citius ad centrum S pervenire debuisse, quam illam secundi. Atqui materia primi elementi, sic in spatium S ingressa, tanta vi protrudit globulos secundi, non modo versus eclipticam *eg.* vel MY, sed maxime etiam versus polos *fd* vel AB, quemadmodum mox explicabo, ut hac ratione impediatur, ne illi qui veniunt ex vortice L, propius accedant versus S, quam usque ad certum aliquem terminum, qui hic li-


LXIX.

*Materiam primi elementi ex polis cuiusque vorticis fluere versus centrum, & ex centro versus alias partes.*

LXX.

*Idem de materia secundi elementi non posse intelligi.*

tera



tera B notatus est. Idemque de vortice K, & aliis omnibus, est judicandum.


Præterea etiam considerare oportet, particulas secundi elementi quæ voluntur circa centrum L, non solum habere vim recedendi ab isto centro, sed etiam perseverandi in sua celeritate, quæ duo sibi quodammodo adversantur: quia dum gyraunt in vortice L, à vicinis aliis vorticibus, qui supra & infra planum hujus figuræ intelligendi sunt, intra certos terminos cohibita, non possunt evagari versus B, quin tardius moveantur inter L & B, quam inter L & alios vicinos vortices, extra planum hujus figuræ intelligendos; & quidem tanto tardius, quanto spatium LB erit majus: nam cum circulariter moveantur, non possunt plus temporis impendere, in transeundo inter L & istos alios vortices, quam inter L & B. Atque idcirco, vis quam habent ad recedendum à centro L, efficit quidem ut non nihil evagentur versus B, quia ibi occurrunt partibus circumpolaribus vorticis S, quæ non difficulter ipsis cedunt; sed ex adverso vis quam habent ad retinendam celeritatem sui motus, impedit ne usque adeo evagentur, ut ad S perveniant. Quod idem non habet locum in materia primi elementi: ctsi enim in hoc consentiat cum particulis secundi, quod, simul cum ipsis gyraudo, recedere conetur à centris vorticum in quibus continetur, in eo tamen maxime dissentit, quod non opus sit ut quidquam de sua celeritate remittat, cum ab istis centris recedit, quia ubique fere æquales invenit vias ad motus suos continuandos; nempe in angustiis angulorum, qui à globulis secundi elementi non implentur. Quamobrem non dubium est, quin materia ista primi elementi continuo fluat versus S, per partes polis A & B vicinas, non modo ex vorticibus K & L, sed etiam ex pluribus aliis, qui non exhibentur in hac figura; quia non omnes in eodem plano sunt intelligendi; nec verum eorum situm, nec magnitudinem, nec numerum possum determinare. Non etiam dubium est, quin eadem materia effluat ex S, versus vortices O & C, ac etiam versus plures, sed quorum nec situm, nec magnitudinem, nec numerum definio; Vt neque definio, an eadem illa materia ex O & C statim revertatur ad K & L, an potius digrediat, ad multos alios vortices, à primo cælo remotiores antequam circulum sui motus absolvat.

Sed paulo diligentius est considerandum, quomodo ipsa moveatur

L

LXXII.

*Quomodo*LXXI.  
*Que servatio hujus diversitas.*



tur in spatio *defg*. Nempe illa ejus pars quæ venit ab *A*, recta pergit usque ad *d*; ubi globulis secundi elementi occurrens, illos versus *B* propellit; eodemque modo alia pars quæ venit à *B*, recta pergit usque ad *f*; ubi occurrit globulis secundi elementi, quos repellit versus *A*. Et statim tam quæ est versus *d*, quam quæ versus *f*, reflectitur in omnes partes versus eclipticam *eg*, omnesque globulos secundi elementi circumjacentes æqualiter pellit; ac denique per meatus, qui sunt inter istos globulos circa eclipticam *eg*, versus *M* & *Y* elabitur. Præterea dum ista materia primi elementi proprio motu sic recta fertur ab *A* & *B* versus *d* & *f*, fertur etiam circulariter motu totius vorticis circa axem *AB*; adeo ut singula ejus ramenta lineas spirales, sive in modum cochleæ contortas, describant; quæ spirales postea, cum ad *d* & *f* pervenerunt, inde utrimque reflectuntur versus eclipticam *eg*. Et quia spatium *defg* majus est quam meatus, per quos materia primi elementi in illud ingreditur, velex ipso egreditur, idcirco semper ibi aliqua ejus materiæ pars manet, corpusque fluidissimum componit, quod perpetuo circa axem *fd* se ipsum rotat.

*movetur materia, quæ Solem componit.*

Notandumque est in primis, hoc corpus sphericum esse debere. Quamvis enim ob inæqualitatem vorticum, non putandum sit, omnino æqualem copiam materiæ primi elementi summitti versus *S*, à vorticibus vicinis unius poli, atque à vicinis alterius; nec etiam istos vortices ita esse sitos, ut materiam illam in partes directe oppositas mittant; nec alios vortices, primum cælum versus ejus eclipticam tangentes, certum aliquem ipsius circulum, qui pro ecliptica sumi possit, eodem modo respicere, materiamque ex *S*, per omnes partes istius circuli, aliasque ipsi vicinas, egredientem, pari facilitate in se admittere: Non tamen inde ullæ inæqualitates in figura Solis argui possunt, sed tantum in ejus situ, motu & quantitate. Nempe si vis materiæ primi elementi, venientis à polo *A* versus *S*, major sit quam venientis à polo *B*, illa quidem materia, priusquam alterius occurso repelli possit, longius progredietur versus *B*, quam hæc altera versus *A*; sed ita longius progrediendo ejus vis minuetur; ac, juxta leges naturæ, se mutuo tandem ambæ repellent illo in loco, in quo earum vires erunt inter se plane æquales, atque ibi corpus Solis constituent: quod proinde remotius erit à polo *A*, quam à polo *B*. Sed non majori vi pelluntur

LXXIII.  
*Varias esse inæqualitates in situ corporis Solis.*






globuli secundi elementi in ejus circumferentiæ parte *d*, quam in parte *f*, nec ideo circumferentia ista minus erit rotunda. Item si materia primi elementi facilius egrediatur ex *S* versus *O*, quam versus *C*, (illic scilicet liberius spatium inveniend) hoc ipso corpus *S* nonnihil accedet versus *O*, & isto accessu spatium interjectum minuendo, ibi tandem sistetur, ubi vis erit utrimque æqualis. Atque ita, quamvis ad solos quatuor vortices *LCKO* respiceremus, modo tantum eos supponamus esse inter se inæquales, inde sequitur, Solem *S*, nec in spatio medio inter *O* & *C*, nec etiam in medio inter *L* & *K* esse debere. Majorque adhuc in ejus situ inæqualitas potest intelligi ex eo, quod alii plures vortices ipsum circumstent.

Præterea si materia primi elementi, veniens ex vorticibus *K* & *L*, non secundum lineas tam rectas feratur versus *S*, quam versus alias aliquas partes: exempli causa, quæ venit ex *K* versus *e*, quæ autem ex *L* versus *g*: hinc fiet ut poli *fd*, circa quos tota Solis materia vertetur, non sint in lineis rectis à *K* & *L* ad *S* ductis, sed Australis *f* aliquanto magis versus *e* accedat, & Borealis *d* versus *g*. Item si linea recta *SM*, per quam materia primi elementi facillime egreditur ab *S* versus *C*, transeat per punctum circumferentiæ *fed*, vicinior puncto *d* quam puncto *f*; ac linea *SY*, per quam ista materia præcipue tendit ad *S* versus *O*, transeat per punctum circumferentiæ *fgd*, vicinior puncto *f* quam puncto *d*; hinc fiet ut *eg* Solis ecliptica, sive planum in quo movetur illa ejus materia, quæ maximum circulum describit, paulo magis inclinetur à parte *e* versus polum *d* quam versus polum *f*, sed tamen non tantum quam linea recta *SM*; atque ex parte *g* magis inclinetur versus *f* quam versus *d*, sed etiam non tantum quam recta *SY*. Vnde sequetur, axem, circa quem tota Solis materia vertitur, & cujus extremitates sunt poli *fd*, non esse lineam accuratè rectam, sed nonnihil curvam sive inflexam, materiamque istam aliquanto celerius gyrare inter *e* & *d*, vel inter *f* & *g*, quam inter *e* & *f*, vel *dg*; ac forte etiam non omnino æquali celeritate gyrare inter *e* & *d*, atque inter *f* & *g*.

Quod tamen non potest impedire, ne ipsius corpus sit quam proximè rotundum; quia interim alius ejus motus, à polis versus eclipticam, inæqualitates istas compensat. Eademque ratione, qua videmus ampullam vitream ex eo solo fieri rotundam, quod ær in

LXXIV.  
*Varas-*  
*ism esse in*  
*ejus mate-*  
*ria motu.*

LXXV.  
*Est tamen*  
*non impe-*  
*dire ne ejus*  
*figura sit*  
*rotunda.*



ejus materiam, igne liquefactam, per tubum ferreum immittatur: quia nempe iste aër non majori vi ab ampullæ orificio in ejus fundum tendit, quam inde in omnes alias partes reflectitur, & æque facile illas omnes pellit: Ita materia primi elementi, corpus Solis per ejus polos ingressa, debet omnes globulos secundi elementi circumjacentes æqualiter undequaque repellere; non minus illos in quos oblique tantum reflectitur, quam illos in quos directe impingit.

Notandum deinde, materiam istam primi elementi, quamdiu versatur inter globulos secundi, habere quidem motum rectum, à polis AB ad Solem, & à Sole ad eclipticam YM, ac circularem circa polos toti cælo AMBY communem; sed præterea etiam maximam & præcipuam partem suæ agitationis impendere in minutiarum suarum figuris assidue mutandis, ut omnes exiguos angulos per quos transit, accurate possit implere: Vnde fit, ut ejus vis, valde divisa, debilior sit; ac singulæ ejus minutiarum motibus globulorum secundi elementi sibi vicinorum obsequantur, semperque paratæ sint ad exeundum ex illis angustiis, in quibus ad tam obliquos motus coguntur, atque ad recta pergendum versus quascunque partes. Eam autem materiam, quæ est in corpore Solis coacervata, valde multum virium ibi habere propter consensum suarum omnium partium in eisdem celerrimos motus, omnesque illas suas vires impendere in globulis secundi elementi circumjacentibus hinc inde propellendis.

Atque ex his potest intelligi, quantum materia primi elementi conferat ad illam actionem, in qua lucem consistere ante monuimus, & quomodo illa actio non modo versus eclipticam, sed etiam versus polos in omnes partes se diffundat. Nam primo, si putemus, esse aliquod spatium in H, solâ materiâ primi elementi repletum, & tamen satis magnum ad unum aut plures ex globulis secundi recipiendos, non dubium est quin uno & eodem temporis momento globuli omnes contenti in cono d H f, cujus basis est concavum hemisphærium def, versus illud accedant.

Iamque id supra ostensum est de globulis contentis in triangulo, cujus basis erat semicirculus eclipticæ solaris, quamvis nondum ulla actio primi elementi spectaretur; sed nunc hoc ipsum de iisdem, simulque etiam de reliquis in toto cono contentis, hujus primi elementi ope clariùs patebit. Ea enim ejus pars quæ corpus Solis compo-

LXXXVI.

*De motu  
primi ele-  
menti dum  
versatur  
inter globu-  
los secundi.*

LXXXVII.

*Quomodo  
Solis lumen  
non modo  
versus Ec-  
lipticam,  
sed etiam  
versus polos  
se diffundat.*

LXXXVIII.

*Quomodo  
versus Ec-  
lipticam se  
diffundat.*

nit,



nit, tanq̄ globulos secundi elementi qui sunt versus eclipticam  $e$ , quam etiam eos qui sunt versus polos  $d f$ , ac denique omnes qui sunt in cono  $d H f$ , versus  $H$  propellit. neque enim ipsa majori vi movetur versus  $e$ , quam versus  $d$  &  $f$ , aliasque partes intermedias: illa vero quæ jam supponitur esse in  $H$ , tendit versus  $C$ , unde per  $K$  &  $L$  versus  $S$  tanquam in circulum regrediatur. Ideoque non impedit ne globuli isti ad  $H$  accedant, & eorum accessu spatium quod prius ibi erat, corpori Solis accrescat, impleaturque materiâ primi elementi, à centrīs  $KL$  & similibus eò confluente.

Quin ipsa potiùs ad hoc juvat; cum enim omnis motus tendat in lineam rectam, materia maxime agitata in  $H$  existens, magis propendet ad inde egrediendum quam ad remanendum. quo enim spatium in quo versatur est angustius, eo magis inflectere cogitur suos motus. Et idcirco minime mirum esse debet, quod sæpe ad motum alicujus minutissimi corporis alia corpora, per quantumvis magna spatia diffusa, simul moveantur: nec proinde etiam, cur non tantum Solis, sed & stellarum quam maxime remotarum, actio ad terram usque in minimo temporis momento perveniat.

LXXIX.

*Quam facile ad motum unius exigui corporis alia quam maxime ab eo remota moveantur.*

Si deinde putemus, spatium  $N$  sola materia primi elementi plenum esse, facile intelligemus, omnes globulos secundi, qui continentur in cono  $g N e$ , à materia primi, quæ in Sole existens, à  $d$  versus  $f$ , simulque versus totum hemisphærium  $efg$  magna vi movetur, eo versus pelli debere, quamvis ex se ipsis nullam forte habeant propensionem ad istum motum: neque enim etiam ei repugnant, ut neque materia primi elementi, quæ est in  $N$ ; ipsa enim paratissima est ad eundem versus  $S$ , ibique spatium implendum, quod, ex eo quod globuli hemisphærii concavi  $efg$  versus  $N$  ferentur, corpori Solis accrescet. Nec ulla est difficultas, quod, uno & eodem tempore, globuli secundi elementi à  $S$  versus  $N$ , & materia primi ab  $N$  versus  $S$ , tanquam motibus contrariis, debeant ferri: cum enim hæc materia primi non transeat nisi per illa angustissima intervalla, quæ globuli secundi non replent, ejus motus ab ipsis non impeditur; ut neque videmus, in illis horologiis, quibus clepsydram loco nunc utimur, arenam, ex vase superiori descendentem, impedire quo minus aer ex inferiori per interstitia ejus granulorum ascendat.


LXXX.

*Quomodo lumen Solis tendat versus polos.*

Quæri tantum potest, an tanta vi pellantur globuli contenti in

M

LXXXI.  
conco  
*An equalis*



eono e N g, versus N, à sola materia Solis, quanta globuli f H d versus H, ab eadem materia Solis, ac simul à proprio motu; quod non videtur, si H & N ab S æquidistant. Sed quemadmodum, ut jam notatum est, minor est distantia versus polos, inter Solem & circumferentiam cœli quod illum ambit, quam versus eclipticam: ita tunc ad summum illa vis esse potest æqualis, cum eadem est proportio inter lineas HS & NS, quæ est inter MS & AS. Unumque tantum habemus in natura phænomenum, ex quo ejus rei experimentum capi possit: nempe cum forte aliquis Cometa tantam cœli partem pererret, ut primo visus in Ecliptica, videatur deinde versus unum ex polos, ac postea rursus in ecliptica; tunc enim, habita ratione ejus distantæ, potest æstimari, an ejus lumen (quod à Sole esse, infra ostendam) cæteris paribus majus appareat versus eclipticam, quam versus polum.

Supereft adhuc notandum, circa globulos secundi elementi, eos, qui proximi sunt centro cujusque vorticis, minores esse, ac celerius moveri, quam illos qui paulo magis ab eo distant, idque usque ad certum terminum, ultra quem superiores inferioribus celerius moventur, & quantum ad magnitudinem sunt æquales. Vt hic, exempli causa, in primo cœlo putandum est, omnium minutissimos globulos secundi elementi, esse juxta superficiem Soli *de f g*, & paulo remotiores gradatim esse majores; usque ad superficiem sphæroidis HNQR, ultra quam omnes sunt æquales; atque illos qui sunt in hac superficie HNQR, omnium tardissime moveri; adeo ut forte globuli H Q triginta annos vel etiam plures impendant, in absolvendo uno circuito circa polos AB, superiores autem versus M & Y, itemque inferiores versus e & g, celerius moveantur, & tani supremi, quam infimi, circuitus suos intra paucas hebdomadas absolvant.

Et primo quidem, quod superiores versus M & Y celerius ferri debeant, quam inferiores versus H & Q, facile demonstratur. Ex eo enim quod supposuerimus, omnes in principio fuisse magnitudinis æquales, (ut par fuit, quia nullum habuimus ipsarum inæqualitatis argumentum) & quod spatium in quo tanquam in vortice circulariter aguntur, non sit accurate rotundum; tum quia alii vortices circumjacentes non sunt æquales; tum etiam quia illud debet esse angustius, è regione centri cujusque ex istis vorticibus vicinis, quam è regione centri cujusque ex istis vorticibus vicinis, quam è regione aliarum ejus partium: necesse est ut aliquando quædam ex ipsis cele-

*sit ejus vis in polis & in ecliptica.*

LXXII. Globules secundi elementi Soli vicines minores esse, ac celerius moveri quam remotiores, usque ad certam distantiam, ultra quam sunt omnes magnitudinis æquales, & eo celerius moveri, quo sunt à Sole remotiores.

LXXXIII. Cur remotissimi celerius moveantur quam aliquanto minus remoti.





rius, quam aliæ, moveantur, cum nempe ordinem debent mutare, ut ex via latiori transeant, in angustiorem. Sic, exempli causa, duo globi, qui sunt inter puncta A & B, non possunt transire inter duo vicina C & D, nisi unus alium præcedat: & manifestum est, eum qui præcedit, altero celerius moveri. Deinde quia omnes globuli primi cæli tota sua vi recedere conantur à centro S, statim atque aliquis ex ipsis celerius quam vicini movetur, ille, hoc ipso majorem habens vim, magis à centro illo recedit; & ita semper superiores illi sunt qui celerius moventur.




Quanta autem sit ista eorum celeritas, sola experientia docere potest; nullamque habemus ejus experientiam, nisi in Cometis, quos ex uno cælo in alium migrare infra ostendam: ut neque possumus determinare tarditatem circuli H Q, nisi ex motu Saturni, quem in illo vel infra illum esse demonstro.

Quod vero, infra terminum H Q, globuli, propiores centro S, celerius circumfervant quam remotiores, probatur ex circumvolutione materiæ solaris, omnem illam cæli partem sibi vicinam secum rapiens: neque enim potest dubitari, cum ipsa sit celerissime agitata, & semper aliquid sui per angustos meatus, qui sunt inter globulos secundi elementi, versus eclipticam emittat, & versus polos recipiat, quin habeat vim secum rapiendi globulos istos usque ad certam distantiam. Hujusque distantiam terminum designamus ellipsi H N Q R, non circulo. quamvis enim Sol sit sphericus, ac non minori vi pellat materiam cæli circumjacentem versus polos quam versus eclipticam illa actione in qua ejus lucem consistere diximus, non potest tamen idem intelligi de hac altera actione, qua istam cæli materiam secum in orbem rapit, quia pendet à solo ejus motu circulari circa suum axem; qui motus procul dubio potentior est in ecliptica, quam versus polos; & ideo hic H & Q magis distare debent ab S, quam N & R. Atque hinc infra ratio reddetur, cur Cometarum caudæ aliquando rectæ, aliquando curvæ appareant.

M 3

Cum

LXXXIV.  
*Cur Soli proximi celerius etiam ferantur, quam paulo remotiores.*



Cum autem hic, intra terminum H Q inferiores globuli inæriæ cœlestis celerius moveantur quam superiores, debent etiam esse minores. Si enim essent majores vel æquales, hoc ipso haberent plus virium, ideoque superiores evaderent. Sed ubi semel contingit, aliquem tanto esse minorem iis qui supra ipsum sunt, ut magis ab iis magnitudine superetur, quam illos celeritate superet, semper postea illis inferior manere debet. Et si vero globulos istos in principio quam accuratissime æquales Deo factos fuisse supponamus, fieri tamen non potuit lapsu temporis, ob inæqualitatem spatiorum quæ percurrunt, & inæqualitatem eorum motus inde ortam, ut paulo ante demonstratum est, quin aliqui alii minores evaderent, iique essent satis multi ad spatium H N Q R implendum. Neque enim consideramus hoc spatium, cum magnitudine totius vorticis A Y B M comparatum, nisi tanquam admodum parvum: ut etiam magnitudo Solis, ad ipsum comparata, perexigua est intelligenda; quamvis ista eorum proportio, non potuerit hic in figura exhiberi, quia nimis vasta esse debuisset. Notandum etiam est, varias esse alias inæqualitates in motibus partium cœli, præsertim earum quæ sunt inter S & H vel Q; de quibus paulo post commodius agetur.

Denique non est omittendum, materiam primi elementi, venientem ex vorticibus K L & similibus, præcipue quidem ferri versus Solem, sed plurimas tamen etiam ejus partes per totum vorticem A Y B M dispergi, atque inde ad alios C O, & similes, transire, ac, fluendo circa globulos secundi elementi, efficeret ut ipsum circa propria centra, tum forte etiam aliis modis moveantur. Cumque sic illi globuli non una tantum ratione, sed multis diversis, eodem tempore agitentur, hinc clare percipitur, ipsos, cujuscunque figuræ fuerint in principio, nunc debere esse plane sphericos, non instar cylindri, aut cujusvis spheroidis, una tantum ex parte rotundos.

Postquam autem naturam primi & secundi elementi sic utcunque explicuimus, ut tandem de tertio agere possimus, considerandum est, materiam primi non esse æqualiter agitatam secundum omnes suas minutias; sed sæpe in perexigua ejus quantitate innumeros reperiri diversos gradus celeritatis. Quod perfacile demonstratur, tum ex modo quo ejus generationem supra descripsimus, tum etiam ex continuo ejus usu: finximus enim, eam genitam esse ex eo, quod parti-

LXXXV.


*Cur idem  
Soli proximi,  
sint remotioribus  
minores.*

LXXXVI.

*Globulos secundi elementi variis modis simul moveri, quasi ut plane sphericum reddantur.*

LXXXVII.

*Varios esse gradus celeritatis in minutis primi elementi.*



Cum autem hic, intra terminum H Q inferiores globuli materiæ cœlestis celerius moveantur quam superiores, debent etiam esse minores. Si enim essent majores vel æquales, hoc ipso haberent plus virium, ideoque superiores evaderent. Sed ubi semel contingit, aliquem tanto esse minorem iis qui supra ipsum sunt, ut magis ab iis magnitudine superetur, quam illos celeritate superet, semper postea illis inferior manere debet. Etsi vero globulos istos in principio quam accuratissime æquales Deo factos fuisse supponamus, fieri tamen non potuit lapsu temporis, ob inæqualitatem spatiorum quæ percurrunt, & inæqualitatem eorum motus inde ortam, ut paulo ante demonstratum est, quin aliqui aliis minores evaderent, iique essent satis multi ad spatium H N Q R implendum. Neque enim consideramus hoc spatium, cum magnitudine totius vorticis A Y B M comparatum, nisi tanquam admodum parvum: ut etiam magnitudo Solis, ad ipsum comparata, perexigua est intelligenda; quamvis ista eorum proportio, non potuerit hic in figura exhiberi, quia nimis vasta esse debuisset. Notandum etiam est, varias esse alias inæqualitates in motibus partium cœli, præsertim earum quæ sunt inter S & H vel Q; de quibus paulo post commodius agetur.

Denique non est omnittendum, materiam primi elementi, venientem ex vorticibus K L & similibus, præcipue quidem ferri versus Solem, sed plurimas tamen etiam ejus partes per totum vorticem A Y B M dispergi, atque inde ad alios C O, & similes, transire, ac, fluendo circa globulos secundi elementi, efficere ut ipsi tum circa propria centra, tum forte etiam aliis modis moveantur. Cumque sic isti globuli non una tantum ratione, sed multis diversis, eodem tempore agitentur, hinc clare percipitur, ipsos, cujuscunque figuræ fuerint in principio, nunc debere esse plane sphaericos, non instar cylindri, aut cujusvis sphaeroidis, una tantum ex parte rotundos.

Postquam autem naturam primi & secundi elementi sic utcunque explicuimus, ut tandem de tertio agere possimus, considerandum est, materiam primi non esse æqualiter agitatum secundum omnes suas minutias; sed sæpe in perexigua ejus quantitate innumeros reperiri diversos gradus celeritatis. Quod perfacile demonstratur, tum ex modo quo ejus generationem supra descripsimus, tum etiam ex continuo ejus usu: finximus enim, eam genitam esse ex eo, quod parti-

LXXXV.

*Cur idem Soli proximi, sint remotioribus minores.*


LXXXVI.

*Globulos secundi elementi variis modis simul moveri; quo fit ut plane sphaerici reddantur.*

LXXXVII.

*Varios esse gradus celeritatis in minutis primi elementi.*

particulæ secundi elementi nondum sphericæ, sed angulosæ, ac totum spatium, in quo erant, implentes, moveri non potuerint, quin earum anguli attererentur, ac minutæ, ab iis attrita isto separatæ, figuras suas diversimode mutarent, pro ratione diversi loci occupandi, sicque primi elementi formam assumerent; nunquam adhuc eodem modo putamus, illud primum elementum inservire implendis omnibus spatiorum angulistiis, quæ circa alia corpora reperiuntur. Vnde manifestum est, unasquasque ex ejus minutis majores initio non fuisse quam anguli particularum ex quibus excidebantur; sive quam spatium, quod tres globuli, se mutuo contingentes, in medio sui relinquunt; atque ideo quasdam ex ipsis plane indivisas manere potuisse, dum aliæ interim egredientes ex angustis spatiis, quorum figura mutabatur magis & magis, indefinite dividi debuerunt. Sint, exempli causa, tres globuli A B C, quorum duo primi A & B, se mutuo tangentes in G, circa propria centra tantum vertantur,



dum interim tertius C, tangens primum in E, volvetur supra ipsum ab E versus I, donec puncto D tangat secundum in puncto F: manifestum est, materiam primi elementi, quæ continetur in spatio triangulari FGI, sive ex pluribus ramentis constet, sive tantum ex uno, posse interim manere immotam; sed illam quæ est in spatio FIED, necessario moveri, & nullum tam exiguum ejus ramentum inter puncta D & F posse designari, quod non sit majus eo quod inde auferretur singulis momentis, quia globulus C, accedendo ad B, efficit ut linea DF transeat per innumeros diversos gradus brevitas.

Sic igitur in materia primi elementi quædam sunt ramenta reliquis minus divisa, & minus celeriter agitata; quæ cum supponantur excisa fuisse ex angulis particularum secundi, cum nondum in globulos tornatæ erant, & omnia spatia sola implebant, non possunt non habere figuras valde angulosas, & ad motum ineptas; Vnde fit ut facile sibi mutuo adhæreant, magnamque partem suæ agitationis transferant in illa alia ramenta, quæ minutissima sunt, & celerrime agitantur: Quia juxta leges naturæ majora corpora, cæteris paribus,

## LXXXVIII.

*Eas ejus minutias quæ minimum habent celeritatis: facile id ipsum quod habent aliis transferre, ac sibi mutuo adherere.*

Sic igitur in materia primi elementi quædam sunt ramenta reliquis minus divisa, & minus celeriter agitata; quæ cum supponantur excisa fuisse ex angulis particularum secundi, cum nondum in globulos tornatæ erant, & omnia spatia sola implebant, non possunt non habere figuras valde angulosas, & ad motum ineptas; Vnde fit ut facile sibi mutuo adhæreant, magnamque partem suæ agitationis transferant in illa alia ramenta, quæ minutissima sunt, & celerrime agitantur: Quia juxta leges naturæ majora corpora, cæteris paribus,

bus, facilius id quod habent agitationis in minima transferunt, quam novam ullam agitationem ab illis aliis recipiant.

Et quidem talia ramenta præcipue reperiuntur in ea materia primi elementi, quæ à polis versus medium cæli secundum lineas rectas movetur: ejus enim partes quamminimum agitatæ sufficiunt ad istum motum rectum, non autem ad alios magis obliquos & varios, qui fiunt in aliis locis; ex quibus idcirco expelli solent in viam istius motus recti, & ibi congregantur in exiguas massas, quarum figuram hic velim diligenter considerari.

Nempe cum sæpe transeant per angusta illa spatia triangularia, quæ in medio trium globulorum secundi elementi, se mutuo tangentium, reperiuntur; debent induere figuram in sua latitudine & profunditate triangularem. Quantum autem ad longitudinem, non facile est ipsam determinare, quia non videtur ab alia causa pendere, quam à copia materiæ ex qua istæ massulæ conflantur; sed sufficit, illas concipere tanquam exiguas columnas: tribus striis in modum cochlearum intortis excavatas, ita ut gyrando transire possint per illos angustos meatus, figuram habentes trianguli curvilinei FGI, qui semper inter tres globulos secundi elementi se mutuo tangentes reperiuntur. Quippe ex eo quod sint oblongæ, ac motu celerissimo transeant inter istos globulos secundi elementi, dum interim ipsi alio motu circa polos cæli rotantur, clare intelligitur, illarum strias in modum cochlearum debere esse intortas; & quidem magis vel minus intortas, prout transeunt per partes axi vorticis remotiores aut viciniores; quia globuli secundi elementi celerius in illis quam in istis rotantur, ut ante dictum est.

Ac etiam ex eo quod ipsæ veniant versus medium cæli, ex partibus contrariis; unæ scilicet ab Australi, aliæ à Boreali; dum interim totus vortex circa suum axem in unam & eandem partem movetur; manifestum est, illas quæ veniunt à polo Australi, non in eandem partem debere intortas esse, ac illas quæ veniunt à polo Boreali, sed plane in contrarias. quod animadversione valde dignum puto; quia hinc vires magnetis, infra explicandæ, præcipue dependent.

Sed ne quis forte existimet, me sine ratione affirmare, tres tantum strias in istis primi elementi particulis esse posse, cum tamen globuli secundi non ita semper omnes se mutuo possint contingere, ut tantum triangularia spatia circa se relinquunt, velim hic notari,

N alia

LXXXIX.

*Tales minutias, sibi mutuo adhaerentes, præcipue inveniri in ea materia primi elementi, quæ a polis ad centrum vorticum fertur.*

X C.

*Qualis sit figura istarum minutiarum, quæ particula strias deinceps vocabuntur.*


X C I.

*Istas particulas, ab oppositis polis venientes, contrario modo esse intortas.*

X C II.

*Tres tantum strias in ipsis esse.*

alia quævis loca ampliora, quæ inter globulos istos sæpe reperiuntur, habere semper suos angulos, plane æquales is trianguli FGI,



ac quantum ad cætera, et sic in perpetua mutatione; adeo ut particulæ striatæ primi elementi, per illa transeuntes, eam etiam figuram quam descripsimus, debeant induere. Nam exempli causa, quatuor globuli ABCH, se tangentes in punctis K L G E, relinquunt in medio sui spatium quadrangulare, cujus quisque angulus est omnino æ-

qualis unicuique ex angulis trianguli FGI; cumque quatuor isti globuli moventur, spatium istud assidue figuram mutat, sitque nunc quadratum, nunc oblongum, ac etiam interdum in duo alia spatia triangularia dividitur; unde fit ut materia primi elementi minus agitata, quæ in eo existit, ad unum vel duos ex ejus angulis debeat confluere, ac residuum spatii relinquere materiæ mobiliori, & figuras suas facilius mutanti, ut eas ad omnes istorum globulorum motus accommodet. Atque si forte unum ex ejus ramentis, in uno ex istis angulis existens, extendat se ibi versus partem illi angulo oppositam, ultra spatium æquale triangulo FGI, debet inde expelli, ac proinde imminui, cum accidet ut tertius globulus tangat duos illos, qui angulum in quo versatur efficiunt. Nempe si materia minus agitata, occupans angulum G, extendat se versus D ultra lineam FI, inde extrudetur à globulo C, atque eatenus minuetur, cum hic globulus C accedet ad B, ut claudat triangulum GFI. Et quia particulæ primi elementi, quæ in eo maximæ sunt, & reliquis minus agitatæ, per longos cæli tractus transeundo non possunt non sæpe ita versari inter tres globulos ad se invicem accedentes, non videntur posse induere ullam figuram determinatam, & aliquandiu in ipsis permanentem, præter illam quam descripsimus.

Et si autem hæ particulæ oblongæ ac striatæ valde differant à reliqua materia primi elementi, non tamen illas ab hac distinguimus, quandiu tantum inter globulos secundi versantur; tum quia nullum peculiarem earum effectum ibi advertimus; tum etiam, quia multas alias, non multo minores, nec celerius agitatas, in ea contineri arbitramur; ita ut inter omnium minutissimas, & istas striatas, innumeri sint aliarum gradus; ut facile ex inæqualitate viarum, quas perlabuntur, agnosci potest.

Sed

XCIII.  
Inter particulas striatas, & omnium minutissimas, varias esse aliarum magnitudines in primo elemento.



Sed quando materia ista primi elementi ad corpus Solis alteriulve sideris pervenit, ibi omnes ejus minutia maxime agitata, cum nullis globulorum secundi elementi obicibus impediuntur, in similes motus consentire laborant: Vnde fit ut illa striata, nec non etiam alia multa paulo minores, quae ob figuras nimis angulosas, molemve nimis magnam, tantam agitationem refugiunt, ab aliis minutissimis separentur, ac sibi mutuo facile adhaerentes, propter inaequalitatem suarum figurarum, moles aliquando permagnas componant, quae intima caeli superficiei contiguae, sideri ex quo emerferunt adjunguntur, & ibi resistentes illi actioni, in qua vim luminis consistere supra diximus, similes sunt illis maculis quae in Solis superficiei conspici solent. Eadem enim ratione, qua videmus aquam liquoresque alios quoscunque, cum igni admoti effervescent, atque aliquas particulas diversae a reliquis naturae, ac minus ad motum aptas, in se continent, densam spumam ex particulis istis conflatam emittere, quae supra ipsorum superficiem natat, figurasque admodum irregulares & mutabiles habere solet: ita perspicuum est, materiam Solis, utrimque ex ejus polis versus eclipticam ebullientem, debere particulas suas striatas, aliasque omnes quae facile sibi mutuo adhaerent, ac difficulter communi ipsius motui obsequuntur, ex se tanquam spumam expellere.

Atque hinc facile est cognoscere, cur Solis maculae non soleant apparere circa ejus polos, sed potius in partibus eclipticae vicinis; & cur figuras habeant valde varias & incertas: & denique cur in orbem circa Solis polos, si non tam celeriter quam ejus substantia, saltem simul cum ea parte caeli quae illi proxima est, moveantur.

At vero, quemadmodum plerique liquores eandem spumam, quam initio effervescento emittunt, rursus postea diutius ebulliendo resorbent & absument; ita putandum est, eadem facilitate qua materia macularum e corpore Solis emergit, atque in ejus superficiei cumulat, paulo post etiam imminui, & partim in ejus substantiam refundi, partimque per caelum vicinum dispergi. (Non enim ex toto Solis corpore, sed tantum ex materia quae recens in illum ingressa est, maculae istae formantur.) Ac reliqua materia quae diutius in eo permansit, jamque, ut ita loquar, excocta est & defaecata, summa vi semper gyrans, partim eas quae jam factae sunt abradit, dum interim alia in parte nova generantur ex nova materia Solem ingrediente: unde fit ut non omnes in iisdem locis appareant. Et sane

XCV.

*Quomodo  
exis maculae in Solis  
vel Stellarum superficiei  
generentur.*

XCV.

*Hinc cognoscitur  
praeceptas  
harum macularum  
proprietates.*

XCVI.

*Quomodo  
istae maculae  
dissolvuntur,  
ac novae  
generentur.*

tota Solis superficies, partibus circumpolaribus exceptis, materia ex qua componuntur, tegi solet; Atqui maculæ tantum esse dicuntur, ubi materia illa est tam densa & itipaga, ut vim luminis à Sole venientis notabiliter obtundat.

**XC VII.** Præterea potest contingere, ut maculæ istæ, cum sunt paulo crassiores & densiores, prius in sua circumferentia quam in medio atterrantur à puriore materia Solis eas circumfluente; sicque ut extremitates earum circumferentiæ, in acutum desinentes, ejus lumini perviæ sint: unde sequitur, ipsas ibi Iridis coloribus pingi debere, ut antehac de prismate vitreo in Meteoris cap. 8 explicui. Et tales aliquando colores in illis observantur:

*Cur in quarundam extremitate colores iridis appareant.*

**XC VIII.** Sæpe etiam contingit, ut materia Solis, circa maculas istas fluendo, supra ipsarum extremitates assurgat; tuncque, inter illas & cæli vicini superficiem intercepta, cogitur ad motum solito celeriorum: Eodem modo quo fluminum rapiditas semper est major in locis vadosis & angustis, quam in latis & profundis. Vnde sequitur, Solis lumen ibi aliquanto fortius esse debere. Atque ita maculæ in faculas converti solent. Hoc est, quædam solaris superficiæ partes, quæ prius aliis erant obscuriores, postea fiunt lucidiores; Ac vice versa, faculæ in maculas mutari videntur, cum, his una ex parte in subtiliorem Solis materiam demersis, magna copia novæ materiæ alia ex parte ipsis accedit, & adhæret.

*Quomodo maculæ in faculas vertantur, vel contra.*

**XC IX.** Cum autem istæ maculæ dissolvuntur, non abeunt in minutias plane similes iis ex quibus fuerant conflata; sed partim in tenuiores, ac simul solidiores, sive figuras minus angulosas habentes; quo nomine ad motum sunt aptiores; & ideo facile per meatus, qui sunt inter globulos cæli circumjacentis, versus alios vortices tendunt; partim in tenuissimas quæ ex aliarum angulis crassæ, vel in purissimam Solis substantiam, convertuntur, vel abeunt etiam versus cælum; partim denique in crassiores, quæ ex pluribus striatis, aliisve simul junctis compositæ, versus cælum expelluntur; ubi cum sint nimis magna ad transeundum per illos angustos meatus, quos globuli secundi elementi circa se relinquunt, ipsarum globulorum istorum loca subingrediuntur; & quia figuras habent valde irregulares & ramosas, non tam facile ac illi globuli moveri possunt.

*In quales particulas maculæ dissolvantur.*

**C.** Sed sibi mutuo nonnihil adhærentes, componunt ibi magnam quandam molem, rarissimam, & aëri (sive potius ætheri) terræ circumfuso non absimilem, quæ à Sole circumquaque, forte usque ad spheram

*Quomodo ex ipsis æther circa Solem*

sphæram Mercurii, vel etiam ultra illam, se extendit. Nec tamen æther iste in immensum crescere potest, etiamsi novæ semper particulae ex macularum dissolutione ipsi accedant, quia globulorum secundi elementi per illud & circa illud continua agitatio facile potest totidem alias dissolvere, ac rursus in materiam primi elementi convertere. Quippe omnes Solis aliorumque siderum maculas, ut & totum ætherem ipsis circumfusum, quoniam ejus partes ad motum minus aptæ sunt, quam globuli secundi elementi, ad tertium elementum referimus.

*& stellæ generetur. Hincque ætherem & istas maculas ad tertium elementum referri.*

Sed vero macularum productio vel dissolutio à tam minutis & tam incertis causis dependet, ut minime sit mirandum, si quando nullæ prorsus in Sole apparent, vel si è contra nonnunquam sint tam multæ, ut totum ejus lumen obscurent. Ex hoc enim, quod pauca aliqua, ex ramentis primi elementi, sibi invicem adhærescant, fit unius maculae rudimentum, cui facile postea plura alia junguntur, quæ, nisi in priora illa impingendo partem suæ agitationis amitterent, sibi mutuo non possent adhærere.

C I.  
*Macularum productio- nem & dissolutionem à causis valde incertis pendere.*

Notandumque est, maculas istas, cum primum generantur, esse corpora mollissima & rarissima, ideoque facile frangere impetum ramentorum primi elementi, quæ in ipsas impingunt, & illa sibi adjungere; paulatim autem postea interiorem earum superficiem, continuo motu substantiæ solaris cui contigua est, non tantum abradi & perpoliri, sed etiam condensari & indurari, alia interrim earum superficie quæ cœlo obversa est, molli & rara remanente; ideoque ipsas non facile dissolvi, ex eo quod materia Solis interiorem earum superficiem lambat, nisi simul etiam earum oras circumfluat, & transcendat, sed contra potius semper augeri, quamdiu istæ earum oræ, supra Solis superficiem eminentes, ejus materiæ occursum non denantur. Hincque potest contingere, ut aliquando una & eadem macula supra totam superficiem alicujus sideris se extendat, ibique diu permaneat, priusquam dissolvi possit.

C II.  
*Quomodo eadem macula totam aliquod sidus tegere possit.*

Sic referunt quidam historici, Solem aliquando per plures dies continuos, aliquando etiam per integrum annum, solito pallidior, Lunæ instar, sine radiis lucem tristem præbuisse. Notarique potest, multas stellas nunc minores majoresve apparere, quam olim ab Astronomis descriptæ sunt. Cujus non alia ratio esse videtur, quam quod pluribus paucioribusve maculis earum lux obtundatur.

C III.  
*Cur Sol aliquando visus sit obscurior; & cur quarundam stellarum magnitudines apparentes videntur.*

CIV.  
*Cur aliqua  
 fixæ dispa-  
 reant, vel  
 ex improviso  
 appareant.*


Quin-etiam fieri potest, ut aliquod sidus tot & tam densis maculis involvatur, ut visum nostrum prorsus effugiat : Sicque olim Plejades numeratæ sunt septem, quæ jam sex tantum conspiciuntur. Itemque fieri potest, ut aliquod sidus nobis antea non visum, brevissimo tempore, atque ex improviso, magna luce affulgeat. Nempe si totum ejus corpus ingenti & crassa macula fuerit hæcenus contactum, jamque accadat ut materia primi elementi, solito copiosius ad illud affluens, supra exteriorem istius maculæ superficiem se diffundat, brevissimo tempore totam conteget; atque tunc istud sidus non minorem lucem ex se emittet, quam si nulla plane macula involveretur; Potestque postea, vel diu æque fulgidum remanere, vel paulatim rursus obscurari. Sicque contigit in fine anni 1572, quandam stellam, prius non visam, in signo Cassiopejæ apparuisse, quæ, maximam initio habuit lucem, &, sensim postea obscurata, initio anni 1574 disparuit. Ac etiam aliæ nonnullæ in cælo jam lucent, quæ olim non apparebant : quarum rerum causa hic fusius est explicanda.

CV.  
*Multos esse  
 meatus in  
 maculis, per  
 quos libere  
 transeunt  
 particule  
 striatæ.*

Sit, exempli causa, sidus I circumquaque tectum maculâ *defg*, quæ non potest esse tam densa, quin poros sive meatus habeat permultos, per quos omnis materia primi elementi, etiam illa quæ constat particulis striatis supra descriptis, transire possit. Cum enim in principio suæ generationis fuerit mollissima & rarissima, tales pori facile in ipsa formati sunt; cumque postea densabatur, particulæ istæ striatæ, aliæque primi elementi, continuo per illos transeundo, non permiserunt ut plane clauderentur; sed tantum eo usque angustati sunt, ut nullæ materiæ particulæ, striatis primi elementi crassiores, viam per ipsos habere possint; ac etiam ut ii meatus, qui particulas striatas ab uno polo venientes admittunt, non aptæ sint ad eandem, si regrederentur, nec etiam ad illas quæ veniunt ab alio polo, & contrario modo sunt intortæ, rapiendas.

CVI.  
*Quæ sit dis-  
 positio isto-  
 rum meatus,  
 & cur particule  
 striatæ  
 per illos re-  
 trogredi non  
 possint.*

Nempe particulæ striatæ primi elementi, venientes non ab uno aliquo puncto duntaxat, sed à tota cæli regione quæ est versus polo A, & tendentes non versus unicum punctum I, sed versus totum medium cæli HIQ, formant sibi meatus in macula *defg*, secundum lineas rectas axi *fd* parallelas, vel nonnihil utrimque versus *d* convergentes; horumque meatorum aditus in tota ejus superficie medietate *efg* sparsi sunt, & exitus in alia medietate *edg*; ita scilicet ut particulæ striatæ, venientes à parte A, facile



cile quidem ipsos ingredi possint per partem *efg*, & egredi per adversam *edg*, non autem unquam regredi per hanc *edg*, nec egredi per *efg*: Quia cum tota ista macula non constet nisi ex ramentis primi elementi minutissimis, quæ, sibi mutuo adhærentia, quosdam quasi ramulos componunt: particule striatæ venientes à parte *f*, istorum ramulorum extremitates, sibi in meatibus istis occurrentes, inflectere debuerunt versus *d*; ideoque si per eisdem meatibus eis esset regrediendum à *d* versus *f*, istæ ramulorum extremitates nonnihil assurgentes ipsarum transitum impedirent. Eodemque modo particule striatæ, venientes à parte *B*, meatus alios sibi excavarunt, quorum ingressus in tota superficie *edg* sparsi sunt, & egressus in adversa *efg*.

Notandumque est, istos etiam meatus, cochlearum instar esse excavatos, ad formam particularum striatarum quas admittunt, ideoque


CVII.  
Cur etiam  
quæ veniunt

*ab uno polo  
non trans-  
eant per  
eosdem meatus,*

quæ illos qui unis patent, non patere aliis à polo opposito venientibus, & contrario modo intortis.

*CVIII.  
Quomodo  
materia pri-  
mi elementi  
per istos  
meatus  
fiat.*

Ita igitur materia primi elementi utrimque ex polis per istos meatus ad sidus I potest pervenire; ac quia ejus particula striata cæteris sunt crassiores, ideoque majorem habent vim ad pergendum secundum lineas rectas, non solent in eo manere, sed ingressæ per *f*, protinus egrediuntur per *d*, atque ibi occurrentes globulis secundi elementi, vel materiae primi à *B* venienti, non possunt ulterius pergere secundum lineas rectas, sed, in omnes partes reflexæ, per ætherem circumfusum *xx*, versus hemisphæricum *esg* revertuntur; & quotquot ingredi possunt meatus maculae, vel macula-



rum, quæ ibi sidus istud tegunt, per illos rursus progrediuntur ab *f* ad *d*; sicque assidue per medium sidus transeundo, & per ætherem circumfusum redeundo, quendam ibi quasi vorticem componunt.

nunt. Quæ vero ab istis meatibus capi non possunt, vel occursum particularum hujus ætheris dissolvuntur, vel per partes vicinas Eclipticæ QH in cœlum abire coguntur. Quippe notandum est, particulas striatas, quæ singulis momentis ad superficiem sideris I appellantur, non esse tam multas, ut replant omnes meatus, ad mensuram suam excavatos in maculis *efg*; quia etiam in cœlo non replent omnia intervalla, quæ sunt inter globulos secundi elementi, sed magna copia subtilioris materiæ illis admixta esse debet, propter varios istorum globulorum motus; quæ materia subtilior cum ipsis ingrederetur istos meatus, nisi particulæ striatæ, ab alio sideris hemisphærio reflexæ, majorem haberent vim ad illos occupandos. Quæ vero hic de particulis striatis per hemisphærium *efg* ingredientibus sunt dicta, de iis etiam quæ ingrediuntur per hemisphærium *edg*, sunt intelligenda, quod nempe sibi alios meatus, à prioribus plane diversos, excavarint, per quos semper plurimæ fluunt à *d* versus *f*, in sidere I ac maculis ipsum circumdantibus; & deinde in omnes partes reflexæ per ætherem *xx* revertuntur ad *d*, cum interim tot dissolvuntur, vel exeunt versus eclipticam, quot novæ à polo B accedunt.

Residuum autem materiæ primi elementi, quod in spatio I continetur, circa axem *fd* gylando, semper inde recedere conatur; ideoque quosdam exiguos meatus sibi ab initio formavit, semperque postea conservat in macula *defg*; qui priores decussatim interfecant, & per quos aliquid istius materiæ solet effluere, quia semper aliquid per priores, simul cum particulis striatis, ingreditur. Cum enim omnes maculæ partes sibi invicem adhæreant, non potest circumferentia *defg*, nunc major fieri, nunc minor: ideoque semper æqualis quantitas materiæ primi elementi debet in sidere I contineri.

Et ideo etiam illa vis, in qua lumen consistere supra diximus, vel nulla prorsus in ipso, vel non nisi admodum debilis esse potest. Nam quatenus ejus materia circa axem *fd* rotatur, vis omnis qua recedere conatur ab isto axe, in macula frangitur, & ad globulos secundi elementi non pertingit; nec etiam illa, qua ejus particulæ striatæ, ab uno polo venientes, recta versus alium tendunt, quicquam potest præstare; non modo quia istæ particulæ valde exiguæ sunt, respectu globulorum cœlestium in quos impingunt, ac etiam aliquanto tardius, quam reliqua materia primi elementi, moventur;


CIX.  
Quod alii  
etiam meatus  
illos decussatim  
interferent.

CX.  
Quod lumen  
hæc per  
maculam  
vix possit  
transire.

tur; sed præcipue quia illæ quæ ab uno polo veniunt, non magis istos globulos in unam partem propellunt, quam aliæ, ex alio polo venientes, in adversam.

CXI.  
*Descriptio  
 Stellæ ex  
 improvise  
 apparentis.*

Materia autem cælestis, in toto vortice, hoc sidus I circumjacente, comprehensa, suas interim vires potest retinere; quamvis forte illæ non sufficiant, ad sensum luminis in oculis nostris excitandum: fierique potest, ut interim iste vortex prævaleat aliis vorticibus sibi vicinis, & fortius illos premat quam ab ipsis prematur. Unde sequeretur, sidus I augeri debere, nisi macula *defg*, illud circumscribens, id impediret. Nam si jam circumferentia vorticis I sit *A Y B M*, putandum est, ejus globulos, circumferentiæ isti proximos, eandem habere vim ad progrediendum ultra ipsam, versus alios vortices circumpositos, ac globulos horum vorticum ad pro-



grediendum versus I, non majorem nec minorem: hæc enim unica ratio est, cur ejus circumferentia ibi potius quam alibi terminetur.




tur. Si autem, cæteris immutatis, contingat ut minuatur illa vis, qua, exempli causa, materia vorticis O tenditur versus I, (hocque variis ex causis potest contingere, ut si ejus materia in alios vortices transeat, vel multæ maculæ circa sidus in O existens generentur, &c.) necesse est ex legibus naturæ, ut globuli vorticis I, qui sunt in circumferentia Y, ultra ipsam pergant versus P; & quia reliqui omnes qui sunt inter I & Y, eo versus etiam tendunt, inde augetur spatium in quo est sidus I, nisi macula *defg* ipsum terminaret; sed quia hæc macula non permittit illud augeri, globuli cælestes ei proximi paulo majora solito intervalla circa se relinquent, & plus materiæ primi elementi in iis intervallis continebitur, quæ quamdiu in ipsis erit dispersa, non magnas vires habere potest. Si autem contingat, particulas primi elementi, per poros maculæ exeuntes, & in globulos illos impingentes, vel aliam quamvis causam, aliquos ex istis globulis à maculæ superficie sejungere, materia primi elementi, spatium intermedium statim replens, satis virium habebit ad alios globulos, istis vicinos, ab eadem maculæ superficie sejungendos; & quo plures ab illa ita sejungent, eo plus virium acquirat: ideoque brevissimo tempore, ac tanquam in momento, supra totam istam superficiem se diffundet; ibique non aliter gyrans quam ea quæ intra maculam continetur, non minori vi pellet globulos cæli circumpositos, quam eosdem pelleret ipsum sidus I, si nulla macula cum involvens ejus actionem impediret: Atque ita magna luce ex improvise fulgebit.

Iam vero, si forte contingat, istam maculam esse tam tenuem & raram, ut à materia primi elementi, supra ejus exteriorem superficiem sic effusa, dissolvatur, non facile postea sidus I rursus disparabit: ad hoc enim opus esset, ut nova macula ipsum totum rursus involveret. Sed si crassior sit quam ut ita queat dissolvi, densabitur exterior ejus superficies ob impulsam materiæ ipsam circumfluentis; atque interim si mutantur causæ, ob quas prius minuta fuerat illa vis, qua materia vorticis O tenditur versus I, jamque è contra augetur, repellatur rursus materia vorticis I à P versus Y, & hoc ipso materia primi elementi, supra maculam *defg* diffusa, minuetur, & simul novæ maculæ in ejus superficie generabuntur, quæ paulatim ipsius lumen obtundent; & denique si causa perseveret, plane tollent, atque omnem locum istius materiæ primi elementi

CXII.  
*Descriptio  
Stellæ paulatim  
disparentis.*

108      PRINCIPIORVM PHILOSOPHIÆ  
 occupabunt. Cum enim globuli vorticis I, qui sunt in exteriori  
 ejus circumferentia APBM, magis solito prementur, magis  
 etiam prement illos, qui sunt in interiori circumferentia xx, qui-  
 que ita pressi, & ramosis particulis ætheris illius, quem circa si-  
 dera generari diximus, intertexti, non faciliem transitum præbe-



bunt particulis striatis, aliisve non minutissimis materiæ primi ele-  
 menti, supra maculam *defg* diffusæ: unde fiet, ut ipsæ ibi perfacile  
 in maculas congregentur.

CXIII.  
*In omnibus  
 maculis  
 multos meatus à parti-  
 culis striatis  
 excavari.*

Obiterque hic est notandum, particulas striatas in omnibus istis  
 macularum vorticibus continuos sibi meatus excavare, ac per omnes  
 simul, tanquam per unam solam maculam, transire. Formantur  
 enim istæ maculæ ex ipsa materiæ primi elementi, & ideo initio sunt  
 mollissimæ, istisque striatis particulis faciliem viam præbent. Quod  
 idem de æthere circumfuso dici non potest: quamvis enim crassio-  
 res ejus particulæ nonnulla etiam istorum meatumum vestigia reti-  
 nent,

neant, quoniam ex macularum dissolutione genitæ sunt; quia tamen motui globulorum secundi elementi obsequuntur, non semper eundem situm servant, nec ideo particulas striatas recta pergentes, nisi admodum difficulter, admittunt.

Sed facile fieri potest, ut eadem stella fixa per vices appareat & disappearat, singulisque vicibus quibus apparebit, novo cortice macularum involvatur. Talis enim alternatio est naturæ valde familiaris, in corporibus quæ moventur; ita scilicet ut cum ab aliqua causa versus certum terminum impulsæ sunt, non in eo subsistant, sed ulterius pergant; donec rursus ab alia causa versus ipsum repellantur. Ita dum pondus, funi appensum, vi gravitatis ab uno latere ad perpendicularium suum descendit, impetum acquirit, à quo ultra istud perpendicularium in oppositum latus fertur, donec rursus gravitas, isto impetu superato, illud versus perpendicularium moveat, & inde novus in eo impetus oriatur. Ita vase semel moto, liquor in eo contentus multoties it & redit, antequam ad quietem reducat; Et ita, cum omnes cælorum vortices in quodam æquilibrio consistant, ubi unius materia semel ab isto æquilibrio recessit, potest multoties nunc in unam, nunc in adversam partem excurrere, antequam ab isto motu quiescat.

Fieri etiam potest ut totus vortex, in quo talis aliqua stella fixa continetur, ab aliis circumjacentibus vorticibus absorbeatur, & ejus stella, in aliquem ex istis vorticibus abrepta, mutetur in Planetam vel Cometam. Nempe duas tantum causas supra invenimus, quæ impediunt ne uni vortices ab aliis destruantur; harumque una, quæ consistit in eo, quod materia unius vorticis objectu vicinorum impediatur, ne versus alium quem possit evagari, non potest in omnibus locum habere. Nam si, exempli causa, materia vorticis S à vorticibus L & N ita utrinque prematur, ut hoc impediatur ne versus D ulterius progrediatur, non potest eadem ratione impediari à vortice D, ne se diffundat versus L & N, nec etiam ab ullis aliis, nisi qui sint ei viciniore, pro ratione suæ magnitudinis; atque adeo in omnium maxime vicinis non habet locum. Altera autem causa, quod nempe materia primi elementi, in centro cujusque vorticis sidus componens, globulos secundi, circa illud existentes, à se repellat versus alios vortices vicinos, locum quidem habet in omnibus iis vorticibus, quorum sidera nullis maculis involvuntur; sed non dubium est, quin densiorum macularum interventus eam tol-

CXIV.


*Eandem  
stellam posse  
per vices  
apparere ac  
disparere.*

CXV.

*Totum ali-  
quando  
vorticem,  
in cujus  
centro est  
stella, de-  
strui posse.*

NB.

*Vide pag.  
seq.*




lat; præsertim earum, quæ plurium vorticum instar sibi in tuto incumbunt.

Atque hinc patet, non esse quidem periculum, ne ullus vortex ab aliis vicinis destruat, quamdiu fidus, quod in centro suo habet, nullis maculis est involutum; sed, cum illis tegitur & obruitur, pendere tantum à situ, quem iste vortex inter alios obtinet, ut vel citius vel tardius ab ipsis absorbeat. Nempe si talis sit ejus situs, ut vicinorum aliorum vorticum cursui valde resistat, citius ab illis destruetur, quam ut multi macularum vortices circa ejus fidem densari possint; sed si minori sit ipsis impedimento, lente tantum minuetur; interimque maculæ, fidem in ejus medio positam obsidentes, densiores fient, pluresque ac plures, tam supra quam etiam intra illud, congregabuntur. Sic, exempli causa, vortex N ita situs est, ut aperte cursum vorticis S magis impediatur, quam ulli alii vicini, quapropter facile ab hoc vortice S abripietur, statim atque aliquot maculis illius fidem erit involutum: ita scilicet, ut circumferentia vorticis S, quæ jam terminatur linea OPQ, terminetur postea linea ORQ, totaque materia, quæ continetur intra lineas OPQ & ORQ, ei accedat, ejusque cursum sequatur; reliqua materia quæ est inter lineas ORQ & OMQ, in alios vicinos vortices abeunte. Nihil enim aliud vorticem N in eo situ, in quo nunc esse supponitur, potest conservare, quam magna vis materiæ primi elementi, in ejus centro existentis, quæ globulos secundi circumquaque ita propellit, ut ejus impulsui potius quam motibus vicinorum vorticum obsequantur: quæ vis interveni macularum debilitatur, & frangitur.

Vortex autem C inter quatuor S F G H, duosque alios M & N, qui supra istos quatuor intelligendi sunt, ita est constitutus, ut quamvis densæ maculæ circa ejus fidem congregentur, nunquam tamen totus possit everti, quandiu isti sex sunt viribus inter se æquales. Quippe suppono, vortices S, F, & tertium M ipsis incumbentem supra punctum D, circa propria centragyrare à D versus C: itemque tres alios G H & sextum

CXVI.  
Quomodo  
destrui possit,  
antequam  
multa macula  
circa ejus  
fidem sint  
congregate.



CXVII.  
Quomodo  
per multa  
maculae  
circa aliquam  
fidem esse  
possint, ante  
quam sequatur  
ejus  
vortex destruat.


N, su-

N, supra ipsos positum, verti ab E versus C; vorticem autem C ita inter hos sex esse constitutum, ut ipsos solos tangat, & ejus centrum ab eorum sex centrīs æquidistet; axisque circa quem gyra-  
tur, sit in linea D-E. Qua ratione istorum septem vorticum motus inter se optime conveniunt: & quantumvis multis maculis sidus vorticis C obruatur, adeo ut per exiguas, vel etiam plane nullas habeat vires, ad globulos cœli circa se positos secum in orbem rapiendos; non tamen ulla est ratio, cur alii sex illud è loco suo expellant, quamdiu inter se sunt æquales.

CXVIII.

*Quomodo  
ista macula  
macule ge-  
nerentur.*

Sed ut sciamus, quo pacto tam multæ maculæ circa illud generari potuerint, putemus, ipsum initio non minorem fuisse, quam unum ex aliis sex ei circumjacentibus, ita ut circumferentiam suam usque ad puncta 1 2 3 4 extenderet; sidusque permagnum in centro suo habuisse, utpote quod componebatur ex materia primi elementi, quæ per D ex tribus vorticibus S, F, M, & per E ex tribus aliis G, H, N, versus C recta tendebat, & inde non regrediebatur, nisi in eosdem illos vortices versus K & L; adeo ut istud sidus factis virium habere potuerit ad totam materiam cœli 1 2 3 4 secum in gyrum agendam. Sed quia, propter inæqualitatem, & incommensurabilitatem quantitatum & motuum, quæ in aliis partibus universi reperitur, nihil in perpetuo æquilibrio stare potest, ubi forte vortex C minus virium habere cœpit, quam alii circumjacentes, pars ejus materiæ in ipsos migravit, & quidem cum impetu, ita ut ea pars quæ sic migravit, fuerit major quam ista inæqualitas exigebat, ideoque rursus postea non nihil materiæ in ipsum ex aliis remigravit, atque ita per vices. Cumque interim multi macularum



vortices circa ejus sidus generarentur, magis ac magis illius vires minuebantur, & idcirco singulis vicibus minus materiæ in illum regrediebatur quam ab ipso exiisset, donec tandem per exiguus evaserit, vel etiam totus fuerit absorptus, solo ejus sidere excepto, quod, multis maculis circumvallatum, in materiam aliorum vorticum abire non potest, nec etiam ab istis aliis vorticibus è loco, in quo est, extrudi, quamdiu isti vortices sunt inter se

fe

se æquales. Sed interim ejus maculæ magis ac magis densari debent : ac tandem , ubi unus aliquis ex vicinis vorticibus , aliis major & potentiôr evadet , ut si vortex H extendat sítam superficiem usque ad lineam 567, tunc facile hic vortex H totum sidus C; non amplius fluidum & lucidum , sed , Cometæ vel Planetæ instar , durum & opacum , secum abducat.

Iam vero considerandum est , qua ratione debeat moveri talis globus opacus & durus , ex multarum macularum congerie compositus , cum primum ab aliquo vortice sibi vicino abreptus est. Nempe ita gyrat cum materia à qua abripitur ; ut , quandiu minus habet agitationis quam ipsa , versus centrum circa quod gyrat detrudatur. Et quia omnes partes ejusdem vortice non eadem celeritate moventur , nec sunt ejusdem magnitudinis ; sed à circumferentia usque ad certum terminum earum motus gradatim fit tardior , ac deinde ab isto termino usque ad centrum gradatim fit celerior , & ipsæ sunt minutiores , ut supra dictum est : Si globus in illo vortice descendens adeo sit solidus , ut , priusquam pervenerit ad terminum in quo partes vortice omnium tardissime moventur , acquirat agitationem æqualem agitationi earum partium , inter quas versatur , non ulterius descendit ; sed ex illo vortice in alios transit , & est Cometa ; Si vero minus habeat soliditatis , atque idcirco infra terminum illum descendat , ibi postea ad certam distantiam à sidere , quod illius vortice centrum occupat , semper manens , circa ipsum rotatur , & est Planeta.

Putemus , exempli causa , materiam vortice A E I O nunc primum secum abripere Sidus N , & consideremus versus quam partem illud feret. Nempe cum omnis ista materia gyret circa centrum S , ideoque inde recedere conetur , ut supra explicui , non dubium est quin ea , quæ jam versatur in O , pergendo per R ad Q<sub>2</sub> detrudat hoc sidus secundum lineam rectam versus S : Atque ex natura gravitatis , infra explicanda , intelligetur , istum motum sideris N , alteriusve cujusvis corporis , versus centrum vortice in quo versatur , dici posse ejus descensum. Sic , inquam , ipsum detrudat initio , cum nondum intelligimus , in eo esse alium motum ; sed statim etiam , illud circuinquaque ambiendo , secum defert motu circulari ab N versus A ; cumque hic motus circularis ei det vim recedendi à centro S , pendet tantum ab ejus soliditate , ut vel multum descendat


C X I X .

*Quomodo  
Stella fixa  
musetur in  
Cometam  
vel in Pla-  
netam.*

C X X .

*Quo feratur  
salsi Stella,  
cum primum  
desinit fixa  
esse.*

NB.  
Vide fig.  
pag. seq.





scendat versus S, nempe si perexigua sit ejus soliditas; vel contra, si magna sit, ab S recedat.

Per soliditatem hic intelligo quantitatem materiæ tertii elementi, ex qua maculæ hoc sidus involventes componuntur, cum ejus mole & superficie comparatam. Quippe vis qua materia vorticis A E I O, id defert circulariter circa centrum S, æstimanda est à magnitudine superficiæ, secundum quam ipsi occurrit: quia quo major est ista superficies, eo plus materiæ in hoc agit. Vis autem, qua ista materia versus ideam centrum S ipsum pellit, æstimanda est à magnitudine spatii quod ab eo occupatur. Quamvis enim omnis illa materia, quæ est in vortice A E I O, conetur recedere ab S, non tamen omnis agit in sidus N, sed tantum ea ejus pars, quæ re ipsa inde recedit, cum hoc accedit; hæcque est æqualis spatio quod ab eo fuit occupatum. Denique vis, quam idem sidus N à proprio suo motu acquirit, ad perseverandum in eodem illo motu, quam ipsius agitationem voco, non æstimanda est ab ejus superficie, nec à tota ejus mole, sed tantum ab ea ejus molis parte, quæ constat materia tertii elementi, hoc est, particulis materiæ sibi mutuo adhaerentibus, ex quibus maculæ ipsum involventes componuntur: Quantum enim ad materiam primi, vel etiam secundi elementi, quæ in eo est, cum assidue ex ipso egrediatur, & nova redeat in locum exeuntis; non potest nova ista materia accedens vim retinere, quæ priori jam egressæ fuit impressa, & præterea vix ulla ei fuit impressa, sed tantum motus, qui aliunde in ea erat, determinatus est versus certam partem; atque hæc determinatio à variis causis assidue potest mutari.

Sic videmus hic, supra terram aurum, plumbum & alia metalla, cum semel mota sunt, majorem agitationem, sive majorem vim ad perseverandum in suo motu retinere, quam ligna & lapides ejusdem magnitudinis & figuræ; ac etiam idcirco magis solida esse putantur, sive plus habere in se materiæ tertii elementi, ac pauciores poros, qui materia primi & secundi replentur. Sed auri globulus esse potest tam minutus, ut non tantam vim habiturus sit, ad motum sibi impressum retinendum, quam globus lapideus vel ligneus multo major. Potestque etiam massa auri tales figuras induere, ut globus ligneus ipsa minor, majoris agitationis sit capax; nempe si extendatur in fila aut bracteas, aut spongiz instar multis minutis foraminibus excavetur; aut quocumque alio modo plus superficiæ

CXXI.  
*Quid per  
corporum  
soliditatem,  
& quid per  
eorum agi-  
tationem in-  
telligamus.*

CXXII.  
*Soliditatem  
non à sola  
materia, sed  
etiam à ma-  
gnitudine ac  
figura pen-  
dere.*

ciei acquirat, pro ratione suæ materiæ & molis, quam ille ligneus globus.

CXXIII.

*Quomodo  
globuli cæ-  
lestes integro  
aliquo sidere  
solidiores ef-  
se possint.*


Atque ita fieri potest, ut Sidus N, quamvis mole permagnum, & fatis multis macularum corricibus involutum, minus tamen habeat soliditatis, sive minus aptitudinis ad motus suos retinendos, quam globuli materiæ secundi elementi ipsiſum circumjacentes. Hi enim globuli, pro ratione suæ magnitudinis, sunt omnium solidissimi qui esse possunt; quia nullos in ipsis meatus alia materia solidiori repletos intelligimus; & figuram obtinent sphericam, quæ omnium minimum habet superficiæ, pro ratione molis sub se contentæ, ut Geometricis est fatis notum. Et præterea, quamvis sit permagna disparitas inter ipsorum exiguitatem, & magnitudinem alicujus sideris, hæc tamen ex parte compensatur, eo quod non vires singulorum ex istis globulis, sed plurium simul, istius sideris viribus opponantur. Cum enim illi cum aliquo sidere circa centrum S rotantur, tenduntque omnes, nec non etiam istud sidus, ut ab S recedant, si vis inde recedendi quæ est in sidere, superet vires simul junctas, quæ sunt in tot ex istis globulis, quot requiruntur ad spatium, quod sidus occupat, replendum; tunc ipsum recedet ab S, efficietque, ut isti globuli in locum suum descendant; & contra, si illi plus habeant virium, ipsum versus S expellent.

CXXIV.

*Quomodo  
etiam esse  
possint mi-  
nus solidi.*

Fieri enim etiam facile potest, ut sidus N multo plus habeat virium, ad perseverandum in suo motu secundum lineas rectas, quam globuli materiæ cælestis ipsum circumjacentes, etiamsi minus materiæ tertii elementi in eo contineatur, quam secundi, in tot ex istis globulis quot requirentur ad spatium ipsi æquale occupandum. Quia cum sint à se mutuo disjuncti, & varios habeant motus; quamvis junctis viribus in illud agant, non possunt tamen omnes suas vires ita simul jungere, ut nulla earum pars inutilis fiat: contra autem omnis materia tertii elementi, ex qua inaculæ hoc sidus involventes, ærque ipsum ambiens, componuntur, unam tantum massam facit, quæ cum tota simul moveatur, tota etiam vis, quam habet ad perseverandum in suo motu, versus easdem partes tendit. Similemque ob causam videre licet in fluminibus, fragmenta glaciæ vel ligna quæ aquæ innatant, majori vi persequi cursum suum secundum lineas rectas, quam ipsam aquam; & ideo solere multo fortius in riparum sinus impingere; quamvis minus materiæ tertii elementi in iis contineatur, quam in mole aquæ ipsiſ æquali.

Deni-



P 3

CXXV. Denique fieri potest, ut idem sidus minus habeat soliditatis, quam quidam globuli cœlestes, & magis quam alii paulo minores; tum propter iam dictam rationem, tum etiam quia, licet non magis nec minus sit materiæ secundi elementi in istis globulis minoribus simul sumptis, quam in majoribus, cum æquale spatium occupant, est tamen in ipsis multo plus superficiæ; & propter hoc à materia primi elementi, quæ angulos iis interjectos replet, nec non etiam à quibuslibet aliis corporibus, facilius à cursu suo revocantur, atque versus alias partes deflectuntur, quam alii majores.

CXXVI. Iam itaque si ponamus, sidus N plus habere soliditatis quam globulos secundi elementi, satis remotos à centro vorticis S; quos supponimus omnes esse inter se æquales: poterit quidem initio in varias partes ferri; & magis vel minus accedere versus S, pro varia dispositione aliorum vorticum, à quorum vicinia discedet; potest enim diversimode ab ipsis retineri vel impelli; ac etiam pro ratione suæ soliditatis, quæ quo major est, eo magis impedit ne aliæ causæ postea ipsum deflectant de ea parte, in quam primum directum est. Veruntamen non valde magna vi potest impelli à vicinis vorticibus; quia supponitur, juxta illos prius quævisse; nec ideo etiam ferri contra motum vorticis AEIO, versus eas partes quæ sunt inter I & S, sed tantum versus illas quæ sunt inter A & S; ubi tandem debet pervenire ad aliquod punctum, in quo linea quam motu suo describit, tangat unum ex iis circulis, secundum quos materia cœlestis circa centrum S gyrat; & postquam eo pervenit, ita cursum suum ulterius persequitur, ut semper magis & magis recedat à centro S, donec ex vortice AEIO in alium migret. Ut si moveatur initio secundum lineam NC, postquam pervenit ad C, ubi hæc linea curva NC tangit circulum, qui ibi describitur à globulis secundi elementi circa centrum S; non potest non statim recedere ab S, per lineam curvam C 2, sitam inter hunc circulum, & rectam eum in puncto C tangentem. Cum enim delatum sit ad C, à materia secundi elementi magis remota ab S quam ea quæ est in C, ac proinde celerius acta, sitque ipsa solidius, ut supponimus; non potest non habere majorem vim, ad perseverandum in suo motu, secundum lineam rectam tangentem istum circulum; sed statim atque recessit à puncto C, occurrit materiæ secundi elementi celerius motæ, quæ illum nonnihil avertit à linea recta, simulque augendo ejus celeritatem efficit, ut ulterius ascendat secundum lineam curvam

NB.  
Vide fig.  
pag. præc.

vam C 2; quæ eo minus distat à recta tangente, quo hoc sidus solidius est, & quo majori cum celeritate delatum est ab N ad C.

Cum autem per hunc vorticem A E I O hac ratione progreditur, tantam vim agitationis acquirit, ut facile inde in alios vortices migret, atque ex his in alios. Notandumque est, cum pervenit ad 2, egrediturque limites vortices in quo est, ipsum adhuc aliquandiu retinere ejus materiam circa se fluentem, nec plane ab ea liberari, donec satis alte in alium vorticem A E V penetrarit; nempe donec pervenerit ad 3. Eodemque modo ducit secum materiam hujus secundi vortices, versus 4 in fines tertii, & hujus tertii versus 8 in fines quarti; sicque semper idem facit, quoties ex uno vortice in alium migrat. Et linea quam motu suo describit, diversimode incurvatur, pro diverso motu materię vorticum, per quos transit. Ita ejus pars 2 3 4 plane alio modo inflexa est quam præcedens N C 2; quia materia vortices F vertitur ab A per E versus V, & materia vortices S ab A per E versus I; istius autem lineę pars 5 6 7 8 est fere recta, quia materia vortices in quo est, supponitur gyrare circa axem X X. Et sidera, ex unis vorticibus in alios hoc pacto migrantia, sunt Cometę: Ipsorumque omnia phænomena hic explicare conabor.

In primis observatur, illos sine ulla regula nobis nota, unum per hanc, alium per illam cęli regionem transire; ac intra paucos menses aut dies à conspectu nostro abire; nec unquam plus, aut certe non multo plus, sed sæpe multo minus quam mediam cęli partem percurrere. Ac quidem cum primum apparere incipiunt, solere satis magnos videri, nec postea valde augeri, nisi cum valde magnam cęli partem percurrunt; cum autem desinunt, gradatim semper inminui; atque initio, vel saltem circa initia sui motus, videri celerissime moveri, sub finem autem lentissime. Ac de uno duntaxat memini me legisse, † quod circiter mediam cęli partem peragravit; de illo scilicet qui dicitur anno 1475, primo tenui capite ac tardi motus, inter stellas Virginis apparuisse, ac paulo post mirę magnitudinis factus, per polum borealem tam celeriter incessisse, ut portionem circuli magni, triginta vel quadraginta graduum, una die describeret; ac tandem prope stellas Piscis Septentrionalis, sive in signo Arietis, paulatim videri desinisse.

Cometis loquitur; sed judico, unicum fuisse, cujus historiam à duobus auctoribus Giomontano & Pontano.

CXXVII.

*De continuatione motus Cometę per diversos vortices.*

CXXVIII.

*Phænomena Cometarum.*

† Apud Lotharium Sarsium, sive Horatium Græcium in libra Astro-nomica, ubi tanquam de duobus

Quæ

CXXIX.


*Horum  
Phænomenon  
non expli-  
catis.*

*Quæ* omnia hic facile intelliguntur. Videmus enim, eundem Cometam, aliam cœli partem in vortice F, aliamque in vortice Y permeare, ac nullam esse per quam non possit hoc pacto aliquando transire. Putandumque est, ipsum fere eandem celeritatem semper retinere; illam scilicet quam acquirit, transendo pervorticum extremitates, ubi materia cœlestis tam cito movetur, ut intra paucos menses integrum gyrum absolvat, quemadmodum supra dictum est. Et quia hic Cometa in vortice Y mediam tantum partem istius gyri, & multo minus in vortice F, nunquamque in ullo multo plus percurrit; idcirco tantum per paucos menses in eodem vortice manere potest. Atque si consideremus, illum à nobis videri non posse, nisi quamdiu est in illo vortice, prope cuius centrum versatur; atque etiam non prius ibi apparere, quam materia alterius vorticis ex quo venit, ipsum sequi & circumfluere plane desierit; cognoscemus, quo pacto, quamvis idem Cometa maneat, semper ejusdem magnitudinis, & fere semper æque celeriter moveatur, debeat tamen videri major & celerior, initio sui cursus apparentis, quam in fine, ac interdum in medio maximus & celerrimus putari. Nam si putemus, oculum spectatoris esse prope centrum F, Cometa illi multo major & celerior apparebit in 3, ubi primum videri incipiet, quam in 4, ubi desinet; quia linea F 3 multo brevior est quam F 4, & angulus F 43 acutior quam angulus F 34. Si autem spectator sit versus Y, Cometa quidem illi aliquanto major & celerior apparebit in 5, ubi videri incipiet, quam in 8, ubi desinet; sed maximus & celerrimus apparebit, dum erit inter 6 & 7, ubi erit spectatori proximus; adeo ut dum erit in 5, apparere possit inter stellas Virginis; dum inter 6 & 7, prope polum Borealem; & ibi una die triginta vel quadraginta gradus percurrere, ac tandem occultari in 8, prope stellas piscis septentrionalis: eodem modo atque ille mirabilis Cometa anni 1475, qui dicitur à Regiomontano observatus.

CXXX.

*Quomodo  
fixarum lu-  
men ad Ter-  
ram usque  
perveniat.*

*Quæ*ri quidem potest, cur Cometæ non appareant, nisi cum in nostro cœlo versantur; cum tamen fixæ conspicuæ sint, licet ab ipso longissime distent. Sed in eo differentia est, quod fixæ, lumen à se ipsis emittentes, multo fortius illud vibrent, quam Cometæ, qui tantum illud, quod à Sole mutuuntur, ad nos reflectunt. Et quidem, advertendo, lumen cujusque stellæ, esse actionem illam, qua  
tota



Q

tota materia vorticis, in quo versatur, ab ea recedere conatur, secundum lineas rectas, ab omnibus ejus superficiei punctis eductas, sicque omnem materiam vorticum circumjacentium premit, secundum easdem lineas rectas, vel alias æquipollentes; (cum nempe istæ lineæ, per alia corpora oblique transeuntes, in ipsis refringuntur, ut in Dioptrica explicui:) facile credi potest, non modo lumen proximarum stellarum, ut *F & f*, sed etiam remotiorum, ut *Y*, vim habere movendi oculos incolarum terræ, qui putandi sunt non longe abesse à centro *S*. Cum enim illarum, simulque vorticum ipsas circumjacentium vires, in perpetuo æquilibrio versentur; vis radiorum, ab *F* venientium versus *S*, minuitur quidem à materia vorticis *A E I O* ipsis renitente, sed tamen non tota deletur, nisi in centro *S*; ideoque nonnulla pervenire potest usque ad terram, quæ aliquantulum distat ab isto centro. Itemque radii ab *Y* ad terram venientes, transeundo per vorticem *A E V*, nihil in eo suarum virium amittunt, nisi ratione distantæ; non enim eorum vim magis minuit materia hujus vorticis, ex eo quod ab *F* recedere conetur versus partem suæ circumferentiæ *V X*, quam auget ex eo quod etiam tendat ab *F* versus aliam partem circumferentiæ *A E*. Atque ita de cæteris.


CXXXI.  
An fixæ in  
veris locis  
videantur:  
& quid sit  
Firmamentum.

Hicque obiter est advertendum; radios ab *Y* ad terram venientes, oblique incidere in lineas *A E & V X*, quæ designant superficies, in quibus vortices isti terminantur, & ideo in ipsis refringi. Vnde sequitur, stellas fixas non videri omnes ex terra, tanquam in locis in quibus revera existunt, sed tanquam si essent in locis superficiei vorticis *A E I O*, per quæ transeunt illi earum radii, qui perveniunt ad terram, sive ad viciniam Solis; ac forte etiam unam & eandem stellam in duobus aut pluribus ejusmodi locis apparere. Quæ loca cum non deprehendantur fuisse mutata, ex quo ab Astronomis notata sunt, non puto aliud quam istas superficies per nonnien Firmamenti esse intelligendum.

CXXXII.  
Cur Cometa  
à nobis non  
videantur,  
cum sint extra  
nostrum  
caelum; &  
obiter, cur  
carbones sint  
nigri, & cire-  
nes albi.

Cometarum autem lumen, cum sit multo debilius quam Fixarum, non satis habet virium ad oculos nostros movendos, nisi sub angulo satis magno videantur, & ideo ratione distantæ non apparent, cum à cælo nostro sunt nimis remoti: notum enim est, quo magis aliquod corpus à nobis remotum est, eo sub minori angulo videri. Cum autem ad ipsum propius accedunt, variæ esse possunt rationes, ob quas, priusquam in illud ingredientur, conspicui non





Q 2

non sint : quarum quænam sit præcipua, non facile est definire. Nam exempli causa, si oculus spectatoris sit versus F, nondum videbit Cometam in 2, quia ibi cingetur adhuc materia vorticis ex quo egreditur; & tamen videbit illum in 4, ubi erit remotior. Cujus rei ratio esse potest, quod radii sideris F, tendentes versus 2, ibi refringantur in superficie convexa materiæ vorticis AEIO, quæ Cometam adhuc involvit, & refraçtio illa ipsos removeat à perpendiculari, juxta ea quæ in Dioptrica explicui; quia nempe radii isti multo difficilius transeunt per hanc materiæ vorticis AEIO, quam per illam vorticis AEVX: unde fit, ut longe pauciores perveniant ad Cometam, quam si refraçtio ista non fieret; hique pauciores, inde ad oculum reflexi, possunt esse nimis debiles ad eum movendum. Alia vero ratio est, quod valde sit credibile, quemadmodum eadem semper Lunæ facies terram respicit, ita semper eandem cujusque Cometæ partem versus centrum vorticis, in quo versatur, converti, eamque solam radiis reflectendis aptam esse. Sic nempe, cum Cometa est in 2, illa ejus pars quæ radios potest remittere, opposita est centro S; nec ideo videri potest ab iis qui sunt juxta F; sed progrediendo à 2 ad 3, invertit se brevi tempore versus F, atque ideo ibi tunc incipit videri. Nam rationi valde consentaneum est, primo, ut putemus, dum Cometa transit ab N per C versus 2, illam ejus partem quæ sideri S obversa est, magis agitari, & rarefieri, propter actionem istius sideris, quam aliam partem ab eo aversam. Secundo, ut putemus, agitatione ista tenuiores & (ut ita loquar) molliores particulas tertii elementi, quæ sunt in ejus superficie, ab ea separari; unde fit ut radiis reflectendis aptior evadat, quam superficies alterius partis. Quemadmodum ex iis quæ de igne infra dicuntur, poterit intelligi, rationem ob quam carbones extincti videntur nigri, non aliam esse quam quòd omnis eorum superficies, tam interna, quam externa, particulis istis tertii elementi mollioribus contacta sit; quæ particule molliores cum ignis vi à reliquis separantur, carbones, qui nigri erant, in cineres, non nisi ex duris & solidis particulis conflatos, atque ideo albos, mutantur: & nulla sunt corpora reflectendis radiis magis apta quam alba, nulla minus quam nigra. Tertio, ut putemus, partem illam rariorem Cometæ, alia minus aptam esse ad motum, & ideo juxta leges Mechanicæ, debere semper esse in concava parte lineæ curvæ, quam Cometa motu suo describit; quia sic alia paulo tardius incedit: & cum lineæ istius cavitatis semper respiciat centrum vorticis

in

in quo est Cometa, (ut hic cavitas ejus partis N C 2 respicit centrum S, cavitas partis 2 3 4 respicit F &c.) ideo illum ex una vortice in alium transeundo converti : ut videmus in sagittis per ærem volantibus, pennatam earum partem esse semper alia inferiorem cum ascendunt, & superiorem cum descendunt. Denique plures aliæ rationes dari possent, cur Cometæ à nobis non videntur, nisi quamdiu transeunt per nostrum cœlum : ex minimis enim momentis pendet, ut idem corpus radiis reflectendis aptum sit vel ineptum: & de ejusmodi particularibus effectis, de quibus satis multa experimenta non habemus, sufficere debent verisimiles causæ, licet eæ forte non sint veræ.

Præter hæc autem, observatur etiam, circa Cometæ longam radorum veluti comam fulgere, à qua nomen suum acceperunt; atque istam comam semper in parte à Sole præterpropter averfa videri: adeo ut, si terra stet in linea recta inter Cometam & Solem, crines in omnes partes dispersi circa illum appareant. Et Cometa anni 1475, cum primum visus est, comam præferebat; in fine autem suæ apparitionis, quia in opposita cœli regione versabatur, comam post se trahebat. Hæc etiam coma longior est vel brevior: tum ratione magnitudinis Cometæ, in minoribus enim nulla apparet, nec etiam in magnis, cum à nostro aspectu recedentes perexigui esse videntur: tum etiam ratione loci; cæteris enim paribus, quo terra remotior est à linea recta, quæ duci potest à Cometa ad Solem, eo ipsius coma longior est; Et interdum latente Cometa sub radiis Solis, ejus comæ extremitas instar trabis igneæ sola conspicitur; Ac denique coma ista interdum paullo latior est, interdum angustior; interdum recta, interdum curva; & interdum à Sole directe averfa, interdum non ita præcise.

Quorum omnium rationes ut intelligantur, novum quoddam genus refractionis, de quo in Dioptrica non actum est, quia in corporibus non notatur, hic est considerandum. Nempe ex eo quod globuli cœlestes non sint omnes inter se æquales, sed paulatim minuantur à certo termino, intra quem continetur sphaera Saturni, usque ad Solem, sequitur, radios luminis, qui per majores ex istis globulis communicantur, cum ad minores deveniunt, non modo secundum lineas rectas progredi debere, sed etiam ex parte ad latera refringi & dispergi.

Consideremus exempli causâ hanc figuram, in qua multis globulis

Q 3


NB.  
Vide fig.  
pag. 123.

CXXXIII.  
*De Cometarum coma, & variis ejus phœnomenis.*

CXXXIV.  
*De quadam refractione, à qua ista coma dependet.*

CXXXV.  
*Explicatio istius refractionis.*

bulis perexiguus incumbunt alii multo majores, putemusque, ipsos esse omnes in continuo motu, quemadmodum globulos secundi elementi supra descripsimus; adeo ut si unus ex ipsis versus aliquam partem pellatur, exempli causa, A versus B, ejus actio aliis omnibus qui reperientur in linea recta, ab ipso versus illam partem protensa, sine mora communicetur. Vbi notandum est, actionem quidem istam ab A usque ad C integram pervenire, sed aliquam tamen ejus partem à C ad B transire posse, & residuum versus D & E dispergi. Globus enim C non potest pellere globulum 2 versus B, quin simul etiam pellat globulos 1 & 3 versus D & E. Neque est par ratio, cum globus A pellit duos globos 4 & 5 versus C; quamvis enim hæc ejus actio à duobus illis globis 4 & 5 ita excipiat, ut videantur etiam deflecti versus D & E, recta ta-



men tendit ad C; tum quia globi isti 4 & 5, æqualiter utriusque ab aliis sibi vicinis suffulti, totam illam restituunt globo 6; tum etiam quia continuus eorum motus efficit, ut nunquam per ullam temporis moram hæc actio à duobus simul excipiat, sed tantum, ut successive nunc ab uno & mox ab altero transmittatur; Cum autem globus C, pellit tres simul 1, 2, 3, versus B, non ita potest ejus actio ab illis ad unum aliquem remitti; & quantumvis moveantur, semper aliqui ex ipsis actionem illam oblique excipiunt;


piunt; ideoque quamvis præcipuum ejus radium recta versus B deducant, innumeros tamen alios debiliores, utrimque versus D & E dispergunt. Eodemque modo, si pellatur globus F versus G, cum ejus actio pervenit ad H, ibi communicatur globulis 789, qui præcipuum quidem ejus radium mittunt ad G, sed alios etiam versus D & B dispergunt. Hicque notanda est differentia, quæ oritur ex obliquitate incidentiæ istarum actionum in circulum CH: actio enim ab A ad C, cum perpendiculariter incidat in illum circulum, radios suos æqualiter utrimque dispergit versus D & E, actio autem ab F ad H, quæ in eundem oblique incidit, non dispergit suos, nisi versus ipsius centrum; saltem si obliquitas incidentiæ supponatur esse graduum 90; si vero supponatur minor, nonnulli quidem ejus actionis radii etiam in aliam partem mittentur, sed alius multo debiliores, & ideo vix sensibiles, nisi cum ista obliquitas est valde parva; contra autem radii, qui versus centrum circuli oblique sparguntur, eo sunt fortiores quo ista obliquitas est major.

Quorum omnium demonstratione percepta, facile est illam transferre ad globulos cœlestes. Quamvis enim nullus sit locus, in quo sic majusculi ex istis globulis alios multo minores tangant, quia tamen ipsi gradatim sunt minores & minores, à certo termino usque ad Solem, ut dictum est; facile credi potest, non minorem esse differentiam, inter illos qui sunt supra orbitam Saturni, & illos qui sunt juxta orbitam terræ, quam inter majores & minores mox descriptos; atque inde intelligi, effectum istius inæqualitatis non alium esse debere in hac terræ orbita, quam si minimi majusculis immediate succederent; nec alium etiam in locis intermediis, nisi quod lineæ secundum quas isti radii disperguntur, non sint rectæ, sed paulatim inflexæ. Nempe si S sit Sol, 2345 orbita per quam terra anni spatio defertur, secundum ordinem notarum 234; DEFG terminus ille à quo globuli cœlestes incipiunt gradatim esse minores & minores usque ad Solem: (quem terminum supra diximus non habere figuram spheræ perfectæ, sed spheroidis irregularis versus polos multo depressioris, quam versus eclipticam) & C sit Cometa in nostro cœlo existens: putandum est, radios Solis in hunc Cometam impingentes ita inde reflecti versus omnes partes spheroidis DEFGH, ut ii qui perpendiculariter incidunt in F, maxima quidem ex parte recta pergant usque ad 3, sed tamen etiam

CXXXVI.  
*Explicatio  
 apparitionis  
 cometæ.*

non-

nonnulli ex ipsis hinc inde spargantur; & qui oblique incident in G, non tantum recta pergant versus 4, sed etiam ex parte refran-



gantur versus 3; & denique qui incident in H, recta non perveniant ad orbitam terræ, sed tantum reflexi versus 4 & 5, sicque de cæteris. Vnde patet, si terra sit in orbitæ suæ parte 3, hunc Cometam ex ea visumiri, cum coma in omnes partes dispersa; quod genus Cometæ Romanam vocant: radii enim directi à C ad 3, ejus caput; alii autem debiliores, qui ex E & G versus 3 reflectuntur, ejus crines exhibebunt. Si vero terra sit in 4, idem Cometa ex ea videbitur per radiis rectos C G 4, & ejus coma, sive potius cauda, versus unam tantum partem protensa, per radiis ex H, & aliis locis, quæ sunt inter G & H, versus 4 reflexos. Eodemque modo, si terra sit in

2, Cometa ex ea videbitur ope radiorum rectorum CE 2, & ejus coma ope obliquoium, qui sunt inter CE 2 & CD 2; Nec alia

alia erit differentia; nisi quod oculo existente in 2, Cometa mane videbitur, & coma ipsum præcedet; oculo autem existente in 4, Cometa videbitur vesperi, & caudam suam post se trahet.

Denique si oculus sit versus punctum S, impieditur à radiis Solis ne Cometam ipsum videre possit, sed videbit tantum ejus comæ partem, instar igneæ trabis, quæ apparebit vel vesperi-vel mane, prout oculus propior erit puncto 4 vel puncto 2; atque forte una mane & alia vesperi poterit apparere, si oculus in ipso puncto medio s; existat.

Et quidem hæc coma vel cauda interdum recta, interdum nonnihil incurva esse debet; interdumque in recta linea, quæ transit per centra Cometæ & Solis, interdum nonnihil ab ea deflectens; ac denique interdum latior, interdum angustior, vel etiam lucidior, cum nempe radii laterales versus oculum convergunt. Hæc enim omnia sequuntur ab irregularitate spheroidis D E F G H: quippe versus polos, ubi ejus figura depressior est, caudas Cometarum exhibere debet magis rectas & latas; in flexu qui est inter polos & eclipiticam, magis curvas, & à Solis opposito deflectentes; & secundum istius flexus longitudinem magis lucidas, & angustas. Nec puto, quicquam hætenus circa Cometas fuisse observatum, saltem quod nec pro fabula, nec pro miraculo sit habendum, cujus causa hic non habeatur.

Quæri tantum potest, cur non etiam comæ circa stellas fixas, ac circa altiores planetas Jovem & Saturnum appareant. Sed facilis responsio est, primo ex eo, quod non soleant videri in Cometis, cum eorum diameter apparens non est major quam fixarum, quia tunc isti radii secundarii, non habent satis virium ad oculos movendos: Ac deinde quantum ad fixas, quia cum lumen à Sole non mutantur, sed illud ex se ipsis emittant, ista earum coma, si quæ sit, hinc inde in omnes partes spargi debet, atque esse perbrevis; jamque revera circa ipsas talis coma esse videtur; neque enim uniformi linea circumscriptæ, sed vagis radiis undique cinctæ apparent; & non male forsan etiam scintillationem (cujus tamen plures aliæ causæ esse possunt) huc referemus. Quantum autem ad Jovem & Saturnum, non dubito quin, ubi aer est admodum purus, breves etiam interdum comæ, in partem à Sole averfam protensæ, circa ipsos videantur; & scio, me tale quid alicubi olim legisse, quamvis auctoris non recorder; quodque ait Aristoteles lib. I. meteorologic.

CXXXVII.

*Quomodo etiam trabes apparent.*

CXXXVIII.

*Cur Cometarum cauda non semper in parte à Sole directe averfa, nec semper recta videatur.*

CXXXIX.

*Cur sales comæ circa Fixas aut Planetas non apparent.*

130      PRINCIPIORVM PHILOSOPHIÆ  
 cap. 6. de fixis, eas etiam ab Ægyptiis cometas nonnunquam visas  
 fuisse, puto, de his planetis potius esse intelligendum; quod autem  
 refert de coma, cuiusdam ex stellis quæ sunt in femore canis, à se  
 conspecta, vel ab aliqua in aëre valde obliqua refractione, vel po-  
 tius ab illius oculorum vitio processit; addit enim, minus fuisse con-  
 spicuum, cum oculorum aciem in ipsam intendebat, quam cum re-  
 mittebat.

CXL.  
*De princi-  
 pio motus  
 Planetæ.*

NB.  
 Vide fig.  
 pag. 123.

Nunc vero expositis iis omnibus quæ ad Cometas spectant, re-  
 vertamur ad Planetas: putemusque, sidus N minoris agitationis  
 esse capax, sive minus habere soliditatis, quam globulos secundi ele-  
 menti, qui sunt versus circumferentiam nostri cœli, sed tamen ali-  
 quanto plus habere, quam aliquos ex iis qui sunt versus Solem: Vn-  
 de intelligemus, illud statim atque à vortice Solis abreptum est, con-  
 tinuo versus ejus centrum descendere debere, donec devenerit ad eos  
 globulos cœlestes, quibus in soliditate, sive in aptitudine ad perfe-  
 verandum in suo motu per lineas rectas, est æquale: Cumque tan-  
 dem ibi erit, non amplius ad Solem magis accedet, nec etiam ab eo  
 recedet, nisi quatenus ab aliquibus aliis causis nonnihil hinc inde  
 propelletur, sed, inter istos globulos cœlestes libratum, circa So-  
 lem assidue gyraabit, & erit Planeta. Quippe si propius accederet  
 versus Solem, ibi versaretur inter globulos cœlestes paullo mino-  
 res, ac proinde quos superaret vi ad recedendum à centro circa quod  
 gyrat; & celerius motus, ac proinde à quibus ista ejus vis simul  
 cum agitatione auferetur, sicque inde rursus regredi deberet. Si  
 vero à Sole magis recederet, ei occurrerent globuli cœlestes ali-  
 quanto minus celeriter moti, ac proinde qui ejus agitationem mi-  
 nuerent; & paullo majores, ac proinde qui vim haberent, ipsum  
 versus Solem repellendi.

CXLI.  
*Causæ, a  
 quibus ejus  
 errores pen-  
 dent.  
 Prima.*

Aliæ autem causæ, quæ Planetam circa Solem ita libratum non-  
 nihil inde propellunt, sunt Primo, quod spatium, in quo simul cum  
 totâ materiâ cœli rotatur, non sit perfecte sphericum; necesse est  
 enim, ubi hoc spatium latius est, ut ista materia cœli lentius fluat,  
 quam ubi angustius.

CXLII.  
*Secunda.*

Secundo, quod materia primi elementi, ex quibusdam vicinis  
 vorticibus versus centrum primi cœli fluendo, & inde ad quosdam  
 alios refluxendo, tum globulos secundi elementi, tum etiam Plane-  
 tam inter ipsos libratum, diversimode possit commovere.

CXLIII.  
*Tertia.*

Tertio, quod meatus qui sunt in corpore istius Planetæ, aptio-  
 res



res esse possint ad particulas striatas, aliasve primi elementi, quæ ex certis cœli partibus veniunt, quam ad reliquas, recipiendas: unde fit, ut istorum meatuum orificia, quæ circa polos macularum sidera involventium formari supra diximus, versus istas cœli poli partes potius, quam versus alias, obvertantur.

Quarto, quod jam ante aliqui motus in isto Planeta esse poterint, qui diutissime in eò perseverant, licet aliæ causæ repugnent. CXLIV.  
*Quarta.*  
 Ut enim videmus, turbinem, ab hoc solo quod semel à puero intorqueatur, satis virium acquirere, ad perseverandum in suo motu per aliquot horæ minuta, interimque aliquot millia gyrorum absolvere, quamvis mole sit exiguus, & tum ær circumjacens, tum etiam terra cui insistit, ejus motui adversentur: ita facile credi potest, ex hoc solo quod aliquis Planeta cum primum factus est fuerit motus, eum à prima mundi origine ad hoc usque tempus, absque ulla notabili imminutione celeritatis, circuitus suos continuare potuisse: quia multo brevius est tempus quinque vel sex millium annorum, à quibus mundus stetit, si cum magnitudine alicujus Planetæ comparatur, quam tempus unius horæ minuti, cum exigui turbinis mole collatum.

Quinto denique, quod vis ita perseverandi in suo motu sit multo firmior & constantior in Planeta, quam in materia cœlesti eum circumjacente; ac etiam firmior in magno Planeta quam in minore. CXLV.  
*Quinta.*  
 Quippe ista vis in materia cœlesti pendet ex eo, quod ejus globuli simul conspirent in eundem motum: cumque sint à se mutuo disjuncti, parvis ex momentis fieri potest, ut modo plures, inodo pauciores ita simul conspirent. Vnde sequitur, Planetam nunquam tam celeriter moveri, quam globulos cœlestes eum circumjacentes; etsi enim æquet illum eorum motum, quo simul cum ipsis fertur, illi interim habent alios plures, quatenus à se mutuo disjuncti sunt. Inde etiam sequitur, cum horum globulorum cœlestium motus acceleratur, vel tardatur, vel inflectitur, non tantopere, nec tam cito accelerari, vel tardari, vel inflecti motum Planetæ inter ipsos versantis.

Quæ omnia si considerentur, nihil occurret circa phænomena CXLVI.  
 Planetarum, quod non plane conveniat cum legibus naturæ à nobis expositis, cujusque ratio ex jam dictis non facile reddatur. *De prima*  
*productione*  
*universi*  
*Planetarum.*  
 Nihil enim vetat quo minus arbitremur, vastissimum illud spatium in quo jam unicus vortex primi cœli continetur, initio in quatuordecim

cin pluresve vortices fuisse divisum, eosque ita fuisse dispositos, ut sidera quæ in centrīs suis habebant, multis paulatim maculis tegerentur, & deinde isti vortices uni ab aliis destruerentur, modo jam à nobis descripto; unus citius, alius tardius, pro diverso eorum situ. Adeo ut cum illi tres, in quorum centrīs erant Sol, Iupiter & Saturnus, cæteris essent majores; sidera, quæ in centrīs quatuor minorum Iovem circumstantium versabantur, versus Iovem delapsa sint; & quæ in centrīs duorum aliorum Saturno vicinorum, versus Saturnum, (saltem si verum est, duos jam Planetas circa ipsum versari;) & Mercurius, Venus, Terra, Luna & Mars (quæ sidera etiam singula suum vorticem prius habuerunt) versus Solem; ac tandem etiam Iupiter & Saturnus, una cum minoribus sideribus iis adjunctis, confluerint versus eundem Solem, ipsis multo majorem, postquam eorum vortices fuerunt absumpti; sidera autem reliquorum vorticum, si unquam plura fuerint quam quatuordecim in hoc spatio, in Cometas abierint.

CXLVII. Sicque jam videntes, primarios Planetas, Mercurium, Venerem, Terram, Martem, Iovem & Saturnum, ad diversas distantias circa Solem deferri, judicabimus, id ex eo contingere, quod eorum qui Soli viciniore sunt, soliditas sit minor quam remotiorum; Nec mirabimur, Martem terra proximam, ipsa tamen magis à Sole distare, quia solidior nihilominus esse potest; cum soliditas à sola magnitudine non pendeat.

CXLVIII. Et videntes, inferiores ex istis Planetis, altioribus celerius in orbem ferri, putabimus id ex eo fieri, quod materia primi elementi, quæ Solem componit, celerime gyratione, viciniore cæli partes magis secum abripiat quam remotiores. Nec interim mirabimur, quod maculæ quæ in ejus superficie apparent, multo tardius ferantur, quam ullus Planeta; (quippe in brevissimo suo circuitu viginti sex dies impendunt, Mercurius autem in suo, plusquam sexages majori, vix tres menses, & Saturnus in suo forte bis millies majori annos tantum triginta, qui nisi celerius ipsis moveretur, plus centum deberet impendere. Hoc enim putabimus accidere ex eo, quod particulæ tertiæ elementi, ortæ à continua inacularum dissolutione, congregatæ sint circa Solem, atque ibi magnam quandam molem æris sive ætheris componant, forte usque ad spheram Mercurii, vel etiam ulterius extensam; cujus ætheris particulæ cum sint valde irregulares & ramosæ, sibi invicem sic adherent, ut non disjunctim


con-

*Cur quidam Planetæ sint alius à Sole remotiores: idque ab eorum magnitudine sola non pendere.*

*Cur Soli viciniore celerius alius moveantur, et tamen ejus maculæ sint tardissimæ.*

concitentur, quemadmodum globuli materiæ cœlestis, sed omnes simul à Sole rapiantur, & cum ipsis tum maculæ solares, tum etiam pars cœli Mercurio vicina; unde fit, ut non multo plures circuitus, quam Mercurius, eodem tempore absolvant, nec proinde tam cito moveantur.

Deinde videntes Lunam non modo circa Solem, sed simul etiam CXLIIX.  
circa Terram gyrate, judicabimus id vel ex eo contingere, quod, *Cur Luna  
circa Ter-  
ram gyret.*  
ut Iovis Planetæ versus Iovem, sic ipsa versus Terram confluerit, priusquam hæc circa Solem ferretur, vel potius quod, cum non minorem habeat vim agitationis quam Terra, in eadem sphaera circa Solem debeat versari; & cum mole sit minor, æqualem habens vim agitationis, celerius debeat ferri. Nam Terra existente circa Solem S, in circulo NTZ, cum quo defertur ab N per T, versus Z, si Luna celerius acta eodem deveniat, in quacunque parte



circuli NZ eam initio esse contingat, brevi accedet ad A, ubi à vicinia Terræ impedita ne recta ulterius pergat, deflectet cursum suum versus B. dico versus B, potius quam versus D, quia sic à linea recta minus deflectet. Dum autem ita perget ab A versus B,


omnis materia cœlestis contenta in spatio ABCD, quæ ipsam defert, contorquebitur in modum vorticis circa centrum T; sicque etiam efficiet, ut Terra circa suum axem gyret, dum interim hæc omnia simul per circulum NTZ circa centrum S ferentur.

**CL.**  
*Cur Terra circa suum axem vertatur.*  
Quoniam aliæ præterea sint causæ, cur Terra circa proprium axem vertatur. Si enim antea fuerit sidus lucidum, in alicujus vorticis centro consistens, ibi procul dubio sic gyrabat; & nunc materia primi elementi, in ejus centro congregata, similes adhuc motus habet, ipsamque impellit.

**CLI.**  
*Cur luna celerius feratur quam Terra.*  
Nec mirabimur, hanc Terram fere tricies circa suum axem conuolvi, dum Luna tantum semel circumferentiam circuli ABCD percurrit. Cum enim hæc circumferentia ABCD sit circiter sexages major Terræ ambitu, sic Luna duplo celerius adhuc fertur quam Terra; & cum ambæ agantur ab eadem materia cœlesti, quam credibile est non minus celeriter moveri prope Terram quam prope Lunam, non videtur alia causa majoris in Luna celeritatis, quam quod minor sit quam Terra.

**CLII.**  
*Cur semper Lunæ facies quam proxime eidem sit Terræ obversa.*  
Non etiam mirabimur, quod semper eadem pars Lunæ sit Terræ obversa, vel certe non multum ab ea deflectat; facile enim judicabimus, id ex eo contingere, quod alia ejus pars aliquanto sit solidior, & ideo terram circumcundo majorem ambitum debeat percurrere; ad exemplum ejus quod paulo ante notatum est de Cometis. Et certe innumeræ illæ inæqualitates instar montium & vallium, quæ in ejus facie obversa perspicillorum ope deprehenduntur, minorem ipsius soliditatem videntur arguere: hujusque minoris soliditatis causa esse potest, quod alia ejus facies, quæ nunquam in conspectum nostrum venit, solum lumen directe à Sole missum excipiat; hæc autem etiam illud quod ex terra reflectitur.

**CLIII.**  
*Cur Luna celerius incedat, & à suo motu media minus aberrat in conjunctionibus, quam in quadris: & cur ejus calum non sit rotundum.*  
Neque magis mirabimur, quod Luna videatur aliquanto celerius moveri, & in omnes partes à cursu suo minus aberrare, cum plena est vel nova, quam cum dimidia tantum apparet, sive cum est versus partes cœli B vel D, quam cum est versus A vel C: Quia cum globuli cœlestes, qui continentur in spatio ABCD, ratione magnitudinis & motus diversæ sint tam ab iis qui sunt infra D versus K, quam ab iis qui sunt supra B versus L, iis autem qui sunt versus N & Z sint similes, liberius se diffundunt versus A & C, quam versus B & D. Vnde sequitur, ambitum ABCD non esse circulum perfectum, sed magis ad Ellipsis figuram accedere; ac  
mate-



materiam cœli lentius ferri inter C & A, quam inter B & D, id-  
 eoque Lunam, quæ ab ista materia cœli defertur, & propius acce-  
 dere debere versus Terram, si sit in motu ad accedendum, & magis  
 removeri, si sit in motu ad recedendum, cum ipsam contingit esse  
 versus A vel C, quam cum est versus B vel D.

Neque mirabimur, quod Planetæ, qui juxta Saturnum esse di-  
 cuntur, lentissimo vel nullo motu circa ipsum ferantur, contra au-  
 tem qui sunt juxta Iovem, circa illum gyrent, & quisque tanto cele-  
 rius, quanto Iovi est vicinior. Hujus enim diversitatis causa esse  
 potest, quod Iupiter, ut Sol & Terra, circa proprium axem agatur;  
 Saturnus autem, ut Luna & Cometæ, semper eandem sui partem  
 convertat versus centrum vorticis in quo continetur.

Præterea non mirabimur, quod axis, circa quem Terra diei spa-  
 tio convolvitur, non sit perpendiculariter erectus supra planum Ec-  
 lipticæ, in quo anni spatium circa Solem rotatur, sed plusquam vi-  
 ginti tribus gradibus à perpendiculari declinet; unde oritur diversitas  
 æstatis & hyemis in terra. Nam motus annuus terræ in Ecliptica  
 præcipue determinatur à consensu totius materiæ cœlestis, circa

Solem

CLIV.  
 Cur secundarii Plan-  
 etæ qui  
 sunt circa  
 Iovem, tam  
 celeriter;  
 qui vero  
 sunt circa  
 Saturnum,  
 tam valde  
 vel nullo  
 modo mo-  
 veantur.

CLV.  
 Cur poli Ec-  
 quatoris &  
 Eclipticæ  
 nullatenus di-  
 stent ab in-  
 vicem

Solem gyrantis, ut patet ex eo quod omnes Planetæ in eo quam proxime consentiant: directio autem ejus axis, circa quem fit motus diurnus, magis pendet à partibus cœli, à quibus materia primi elementi versus ipsam fluit. Quippe cum imaginemur, omne spatium, quod jam à primo cœlo occupatur, fuisse olim divisum in quatuordecim pluresve vortices, in quorum centrīs erant illa sidera, quæ nunc conversa sunt in Planetas, fingere non possumus, illorum omnium siderum axes versus easdem partes fuisse conversos; hoc enim cum legibus naturæ non conveniret. Sed valde credibile est, materiam primi elementi, quæ in Terræ Sidus confluebat, ex iisdem fere partibus firmamenti venisse, quas nunc adhuc ejus poli respiciunt; atque dum multi macularum vortices supra hoc sidus paulatim generabantur, particulas striatas istius materiæ primi elementi multos sibi meatus in his vorticibus efformasse, ipsosque ad magnitudinem & figuram suam sic aptasse, ut vel nullum vel non nisi difficilem transitum præbere possint particulis striatis quæ ex aliis firmamenti partibus accedunt: sicque illas, quæ sibi aptos meatus per globum Terræ secundum ejus axem efformarunt, cum nunc adhuc per ipsum perpetuo fluant, efficere, ut ejus poli versus easdem partes cœli, à quibus veniunt, dirigantur.

CLVI.  
*Cur paulatim ad irruentem accedant.*

Interim tamen, quia duæ conversiones Terræ, annua scilicet & diurna, comodiùs peragerentur, si fierent circa axes parallelos, causæ hoc impediētes paulatim utrimque immutantur; unde fit, ut successu temporis declinatio Eclipticæ ab Æquatore minuatur.

CLVII.  
*Vicina & maxime generalis causa omnium inaequalitatum, quæ in motibus corporum mundanorum reperiuntur.*

Denique non mirabimur, quod omnes Planetæ, quamvis motus circulares semper affectent, nullos tamen circulos perfectos unquam describant, sed modis omnibus, tam in longitudinem, quam in latitudinem, semper aliquantulum aberrent. Cum enim omnia corpora quæ sunt in universo, contigua sint, atque in se mutuo agant, motus in jusculjusque à motibus aliorum omnium dependet atque ideo innumeris modis variatur. Nec ullum plane phaenomenum in cœlis eminens conspectis observatur, quod non putem hic satis fuisse explicatum. Superest, ut deinceps agamus de illis, quæ coninus supra Terram videmus.

## P H I L O S O P H I Æ

## P A R S Q V A R T A.

## De Terra.

**E**T si credi nolim, corpora hujus mundi adspēctabilis genita unquam fuisse illo modo qui supra descriptus est, ut jam satis præmonui, debeo tamen eandem hypothēsim adhuc retinere, ad ea quæ supra terram apparent explicanda: ut tandem, si, quemadmodum spero, clare ostendam, causas omnium rerum naturalium hac via, non autem ulla alia dari posse, inde merito concludatur, non aliam esse earum naturam, quam si tali modo genitæ essent.

Fingamus itaque, Terram hanc quam incolimus, fuisse olim ex sola materia primi elementi constitam, instar Solis, quamvis ipso esset multo minor; & vastum vorticem circa se habuisse, in cujus centro consistebat: Sed cum particulæ striatæ, aliæque non omnium minutissimæ minutæ, istius materiæ primi elementi, sibi mutuo adhærent, sicque in materiam tertii elementi verterentur, ex iis primo maculas opacas in Terræ superficie genitas esse, similes iis quas videmus circa Solem assidue generari ac dissolvi; deinde particulas tertii elementi, quæ ex continua istarum macularum dissolutione remanebant, per cælum vicinum diffusas, magnam ibi molem æris, sive ætheris, successu temporis composuisse: Ac denique, postquam iste æther valde magnus fuit, densiores maculas, circa Terram genitas, eam totam contexitisse, atque obtenebrasse: Cumque ipsæ non possent amplius dissolvi, ac forte perimulta sibi mutuo incumbent; simulque vis vorticis Terram continentis minueretur; tandem ipsam una cum maculis, & toto aëre quo involvebatur, in alium majorem vorticem, in cujus centro est Sol, delapsam esse.

Nunc vero, si consideremus, illam nondum ita versus Solem delapsam, sed paulo post delapsuram, tres in ea regiones valde diver-


I.  
*Falsam hypothēsim qua jam ante usum, esse retinendam; ad veras rerum naturas explicandas.*

II.  
*Quæ sit generatio Terræ, secundum istam hypothēsim.*

III.  
*Distinctio Terræ in*

*tres regio-  
nes: & pri-  
ma descri-  
ptis.*

fas dignoscemus. Harum prima & intima I continere tantum vi-  
detur materiã primæ elementi, se ibi non alia ratione quam in So-  
le commoventis; nec alterius naturæ, nisi quod forte sit minus  
pura; quia quod assidue ex Sole in maculas abit, non ita potest  
ex ea expurgari. Et sane idcirco mihi facile persuaderem, jam to-  
tum spatium I solasere materia tertii elementi plenum esse, nisi



inde sequi videretur, corpus Terræ non posse manere tam vicinum  
Soli, quam nunc est, propter nimiam suam soliditatem.

IV.  
*Descriptio  
secundæ.*

Media regio M tota occupatur à corpore valde opaco & den-  
so: cum enim hoc corpus factum sit ex particulis minutissimis; (ut-  
pote quæ prius ad primum elementum pertinebant) sibi invicem  
adjunctis, nulli videntur in eo meatus relictis esse, nisi tam exigui,  
ut solis illis particulis striatis supra descriptis, ac reliquæ materiæ  
primæ elementi, transitum præbere possint. Hocque experientia  
testatur in maculis Solis: quæ cum sint ejusdem naturæ atque hoc  
corpus M, nisi quod sint multo tenuiores & rariores, transitum ta-  
men luminis impediunt; quod vix possent, si earum meatus essent  
fatis lati ad globulos secundi elementi admittendos. Cum enim  
isti meatus initio in materia fluida vel molli formati sint, haut du-  
bic



bie essent etiam satis recti & læves, ad actionem luminis non impediendam.

Sed istæ duæ interiores Terræ regiones parum ad nos spectant, quia nemo unquam ad ipsas vivus accessit. Sola tertia superest, ex qua omnia corpora, quæ hic circa nos reperiuntur, oriri posse, deinceps ostendimus. Nunc autem nihil adhuc aliud in ipsa esse supponimus, quam magnam congeriem particularum tertii elementi, multum materiæ cœlestis circa se habentium, quarum intima natura ex modo, quo genitæ sunt, potest agnosci.

Nempe cum ortæ sint ex dissolutione macularum, quæ minutissimis primi elementi ramentis sibi in tuto adjunctis constabant; unaquæque ex plurimis istiusmodi ramentis componi debet, atque esse satis magna, ut impetum globulorum secundi elementi, circa se motorum, sustineat; quia quæcunque id non potuerunt, rursus in primum vel in secundum elementum sunt resolutæ.

Verum enimvero, quamvis illæ globulis secundi elementi totæ resistant, quia tamen singula ramenta ex quibus sunt constatæ ipsis cedunt, semper eorum occursum non nihil possunt immutari.

Cumque ramenta ista primi elementi varias habeant figuras, non potuerunt plurima simul tam apte conjungi, ad unamquamque ex istis particulis tertii elementi componendam, quin multos angustissimos meatus, soli subtilissimæ materiæ ejusdem primi elementi permeabiles, in illa relinquerent; unde fit, ut, quamvis hæ particulæ sint multo majores, quam globuli cœlestes, non possint tamen esse tam solidæ, nec tantæ agitationis capaces. Ad quod etiam facit, quod figuras habeant valde irregulares, & ad motum minus aptas, quam sint sphericæ istorum globulorum. Cum enim ramenta, ex quibus componuntur, innumeris modis diversis conjuncta sint, inde sequitur, ipsas & magnitudine & soliditate & figuris plurimum ab invicem differre, ac fere omnes earum figuras esse admodum irregulares.

Hicque notandum est, quandiu Terra instar fixarum in peculiari suo vortice versata est, necdum versus Solem delapsa erat, istas particulas tertii elementi, quæ ipsam involvebant, quamvis à se invicem essent disjunctæ, non tamen hinc inde per cœlum temere sparsas fuisse, sed omnes, circa spheram M conglobatas, unas aliis incubuisse; quia pellebantur versus centrum I, à globulis secundi ele-


V.  
*Descriptio  
tertia.*

VI.  
*Particulis  
tertii ele-  
menti, quæ  
sunt in hac  
tertia re-  
gione, esse  
debere satis  
magnas.*

VII.  
*Ipsas à pri-  
mo & se-  
cundo ele-  
mento posse  
immutari.*

VIII.  
*Esse majores  
globulis se-  
cundi ele-  
menti, sed  
isidem esse  
minus solu-  
das & mi-  
nus agita-  
tas.*

IX.  
*Eas ab in-  
itio sibi mu-  
tuo incubuis-  
se circa Ter-  
ram.*



menti, qui, majorem ipsis vim agitationis habentes, ab eo centro recedere conabantur.

X. Notandum etiam, quamvis sibi mutuo sic incumbèrent, non tam apte tamen simul junctas fuisset, quin per multa intervalla circa se relinquerent, quæ non modo à materia primi elementi, sed etiam à globulis secundi occupabantur: hoc enim sequi debuit ex eo, quod figuras haberent valde irregulares ac diversas, & sine ordine unæ aliis adjunctæ essent.

XI. Notandum præterea, inferiores ex globulis, qui particulis istis immixti erant, paullo minores fuisset quam superiores: Eodem modo quo supra ostensum est, eos qui prope Solem versantur, gradatim esse minores, prout ei sunt viciniore; Ac etiam istos omnes globulos non majores fuisset, quam jam illi sint qui reperiuntur circa Solem, infra spheram Mercurii; sed forte fuisset minores, quia Sol major est, quam fuerit unquam Terra; & proinde ipsos minores etiam fuisset, quam nunc ii sint, qui hic circa nos versantur. Hi enim superant illos qui sunt infra spheram Mercurii, quoniam à Sole sunt remotiores.

XII. Et notandum, istos globulos vias sibi retinuisse inter particulas tertii elementi, ad mensuram suæ magnitudinis accommodatas; ita ut

ut non tam facile alii globuli paullo majores per eandem transire possent.

*habuisse angustiores.*

Notandum denique, tunc frequenter accidisse, ut majores & solidiores ex istis particulis tertii elementi, alias minores & tenuiores sub se haberent, quia cum uniformi tantum motu circa Terræ axem volverentur, atque ob irregularitates suarum figurarum sibi mutuo facile adhærent, etsi unaquæque, quo solidior & crassior erat, eo majori vi à globulis secundi elementi circumjacentibus versus centrum pelleretur, non tamen semper poterant solidiores, se à minus solidis ita extricare, ut infra ipsas descenderent; sed non raro eundem ordinem, quem cum primum formarentur obtinuerant, retinebant.

XIII.  
*Non semper crassiores, tenuioribus infiores fuisse.*

Cum autem postea globus Terræ, in tres istas regiones distinctus, versus Solem devolutus est, (vortice scilicet in quo antea erat absorto) non magna quidem mutatio in intima & media ejus regione potuit inde oriri; sed quantum ad exteriorem, primum duo, deinde tria, postmodum quatuor, & plura alia corpora diversa, in ea distingui debuerunt.

XIV.  
*De prima formatione diversorum corporum, in tertia Terræ regione.*

Quorum corporum productionem paullo post explicabo: sed priusquam hoc aggrediar; tres quatuorve præcipuæ actiones, à quibus pendet, hic sunt considerandæ. Prima est globulorum cælestium motus, generaliter spectatus. Secunda, gravitas. Tertia, lumen. Et quarta, calor. Per globulorum cælestium generalem motum, intelligo continuam agitationem, quæ tanta est ut non modo sufficiat, ad ipsos motu annuo circa Solem, & diurno circa Terram, deferendos, sed etiam ad eosdem interea modis aliis quamplurimis agendos. Et quia, in quamcunque partem ita moveri cœperint, pergunt postea quantum possunt, secundum lineas rectas, vel à rectis quam minimum deflectentes, hinc fit ut hi globuli cælestes, particulis tertii elementi, corpora omnia tertiæ terræ regionis componentibus, immisti, varios in iis effectus producant. quorum tres præcipuos hic notabo.

XV.  
*De allinibus, quarum ex ista corpore genita sunt; ac primo de generali globulorum cælestium motu.*

Primus est, quod pellucida reddant ea omnia corpora terrestria quæ liquida sunt, & constant particulis tertii elementi tam tenuibus, ut globuli isti circa ipsas in omnes partes ferantur. Cum enim per istorum corporum meatus hinc inde assidue moveantur, vinque habeant eorum particulas situ mutandi, facile sibi vias rectas, live rectis æquipollentes, & proinde transferendæ actioni luminis idoneas,

XVI.  
*De primo hujus primæ actionis effectu, quod videlicet corpora pellucida.*

neas, in illis efformant. Sicque omnino experimur, nullum esse in Terra liquorem purum, & tenuibus particulis constantem, qui non sit pellucidus: quantum enim ad argentum vivum, crassiores sunt ejus particulæ, quam ut globulos secundi elementi ubique circa se admittant; quantum vero ad atramentum, lac, sanguinem, & talia, non sunt liquores puri, sed plurimis pulvisculis durorum corporum inspersi. Et quantum ad corpora dura, observari potest, ea omnia esse pellucida, quæ dum formabantur, & adhuc liquida erant, pellucida fuerunt, quorumque partes retinent eundem situm, in quo positæ sunt à globulis materiæ cælestis, dum circa ipsas nondum sibi mutuo adhærentes movebantur. Contra vero illa omnia esse opaca, quorum particulæ simul junctæ & connexæ sunt, à vi aliqua externa, motui globulorum cælestium ipsis inimicorum non obsequente. quamvis enim multi meatus in his etiam corporibus relictis sint, per quos globuli cælestes hinc inde assidue discurrunt; quia tamen hi meatus variis in locis sunt interrupti & interclusi, transmittendæ actioni luminis, quæ non nisi per vias rectas, vel rectis æquipollentes, defertur, idonei esse non possunt.

## XVII.

*Quomodo corpus solidum & durum, satis multos meatus habere possit, ad radios luminis transmittendos.*

Vtque hic intelligatur, quomodo corpora dura satis multos meatus habere possint, ad transitum præbendum radiis luminis, ex qua vis parte venientibus, poma, vel alii quivis globi satis magni, & quorum superficies sit lævis, reticulo includantur, eoque arcte constricto, ita ut ista poma sibi mutuo adhærentia, unicum quasi corpus componant; in quamcunque partem hoc corpus convertetur, meatus in se continebit, per quos globuli plumbei, supra ipsum injecti, versus centrum terræ, vi gravitatis suæ, facile descendent, secundum lineas rectis æquipollentes; sicque speciem corporis pellucidi, solidi & duri exhibebit. Non enim opus est ut globuli cælestes, magis rectos & plures meatus in corporibus terrestribus, per quæ radios luminis transmittant, quam sint ii per quos globuli plumbei inter poma ista descendent.

## XVIII.

*De secundo illius primæ actionis effectu, quod una corpora ab aliis discernat, & liquores expurget.*

Secundus effectus est, quod cum particulæ duorum vel plurium corporum terrestrium, præsertim liquidorum, confuse simul junctæ sunt, globuli cælestes quasdam ex ipsis unas ab aliis soleant separare, sicque in varia corpora distinguere: quasdam autem alias accuratius permiscere, ipsasque ita disponere, ut unaquæque guttula liquoris ex iis conflati cæteris omnibus ejusdem liquoris guttulis omnino

omnino similis existat. Quippe cum globuli cœlestes moventur in meatibus corporum terreſtrium liquidorum, particulas tertii elementi ſibi obvias aſſidue loco expellunt, donec eas inter aliquas alias ita diſpoſuerint & ordinarint, ut non magis quam iſtæ aliæ ipſorum motibus obſiſtant, vel, cum ita diſponi non poſſunt, donec eas à reliquis ſegregarint. Sic videmus, ex muſto fœces quaſdam, non modo ſurſum & deorſum, (quod gravitati & levitati tribui poſſet) ſed etiã verſus vaſis latera expelli, vinumque poſtea deſcæcatum, quamvis adhuc ex variis particulis conſtans, eſſe pellucidum, & non denſius aut craſſius in imo quam in ſummo apparere. Idemque de cæteris liquoribus puris eſt exiſtimandum.

Tertius effectus globulorum cœleſtium eſt, quod aquæ aliorumve liquorum guttas in aëre, aliove liquore ab iis diverſo, pendentes, reddant rotundas, ut jam in Meteoris explicui. Cum enim iſti globuli cœleſtes longe alias habeant vias in aquæ gutta quam in aëre circumjacente, ſemperque quantum poſſunt ſecundum lineas rectas, vel ad rectas quam proxime accedentes, moveantur; maniſeſtum eſt, illos qui ſunt in aëre, obſectum aquæ guttæ minus impediri à motibus ſuis, ſecundum lineas à rectis quam minimum deſtinentes; continuandis, ſi ea ſit perfecte ſphærica, quam ſi quancunque aliam figuram ſortiat. Si quæ enim ſit pars in ſuperficie iſtius guttæ, quæ ultra figuram ſphæricam promineat, majori vi globuli cœleſtes, per aërem diſcurrentes, in illam impingent, quam in cæteras, ideoque ipſam verſus centrum guttæ protrudent: ac, ſi quæ pars ejus, ſuperficie centro vicinior ſit quam reliquæ; globuli cœleſtes, in ipſa gutta contenti, majori vi eam à centro expellent; atque ita omnes ad guttam ſphæricam faciendam concurrent. Et cum angulus contingentiæ, quo ſolo linea circularis à recta diſtat, omni angulo rectilineo ſit minor, & in nulla linea curva præterquam in circulari ſit ubique æqualis, certum eſt, lineam rectam nunquam poſſe magis æqualiter, & minus in unoquoque ex ſuis punctis inflecti, quam cum degenerat in circulem.

Vis gravitatis à tertia iſta globulorum cœleſtium actione non multum diſfert. ut enim illi globuli per ſolum ſuum motum, quo ſine diſcrimine quaquaverſus feruntur, omnes cujuſque guttæ particulas verſus ejus centrum æqualiter premunt, ſicque ipſam guttam faciunt rotundam; ita per eundem motum, totius molis terræ occurſu impediti, ne ſecundum lineas rectas ferantur, omnes ejus

## XIX.

*De tertio effectu; quod liquorum guttas reddat rotundas.*

## XX.

*Explicatio ſecundæ actionis, quæ gravitas vocatur.*

par-

partes versus medium propellant: atque in hoc gravitas corporum terrestrium consistit.

XXI.

*Omnes Terra partes, si sola spectentur, non esse graves, sed leves.*

Cujus natura ut perfecte intelligatur, notandum est primo, si omnia spatia circa Terram, quæ ab ipsius Terræ materia non occupantur: vacua essent, hoc est, si nihil continerent nisi corpus, quod motus aliorum corporum nulla ratione impediret nec juvaret, (sic enim tantum intelligi potest vacui nomen) & interim hæc terra circa suum axem spatio viginti quatuor horarum proprio motu volveretur, fore ut illæ omnes ejus partes, quæ sibi mutuo non essent valde firmiter alligatæ, hinc inde versus cælum dissilirent; Eodem modo, quo videre licet, dum turbo gyrat, si arena supra ipsum conjiciatur, eam statim ab illo recedere atque in omnes partes dispergi; & ita Terra non gravis, sed contra potius levis esset dicenda.

XXII.

*In quo consistat levitas materiae caelestis.*


Cum autem nullum sit tale vacuum, nec Terra proprio motu ciecatur, sed à materia cœlesti, eam ambiente, omnesque ejus poros pervadente, deferatur, ipsa habet rationem corporis quiescentis; materia autem cœlestis, quatenus tota consentit in illum motum quo terram deserit, nullam habet vim gravitatis, nec levitatis; sed quatenus ejus partes plus habent agitationis quam in hoc impendant, ideoque semper terræ occursum à motibus suis secundum lineas rectas persequendis impediuntur, semper ab ea quantum possunt recedunt; & in hoc earum levitas consistit.

XXIII.

*Quomodo partes omnes terræ, ab ipsa materia caelesti deorsum pellantur, & ita fiant graves.*

Notandum deinde, vim quam habent singulæ partes materiae cœlestis, ad recedendum à Terra, suum effectum sortiri non posse, nisi, dum illæ ascendunt, aliquas partes terrestres in quorum locum succedunt, infra se deprimant & propellant. Cum enim omnia spatia quæ sunt circa Terram, vel à particulis corporum terrestrium, vel à materia cœlesti occupentur: atque omnes globuli hujus materiae cœlestis æqualem habeant propensionem ad se ab ea removen- dos: nullam singuli habent vim, ad alios sui similes loco pellendos, sed cum talis propensio non sit tanta in particulis corporum terrestrium, quoties aliquos ex ipsis supra se habent, omnino in eas vim istam suam debent exercere. Atque ita gravitas cujusque corporis terrestris non proprie efficitur ab omni materia cœlesti illud circumfluente, sed præcise tantum ab ea ipsius parte, quæ, si corpus istud descendat, in ejus locum immediate ascendit, ac proinde quæ est illi magnitudine plane æqualis. Sit, exempli causa, B corpus terre-  
restre

restre in medio aëre existens, & constans pluribus particulis tertii elementi, quam moles aëris ipsi æqualis, ac proinde pauciores vel



angustiores habens poros, in quibus materia cœlestis contineatur, manifestum est, si hoc corpus B versus I descendat, molem aëris ei æqualem in ejus locum ascensuram; Et quia in ista mole aëris plus materiæ cœlestis quam in eo continetur, manifestum etiam est, in ipsa esse vim ad illud deprimendum.

Atque ut hic calculus recte ineatur, considerandum est, in meatibus istius corporis B esse etiam aliquid materiæ cœlestis, quæ opponitur æquali quantitati similis materiæ cœlestis, quæ in aëris mole continetur, eamque reddit otiosam; itemque in mole aëris esse aliquas partes terrestres, quæ opponuntur totidem aliis partibus terrestribus corporis B, nihilque in eas efficiunt: His autem utrimque detractis, quod reliquum est materiæ cœlestis in ista mole aëris, agere in id quod reliquum est partium terrestrium in corpore B; atque in hoc uno ejus gravitatem consistere.

Vtique nihil omittatur, advertendum etiam est, per materiam cœlestem non hic intelligi solos globulos secundi elementi, sed etiam materiam primi iis admistam, & ad ipsam quoque esse referendas illas particulas terrestres, quæ cursum ejus sequuntur, cæteris

T

cele-

XXIV.  
Quanta sit  
in quoque  
corpore gra-  
vitas.

XXV.  
Ejus quan-  
tatem non  
respondere  
quantitati  
materie cu-  
jusque cor-  
poris.

celerius moventur; quales sunt ex omnes quæ ærem componunt. Advertendum præterea, materiam primi elementi cæteris paribus majorem vim habere ad corpora terrestria deorsum pellenda, quam globulos secundi, quia plus habet agitationis; & hos majorem, quam particulas terrestres acris quas secum movent, ob similem rationem. Vnde fit, ut ex sola gravitate non facile possit æstimari, quantum in quoque corpore materiæ terrestris contineatur. Et fieri potest, ut, quamvis, exempli causa, massa auri vicies plus ponderet, quam moles aquæ ipsi æqualis, non tamen quadruplo vel quintuplo plus materiæ terrestris contineat: tum, quia tantundem ab utraque subducendum est, propter ærem in quo ponderantur; tum etiam, quia in ipsa aqua, ut & in omnibus aliis liquidis corporibus, propter suarum particularum motum, inest levitas, respectu corporum durorum.

X XVI.

*Cum corpora non gravitent in locis suis naturalibus.*

Considerandum etiam, in omni motu esse circulum corporum quæ simul moventur, ut jam supra ostensum est; nullumque corpus à gravitate sua deorsum terri, nisi eodem temporis momento aliud corpus, magnitudine ipsi æquale, ac minus habens gravitatis, sursum teratur. Vnde fit, ut in vase, quantumvis profundo & lato, inferiores aquæ alteriusve liquoris guttæ à superioribus non premantur; nec etiam premantur singulæ partes fundi, nisi à totidem guttis, quot ipsis perpendiculariter incumbunt. Nam exempli causa, in vase A B C, aquæ gutta 1 non premitur ab aliis 2 3 4, supra



ipsam existentibus, quia si hæ deorsum ferrentur, deberent aliæ guttæ 5 6 7 aut similes in earum locum ascendere; quæ, cum sint æque graves, illarum descensum impediunt. Hæ autem guttæ 1 2 3 4, junctis viribus premunt partem fundi B; quia, si efficiant ut descendat, descendent etiam ipsæ; ac in

earum locum partes æris 8 9, quæ sunt ipsi leviores, ascendent. Sed eandem vasis partem B non plures guttæ premunt quam hæ 1 2 3 4, vel aliæ ipsi æquipollentes; quia eo temporis momento, quo hæ pars B potest descendere, non plures eam sequi possunt.

Atque




Atque hinc innumera experimenta circa corporum gravitatem, vel potius, si sic loqui licet, gravitationem, quæ male philosophantibus mira videntur, per facile est explicare.

Notandum denique, quamvis particulæ materiæ cælestis eodem tempore multis diversis motibus ciantur, omnes tamen earum actiones ita simul conspirare, ac tanquam in æquipondio consistere, unaque aliis opponi, ut ex hoc solo quod terræ moles objectu suo earum motibus adversetur, quaquaversus æqualiter propendeant ad se ab ejus vicinia, & tanquam ab ejus centro, removendas; nisi forte aliqua exterior causâ diversitatem hac in re constituat. Talesque aliquot causæ possunt excogitari, sed an earum effectus sit tantus, ut sensu deprehendatur, nondum mihi competentum est.

Vis luminis, quatenus à Sole ac stellis in omnes cæli partes se diffundit, jam satis supra fuit explicata: superest tantum ut hic notemus, ejus radios, à Sole delapsos, Terræ particulas diversimode agitare. Quippe quamvis in se spectata, nihil aliud sit quam pressio quædam, quæ fit secundum lineas rectas, à Sole in Terram extensas: quia tamen ista pressio non æqualiter omnibus particulis tertii elementi, quæ supremam terræ regionem componunt, sed nunc unis, nunc aliis, ac etiam, nunc uni ejusdem particulæ extremitati, nunc alteri, applicatur: facile potest intelligi, quo pacto ex ipsa variaz motiones in particulis istis excitentur. Exempli causâ, si A B sit una ex particulis tertii elementi, supremam terræ regionem componentibus, quæ incumbat alteri particulæ C, atque inter ipsam & Solem aliæ multæ interjaceant, ut DEF; hæ interjacentes nunc impediunt, ne radii Solis GG, premant extremitatem B, non autem ne premant A; sicque extremitas A deprimetur, atque alia B attolletur. Et quia istæ particulæ assidue situm mutant, paullo post opponentur radiis Solis tendentibus versus A, non autem aliis tendentibus versus B; sicque extremitas A rursus attolletur, & B deprimetur. Quod

XXVII.  
*Gravitatem corpora deprimere versus centrum Terræ.*

XXVIII.  
*De tertia actione, quæ est lumen; quomodo particulas aeris commoveat.*



T 2

idem

idem in omnibus terræ particulis, ad quas Solis radii pertinent, habet locum; & ideo omnes à Solis lumine agitantur.

**XXIX.** Hæc autem particularum terrestrium agitatio, sive orta sit à lumine, sive ab alia quavis causa, calor vocatur; præsertim cum est major solito, & movet sensum; calor enim denominatio ad sensum tactus refertur. Notandumque est, unanquamque ex particulis terrestribus, sic agitatum, perseverare postea in suo motu juxta leges naturæ, donec ab aliqua alia causa sistatur; atque ideo calorem, à lumine ortum, semper aliquamdiu post sublatum lumen remanere.

**XXX.** Notandum præterea, particulas terrestres, à radiis Solis sic impulsas, alias sibi vicinas, ad quas isti radii non perveniunt, agitare; hæcque rursus alias, & sic consequenter. Cumque semper tota Terræ medietas à Sole illustretur, tot ejusmodi particulas simul commoveri, ut quamvis lumen in prima opaca superficie subsistat, calor tamen, ab eo genitus, usque ad intimas partes mediæ terræ regionis debeat pervenire.

**XXXI.** Notandum denique, istas particulas terrestres, cum à calore plus solito agitantur, in tam angusto spatio vulgo non posse contineri, quam cum quiescunt, vel minus moventur; quia figuras habent irregulares, quæ minus loci occupant, cum certo aliquo modo junctæ quiescunt, quam cum assiduo motu disjunguntur. Unde fit, ut calor omnia fere corpora terrestria rarefaciat, sed una magis, alia minus, pro vario situ & figura particularum, ex quibus constant.


**XXXII.** His variis actionibus animadversis, si rursus consideremus Terram, jam primum ad viciniam Solis accedentem, & cujus suprema regio constat particulis tertii elementi, sibi mutuo non firmiter annexis, quibus innixi sunt globuli cælestes, aliquanto minores iis, qui reperiuntur in ea cœli parte per quam transit, vel etiam in ea ad quam venit; facile intelligemus, minores istos globulos majusculis qui eam circumplectuntur loca sua relinquere; hosque majusculos, in illa cum impetu ruentes, in multas tertii elementi particulas impingere, præsertim in crassiores, ipsasque infra ceteras detrudere, juvante etiam ad hoc vi gravitatis; atque ita efficere ut istæ crassiores, infra ceteras depullæ, figurasque habentes irregulares & varias, arctius inter se nectantur quam superiores, & motus globulorum cælestium interrumpant. Quo fit, ut suprema Terræ regio, qualis hic exhibetur versus A, in duo corpora valde diversa distin-

*De quarta, quæ est calor: quid sit, & quomodo sublatum lumine perseveret.*

*Cur alius penetret, quam lumen.*

*Cur corpora ferre omnia rarefaciat.*

*Quomodo suprema Terræ regio in duo diversa corpora fuerit primum divisa.*



distingatur, qualia exhibentur versus B & C, quorum superius B est rarum, fluidum & pellucidum, inferius autem C est aliquatenus densum, durum & opacum.

Deinde ex eo quod existimemus, corpus C à corpore B distinctum fuisse per hoc solum, quod ejus partes à globulis cœlestibus deorsum pressæ, sibi invicem adhærerent, intelligemus etiam, aliud adhuc corpus quale est D, inter ista duo debere postea generari. Etenim figuræ particularum tertii elementi, ex quibus constant corpora B & C, admodum variæ sunt, ut supra notatum est, ipsæque hic in tria præcipua genera licet distinguere. Nempe quædam sunt in varia quasi brachia divisæ, atque hinc inde expansæ tanquam rami arborum, & alia id genus; atque hæ sunt potissimum, quæ à materia cœlesti deorsum expulsæ, sibi mutuo adhærescunt, & corpus C componunt. Aliæ sunt solidiores, figurasque habent, non quidem omnes globi vel cubi, sed etiam cujuslibet rudis anguloli, atque hæ, si majusculæ sunt, infra ceteras vi gravitatis descendunt; si autem sint minusculæ, manent prioribus immixtæ, occupantque intervalla quæ ab ipsis relinquuntur. Aliæ deni-

XXXIII.  
*Distinctio  
particularum terre-  
strium in  
tria summa  
genera.*

T 3


que

que sunt oblongæ, ac ramis destitutæ, instar bacillorum: atque hæ prioribus etiam se interferunt, cum satis magna inter ipsas intervalla reperiant, sed non illis facile annectuntur.

XXXIV. *Quomodo tertium corpus inter duas priora factum sit.* Quibus animadversis rationi consentaneum est ut credamus, cum primum particulæ ramosæ corporis C sibi mutuo cœperunt implicari, plerasque ex oblongis fuisse ipsis interjectas, easque postea, dum ramosæ illæ magis & magis pressæ, paulatim arctius jungebantur, supra ipsas ascendisse versus D, atque ibi simul congregatas fuisse in corpus à duobus aliis B & C valde diversum. Eadem ratione, qua videmus in paludosis locis, terram calcando, aquam ex ea exprimi, quæ postea ipsius superficiem tegit. Nec dubium etiam, quin interim aliæ plures ex corpore B delapsæ sint, quæ duorum inferiorum corporum C & D molem auxerunt.

XXXV. *Particulas tantum unius generis in isto corpore contineri.* Quamvis autem initio non solæ istæ particulæ oblongæ ramosis interjectæ fuerint, sed aliæ etiam, quæ tanquam rudera aut fragmenta lapidum solidæ erant, notandum tamen, has solidiores non tam facile supra ramosas ascendisse, quam illas oblongas; vel, si quæ ascendiderint; facilius postea infra ipsas rursus descendisse: oblongæ enim, ceteris paribus, plus habent superficiem pro ratione suæ molis; atque ideo à materia cœlesti, per meatus corporis C fluente, facilius expelluntur: & postquam ad D pervenerunt, ibi transversim jacentes supra superficiem istius corporis C, non facile meatibus occurrunt, per quos in ipsum regredi possint.

XXXVI. *Duas tantum in eo esse species istarum particularum.* Sic itaque multæ oblongæ particulæ tertii elementi versus D congregatæ sunt. & quamvis initio non fuerint inter se perfecte æquales, nec similes, hoc tamen commune habuerunt, quod nec sibi mutuo, nec aliis tertii elementi particulis facile possent adhærere, quodque à materia cœlesti ipsas circumfluente moverentur. propter hanc enim proprietatem à corpore C excesserunt, atque in D sunt simul collectæ; cumque ibi materia cœlestis assidue circa illas fluat, efficiatque ut variis motibus cieantur, & unæ in aliarum loca transmigrent, successu temporis fieri debuerunt læves, & teretes, & quam-proxime inter se æquales, atque ad duas tantum species reduci. Nempe quæ fuerunt satis tenues, ut ab illo solo impetu, quo à materia cœlesti agebantur, flecti possent, circa alias paulo crassiores, quæ sic flecti non poterant, convolutæ, ipsas secum detulerunt. Atque hæ duæ particularum species, flexilium scilicet atque inflexilium, sic junctæ facilius perseverarunt in suo motu, quam



quam solæ flexiles , vel solæ inflexiles potuissent : unde factum est , ut ambæ in corpore D remanserint ; atque etiam ut illæ quæ initio circa alias flecti potuerunt , postea successu temporis , assiduo usu se inflectendi , magis & magis flexiles redderentur , fierentque instar anguillarum aut brevium funiculorum ; aliæ autem , cum nunquam flecterentur , si quam ante flexilitatem habuerint , eam paulatim amitterent , ac telorum instar rigidæ manerent .

Præterea putandum est , corpus D prius distingui cœpisse à duobus aliis B & C , quam hæc duo perfecte formata essent , hoc est , priusquam C esset tam durum , ut non amplius possent ejus particulæ arctius connecti , & inferius expelli à motu materiæ cœlestis , ac priusquam particulæ corporis B ita essent omnes ordinatæ , ut isti materiæ cœlesti faciles & æquales vias undique circa se præberent : ideoque postea multas particulas tertii elementi fuisse adhuc à corpore B versus C expulsas . Atque hæ particulæ si solidiores fuerint iis quæ congregatæ erant in D , infra ipsas descendentes corpori C se adjunxerunt , ac pro diversa ratione suarum figurarum , vel in ejus superficie manserunt , vel infra ipsam penetrarunt :  
sicque

XXXVII  
Quomodo  
infimum  
corpus C,  
in plura alia  
fuerit di-  
uisum.

ficque hoc unum corpus C in plura alia diuisum est; ac etiam forte in aliqua sua regione totum fluidum euasit, iis particulis ibi congregatis, quarum figuræ impediabant ne sibi mutuo facile adhererent. Sed omnia hic explicari non possunt.

XXXVIII.  
*De formatione alterius quarti corporis supra tertium.*

Vbi autem etiam particulæ, minus solidæ iis quæ corpus D componebant, ex B deorsum lapsæ sunt, hæserunt in superficie hujus corporis D; ac quia pleræque ex ipsis fuerunt ramosæ; paulatim sibi mutuo annexæ, corpus durum E, à duobus B & D, quæ sunt fluida, valde diversum, composuerunt. Atque hoc corpus E initio admodum tenue erat, inftar crustæ vel corticis superficiem corporis D contegentis: sed cum tempore crassius euasit, novis particulis ex corpore B se illi adjungentibus; nec non etiam ex D, quia, cum reliquis ejusdem corporis D plane similes non essent, motu globulorum cælestium expellebantur, ut mox dicam. Et quia istæ particulæ aliter disponebantur, in iis partibus terræ ubi dies erat vel æstas, quam in iis ubi erat nox vel hyems, propter diversas actiones luminis, & caloris, quod huic corpori accedebat in una die, vel in una æstate; aliquo modo distinguebatur ab eo, quod eidem accedebat in die vel æstate sequenti; sicque ex variis quasi crustis vel corticibus, sibi mutuo superinductis, fuit constat.

XXXIX.  
*De hujus quarti corporis accretione, & tertii expurgatione.*


Et quidem non longo tempore opus fuit, ut Terræ suprema regio A in duo corpora B & C distingueretur; nec etiam ut multæ particulæ oblongæ coacervarentur versus D; nec denique, ut prima interior crusta corporis E formaretur. Sed non nisi spatio plurium annorum particulæ corporis D ad duas species paulo ante descriptas reduci, atque omnes crustæ corporis E formari potuerunt. Neque enim initio ratio fuit, cur particulæ quæ confluebant versus D, non essent unæ aliis paulo crassiores & longiores, nec etiam cur essent plane læues & teretes, sed aliquid adhuc scabritiei habere potuerint, quamvis non tantum haberent, ut ideo ramosis annecterentur; potueruntque etiam secundum longitudinem planæ esse vel angulosæ, ac crassiores in una extremitate quam in altera. Cum autem sibi mutuo non adhererent, ideoque materia cælestis, assidue circumfluens, vim haberet ipsas movendi, pleræque paulatim mutuo attritu læues ac teretes euaserunt, atque inter se æquales & secundum longitudinem æqualiter crassæ: propterea quod per eandem vias transibant, & aliæ in aliarum loca succedebant, quæ loca non poterant majores recipere, nec à minoribus

tota

tota impleri. Sed pleræque etiam, cum ad communem aliarum normam reduci non possent, paullatim motu globulorum cælestium ex hoc corpore D ejectæ sunt; & harum quidem nonnullæ se corpori C adjunxerunt; sed maxima pars sursum ascendit versus E & B, materiamque augendo corpori E subministravit.

Quippe tempore diei & æstatis, cum Sol unam medietatem corporis D, vi luminis & caloris, rarefaciebat, non poterat omnis materia istius medietatis inter duo corpora vicina D & E contineri, neque hæc corpora vicina, quæ dura erant, locis expellere; atque ideo pleræque ejus materiæ particulæ per poros corporis E versus B ascendebant, quæ deinde tempore noctis & hyemis, cessante ista rarefactione, ob gravitatem suam rursus descendebant. Multæ autem causæ erant, propter quas particulæ tertii elementi, quæ sic ex corpore D egrediebantur, non poterant omnes postea in illud reverti. Nam majore impetu exibant, quam redibant; quia major est vis dilatationis à calore ortæ, quam gravitatis. Et idcirco multæ per angustos meatus corporis E sibi viam faciabant ad ascendendum, quæ postea nullam invenientes ad revertendum, in ejus superficie consistebant; ac etiam nonnullæ, meatibus istis impactæ, ulterius ascendere non valentes, aliis descensuris

X L.  
 Quomodo  
 hoc tertium  
 corpus fuerit  
 mole immi-  
 nutum, &  
 spatium  
 aliquod in-  
 ter se &  
 quartum  
 reliqueris.



vias occludebant. Præterea quæcunque cæteris erant tenuiores & à figura lævi & tereti magis distabant, solo globulorum cælestium motu extra corpus D pellebantur, ideoque primæ  
 V offerere-

offerebant ad ascendendum versus E & B: atque horum corporum particulis occurrendo, non raro figuras suas mutabant, & vel illis adhærebant, vel saltem desinebant, aptæ esse ad revertendum versus D. Vnde sequi debuit post multos dies & annos, ut magna pars hujus corporis D esset absumpta, & nullæ amplius in eo particulæ reperirentur, nisi duarum specierum ante descriptarum; ac etiam ut corpus E esset satis densum & crassum, quia fere omnes particulæ quæ ex D recesserant, vel ejus poris impactæ densius illud effecerant, vel occurfu particularum corporis B mutatae, illisque annexæ, versus E relapsæ erant, sicque crassitiem ejus auxerant; ac denique ut spatium satis amplum F inter D & E relinquere: quod non alia materia potuit impleri, quam ea ex qua constat corpus B: cujus scilicet particulæ tenuissimæ per meatus corporis E facile transferunt in loca quæ ab aliis paullo crassioribus ex D exeuntibus relinquebantur.

XLI.  
*Quomodo  
multa fissu-  
ra in quarto  
facta sint.*

Ita corpus E, quamvis gravius & densius quam F, ac forte etiam quam D, aliquandiu tamen ob suam duritiem, fornicis instar, supra D & F suspensum mansit. Sed notandum est, ipsum, cum primum formari cœpit, meatus habuisse quamplurimos, ad mensuram corporis D excavatos. Cum enim ejus superficiei tunc incumberet, non poterat non præbere transitum istis particulis, quæ quotidie vi caloris motæ, interdum versus B ascendebant, ac noctu rursus descendebant, semperque se mutuo consequentes istos meatus implebant. Cum autem postea corpore D mole imminuto, non amplius ejus particulæ, omnes meatus corporis E occuparunt, aliæ minores particulæ, ex B venientes, in earum loca successerunt; cumque hæc istos meatus corporis E non satis impleverunt, & vacuum in natura non detur; materia cœlestis, qua sola omnia exigua intervalla quæ circa particulas corporum terrestrium reperiuntur, impleri possunt, in illos ruens, eorum figuras immutabat, impetumque faciebat ad quosdam ita diducendos, ut hoc ipso alii vicini angustiiores redderentur. Vnde facile contingebat, ut quibusdam partibus corporis E à se mutuo disjunctis, in eo fierent fissuræ, quæ postea successu temporis majores & majores evaserunt. Eadem plane ratione, qua videmus, ætate in terra multas rimas aperiri, dum à Sole siccatur, eamque magis & magis liare quo diutius siccitas perseverat.



XLII.  
*Quomodo*

Cum autem multæ tales rimæ essent in corpore E, atque ipsæ semper



semper auferentur , tandem ejus partes tam parum sibi mutuo ad-  
 hæserunt , ut non amplius in modum forcis inter F & B posset sus-  
 tineri , & ideo totum contractum , in superficiem corporis C gra-  
 vitate sua delapsum est . Cumque hæc superficies satis lata non esset ,  
 ad omnia illius fragmenta sibi mutuo adjacentia , & situm quem prius  
 habuerant servantia , recipienda , quædam ex ipsis in latus inclinari

*ipsum in  
 varias par-  
 tes sit con-  
 fractum.*



atque una in alia rec umbere debuerunt . Nempe si , exempli gratia ,  
 in eo tractu corporis E , quem hæc figura repræsentat , præcipuæ  
 fissuræ ita fuerint dispositæ in locis 1 2 3 4 5 6 7 , ut duo fragmen-  
 ta ,

V 2

ta ,

ta, 2 3 & 6 7, paullo prius quam reliqua cœperint delabi, & aliorum quatuor fragmentorum extremitates 2, 3, 5 & 6 prius quam oppositæ 1, 4 & v; itemque extremitas 5 fragmenti 4 5, alioquanto prius delapsa sit, quam extremitas v fragmenti v, 6; non dubium est, quin ipsa jam debeant eo modo esse disposita, supra superficiem corporis C, quo hic depicta sunt; ita scilicet, ut fragmenta 2 3, & 6 7 proxime jungantur corpori C; alia autem quatuor in latus sint reclinata, & una in alia recumbant, &c.


## XLIII.

*Quomodo tertium corpus supra quartum ex parte ascenderit, & ex parte infra remanserit.*

XLIV. *Inde in superficie Terræ ortos esse montes, campos, maria, &c.*

Nec dubium etiam, quin corpus D quod fluidum est, & minus grave quam fragmenta corporis E, occupet quidem, quantum potest, inferiores omnes cavitates sub istis fragmentis relictas, nec non eorum rimas & meatus; sed præterea etiam, quia totum in illis contineri non potest, quin supra inferiora ex istis fragmentis, ut 2 3 & 6 7, ascendant.

Iamque si consideremus, hic per corpus B & F æreum intelligi; per C, quandam terræ crustam internam crassissimam, ex qua metalla oriuntur; per D, aquam; ac denique per corpus E, terram externam, quæ ex lapidibus, argilla, arena & limo est conflata; facile etiam per aquam, supra fragmenta 2 3 & 6 7 eminentem, maria; per alia fragmenta, molliter tantum inclinata, & nullis aquis tecta, ut 8 9, & v x, camporum planities; ac per alia



magis erecta, ut 1 2, & 9 4 v, montes intelligemus. Et denique advertemus, cum fragmenta ista vi propriæ gravitatis hoc pacto delapsa

delapsa sunt, eorum extremitates, sibi mutuo fortiter allisas, in alia multa minor fragmenta diffusisse; quæ saxa in quibusdam litoribus maris, ut in 1, & multiplicia montium juga, partim altissima, ut in 4, partim remissiora, ut in 9 & v, ac etiam scopulos in mari, ut in 3 & 6, composuerunt.

Atque intimæ horum omnium naturæ ex jam dictis erui possunt. Nam primo ex iis cognoscimus, aërem nihil aliud esse debere, quam congeriem particularum tertii elementi, tam tenuium & à se mutuo disjunctarum, ut quibuslibet motibus globulorum cælestium obsequantur; ideoque illum esse corpus valde rarum, fluidum, & pellucidum, & ex minutis cujuslibet figuræ posse componi. Quippe nisi ejus particulæ à se mutuo essent plane disjunctæ, jamdudum adhæsisset corpori E; cumque disjunctæ sint, unaquæque movetur independenter à vicinis, occupatque totam illam exiguam spheram, quam ad motum circularem circa proprium suum centrum requirit, & ex ea vicinas omnes expellit. Quamobrem nihil refert, cujusnam sint figuræ.

XLV.  
*Que sit  
aeris na-  
tura.*

Aër autem frigore facile densatur, & rarefit calore. Cum enim ejus particulæ scire omnes sint flexiles, instar mollium plumularum, vel tenuium funicularum, quo celerius aguntur, eo latius se extendunt, & idcirco majorem spatii spheram ad motum suum requirunt. Atque notum est ex dictis, per calorem nihil hic aliud quam accelerationem motus in istis particulis; & per frigus, ejusdem diminutionem, debere intelligi.

XLVI.  
*Cur facile  
rarefit, &  
densetur.*

Denique aër in vase aliquo violenter compressus, vim habet resiliendi, ac per ampliores locum se protinus extendendi. Unde sunt machinæ, quæ ope solius aëris, aquas sursum versus, instar fontium; & aliæ quæ tela cum magno impetu, arcuum instar, jaculantur. Hujusque causa est; quod aère ita compresso, unaquæque ejus particula sphericum illud spatium, quod ad motum suum requirit, sibi soli non habeat, sed aliæ vicinæ in ipsum ingredientur; cumque interim idem calor, sive eadem agitatio istarum particularum, conservetur à motu globulorum cælestium, assidue circa ipsas fluentium; eæ suis extremitatibus se mutuo verberent, & loco expellant, sicque omnes simul impetum faciant ad majus spatium occupandum.

XLVII.  
*De violenta  
ejus com-  
pressione in  
quibusdam  
machinis.*

Quantum ad aquam, jam ostendi, cur duæ tantum particularum species in ea reperiantur, quarum una sunt flexiles, aliæ inflexi-


XLVIII.  
*De aquæ  
natura: &*

*cur facile  
modo in aë-  
rem, modo  
in glaciem  
vertatur.*

les: atque si ab invicem separentur, hæc salern, illæ aquam dulcem componunt. Et quia jam omnes proprietates, cum salis tum aquæ dulcis, ex hoc uno fundamento deductas, fusc in Meteoris explicui, non opus est, ut plura de ipsis hic scribam. Sed tantum notari velim, quam apte omnia inter se cohæreant, & quomodo ex tali generatione aquæ sequatur, etiam eam esse debere proportionem, inter ejus particularum crassitiem, & crassitiem particularum aëris; itemque inter ipsas, & vim qua globuli secundi elementi eas movent, ut cum isti globuli paullo minus solito agunt, aquam in glaciem mutant, & particulas aëris in aquam; cum autem agunt paullo fortius, tenuiores aquæ particulas, eas nempe quæ sunt flexiles, in aërem vertant.

XLIX.  
*De fluxu &  
refluxu ma-  
ris.*

Explicui etiam in Meteoris causas ventorum, à quibus mare variis irregularibus modis agitur. Sed superest alius regularis ejus motus, quo bis in die singulis in locis attollitur, & deprimitur, interinque semper ab Oriente in Occidentem fluit. Ad cujus motus causam explicandam; ponamus nobis ob oculos exiguum illum cœli vorticem, qui Terram pro centro habet, quique cum illa, & cum Luna, in majore vortice circa Solem fertur. Sitque ABCD ille exiguus vortex; EFGH Terra; 1 2 3 4 superficies maris, à quo majoris perspicuitatis causa Terram ubique regi supponimus; & 5 6 7 8 superficies aëris mare ambientis. Iamque consideremus, si nulla in isto vortice Luna esset, punctum T, quod est centrum Terræ, fore in puncto M, quod est vorticis centrum; sed Luna & existente versus B, hoc centrum T esse debere inter M & D: quia, cum materia cœlestis hujus vorticis aliquanto celerius moveatur quam Luna vel Terra, quas secum defert, nisi punctum T aliquanto magis distaret à B quam à D, Lunæ præsentia impediret, ne illa tam libere fluere posset inter B & T, quam inter T & D: cunquæ locus Terræ in isto vortice non determinetur, nisi ab æqualitate virium materiæ cœlestis eam circumfluentis, evidens est, ipsam idecirco nonnihil accedere debere versus D. Atque eodem modo cum Luna erit in C, Terræ centrum esse debebit inter M & A: sicque semper Terra nonnihil à Luna recedit. Præterea quoniam hoc pacto, ex eo quod Luna sit versus B, non modo spatium per quod materia cœlestis fluit inter B & T, sed etiam illud per quod fluit inter T & D, redditur angustius, inde sequitur, istam



istam materiam cœlestem ibi celerius fluere, atque ideo magis premere, tum superficiem aëris in 6 & 8, tum superficiem aquæ in 2 & 4, quam si Luna non esset in vorticis diametro BD; cumque corpora aëris & aquæ sint fluida, & facile pressioni isti obsequantur, ipsa minus alta esse debere supra Terræ partes F & H, quam si Luna esset extra hanc diametrum BD; ac è contra esse altiora versus G & E, adeo ut superficies aquæ 1, 3, & aëris 5, 7, ibi protuberent.

Iam vero, quia pars terræ quæ nunc est in F, è regione puncti B, ubi mare est quam-minime altum, post sex horas erit in G, è regione puncti C, ubi est altissimum, & post sex alias horas in H, è regione puncti D, atque ita consequenter: Vel potius, quia Luna etiam interim non nihil progreditur à B versus C, utpote quæ mensis spatio circulum ABCD percurrit: pars Terræ quæ

L.  
*Cur aqua  
 horis 6 ½  
 ascendat,  
 & horis  
 6 ¼ descen-  
 dat.*

nunc

nunc est in F, è regione corporis Lunæ, post sex horas cum 12 minutis præterpropter, erit ultra punctum G, in ea diametro vorticis ABCD, quæ illam ejusdem vorticis diametrum in quotunc Luna erit, ad angulos rectos interfecat; tuncque aqua erit ibi altissima; & post sex alias horas cum duodecim minutis erit ultra punctum H, in loco ubi aqua erit quamminime alta, &c. Vnde clare intelligitur, aquam maris, singulis duodecim horis cum 24 minutis, in uno & eodem loco fluere ac refluxere debere.

L I.  
*Cur æstus  
maris sint  
majores,  
cum Luna  
plena est  
vel nova.*

Notandumque est, hunc vorticem ABCD non esse accurate rotundum, sed eam ejus diametrum, in qua Luna versatur cum est nova vel plena, breviorē esse illa quæ ipsam secat ad angulos rectos, ut in superiore parte ostensum est; unde sequitur, fluxus & refluxus maris debere esse majores, cum Luna nova est vel plena, quam in temporibus intermediis.

L II.  
*Cur in æ-  
quinoctiis  
sint maxi-  
mi.*

Notandum etiam, Lunam semper esse in plano Eclipticæ vicino, Terram autem motu diurno secundum planum æquatoris converti; quæ duo plana in æquinoctiis se interfecant, in solstitiis autem multum ab invicem distant: unde sequitur, maximos æstus maris esse debere circa initia Veris & Autumni.

L III.  
*Cur aer &  
aqua semper  
ab Oriente  
in Occiden-  
tem fluant.*

Præterea notandum est, dum Terram fertur ab E per F versus G, sive ab Occidente in Orientem, aquæ tumorem 4 1 2, itemque æris tumorem 8 5 6, qui nunc parti Terræ E incumbunt, paulatim ad alias ejus partes magis Occidentales migrare; ita ut post sex horas incumbant parti Terræ H, & post horas duodecim parti Terræ G. Idemque etiam de tumoribus aquæ & æris 2 3 4 & 6 7 8 est intelligendum. Vnde fit, ut aqua & aer ab Orientalibus Terræ partibus in ejusdem partes Occidentales fluxu continuo ferantur.

NB.  
Vide fig.  
pag. præc.

L IV.  
*Cur in æ-  
dem poli al-  
titudine re-  
giones que  
mare ha-  
bent ad O-  
rientem, sint  
aliis magis  
temperatæ.*

Qui flexus, licet non admodum celer, manifeste tamen deprehenditur ex eo, quod magnæ navigationes sint multo tardiores & difficiliore versus partes Orientales quam versus Occidentales; & quod in quibusdam maris angustiis aqua semper fluat versus occasum; & denique quod cæteris partibus, eæ regiones quæ Mare habent in Oriente, ut Brasilia, non tantum Solis calorem sentiant, quam eæ quæ longos terræ tractus habent ad Orientem & Mare ad Occidentem, ut Guinea: quoniam, aer qui à Mari venit, frigidior est, quam qui à Terra.

L V.  
*Cur nullus*

Notandum denique, totam quidem Terram mari non tegi, ut paullo

paullo ante assumpsimus, sed tamen, quia Oceanus per omnem ejus ambitum se diffundit, idem de illo quantum ad generalem aquarum motum esse intelligendum, ac si totam involveret. Lacus autem & stagna, quorum aquæ ab Oceano sunt disjunctæ, nullos ejusmodi motus patiuntur: quia eorum superficies tam latæ non sunt, ut multo magis in una parte quam in alia, ob Lunæ præsentiam, à materia cœlesti premantur. Atque propter inæqualitatem sinuum & anfractuam, quibus cingitur Oceanus, ejus aquarum incrementa & decrementa diversis horis ad diversa litora perveniunt, unde innumera eorum varietates oriuntur.

Quarum omnium varietatem causæ particulares deduci poterunt ex dictis, si consideremus, aquas Oceani, cum Luna nova est vel plena, in locis à litoribus remotis versus Eclipticam & Aequatorem hora sexta, tam matutina, quam vespertina, esse altissimas, & ideo versus litora fluere; hora autem duodecima esse maxime depressas, & ideo à litoribus ad illa loca refluere: ac prout litora sunt vicina vel remota, prout aquæ ad ipsa tendunt per vias magis rectas & obliquas, latas vel angustas, profundas vel vadosas, ad ipsa, citius aut tardius, & in majore aut minore copia deferri; Ac etiam, propter admodum varios & inæquales eorum anfractus, sæpe contingere, ut aquæ, versus unum litus tendentes, iis quæ ab alio litore veniunt occurrant, utque ita earum cursus diversimode mutetur: Ac denique varios ventos, & quorum nonnulli quibusdam in locis ordinarii sunt, istas aquas diversis modis impellere. Nihil enim puto ullibi observari circa fluxum & refluxum maris, cujus causæ in his paucis non contineantur.

Circa terram interiorem **C**, notare licet, eam constare particulis cujusvis figuræ, ac tam crassis, ut globuli secundi elementi ordinario suo motu eas secum non abripiant, sed tantum deorsum premendo graves reddant, ac per meatus, qui plurimi inter ipsas reperiuntur, transeundo, non nihil commoveant. Quod etiam facit materia primi elementi, eos ex istis meatibus, qui angustissimi sunt, replens: ac idem faciunt particule terrestres superiorum corporum **D** & **E**, quæ sæpe in eos qui sunt omnium latissimi descendunt, atque inde nonnullas ex crassis hujus corporis particulis secum abducunt. Quippe credibile est, superiorem ejus superficiem constare partibus ramosis, sibi quidem mutuo valde firmiter annexis; utpote quæ, dum hoc corpus formaretur, im-

*fit fluxus  
nec refluxus  
in lacubus  
aut stagnis:  
& est in  
varius litori-  
bus variis  
horis fiat.*

LVI.

*Quomodo  
ejus causæ  
particula-  
res in sin-  
gulis litori-  
bus sint in-  
vestigandæ.*

LVII.

*De natura  
Terræ inter-  
ioris*


petum globulorum cœlestium, per corpora B & D discurrentium, primæ sustinuerunt & frererunt; sed inter quas nihilominus permul-  
ta sunt intervalla satis lata, ut per ipsa particulæ aquæ dulcis, & salis,  
nec non etiam aliæ angulosæ aut ramosæ, ex corpore E delapsæ,  
transire possint.

LVIII.  
*De natura  
argenti vivi.*

Verum infra istam superficiem partes corporis C minus arcte  
sibi mutuo adhærent; ac etiam, forte in quadam ab ipsa distantia,  
multæ simul sunt congregatæ, quæ figuras habent tam teretes & tam  
læves, ut, quamvis ob gravitatem suam sibi mutuo incumbant, nec,  
quemadmodum aquæ partes, globulos secundi elementi undique  
circa se fluere permittant, facile tamen agitentur, tum à minuti-  
oribus ex istis globulis, qui nonnulla etiam spatia inter ipsas in-  
veniunt, tum præcipue à materia primi elementi, quæ omnes angu-  
stissimos angulos ibi relictos replet. Atque ideo liquorem com-  
ponunt valde ponderosum & minime pellucidum; cujusmodi est  
argentum vivum.

LIX.  
*De inæqua-  
litate calu-  
ris interio-  
rem Terram  
pervadentis.*

Præterea, quemadmodum videmus, eas maculas, quæ quotidie  
circa Solem generantur, figuras habere admodum irregulares & va-  
rias, ita existimandum est, mediam Terræ regionem M, quæ ex  
materia istis maculis simili conflata est, non ubique esse æqualiter  
densam; & ideo quibusdam in locis transitum præbere majori copię



primi elementi, quam in reliquis; atque hanc materiam primi ele-  
menti, per corpus C transcuntem, ejus partes quibusdam in locis  
fortius



fortius quam in aliis commovere: sicut etiam calor, à Solis radiis excitatus, atque, ut supra dictum est, usque ad intima Terræ pertinens, non uniformiter agit in hoc corpus C, quia facilius ei communicatur per fragmenta corporis E, quam per aquam D; atque altitudo montium efficit, ut quædam Terræ partes, Soli obversæ, multo magis incallescant, quam ab illo averisæ; ac denique aliter incallescunt versus Æquatorem, aliter versus polos, calorque iste per vices variatur propter vicissitudinem tum diei & noctis, tum præcipue æstatis & hyemis.

Vnde fit, ut omnes particulæ hujus terræ interioris C, semper aliquantulum, & modo plus modo minus, moveantur; non eæ solum quæ vicinis non annexæ sunt, ut particulæ argenti vivi, & salis, & aquæ dulcis, & aliæ quævis in majoribus ejus meatibus contentæ; sed etiam eæ quæ sunt omnium durissimæ, ac sibi in tuto quam firmissime adherent. Non quidem quod hæ ab invicem plane separentur; sed eodem modo quo videmus arborum ramos, ventis impulsos, agitari, & eorum intervalla nunc majora reddi, nunc minora, quamvis istæ arbores idcirco radicibus suis non evellantur; ita putandum est, crassas & ramosas corporis C particulas ita connexas esse atque implexas, ut non soleant vi caloris ab invicem plane disjungi, sed aliquantulum duntaxat concutiantur, & meatus circa se relictos modo magis, modo minus aperiant. Cumque duriores sint aliis particulis, ex superioribus corporibus D & E in meatus istos delapsis, ipsas facile motu isto suo contundunt & compingunt, sicque ad duo genera figurarum reducant; quæ hic sunt consideranda.

Nempe particulæ quarum materia paullo solidior est, quales sunt salis, meatibus istis interceptæ, atque contusæ, ex teretibus & rigidis planæ ac flexiles redduntur: non aliter quam ferri candentis virga rotunda crebris malleorum ictibus in laminam oblongam potest complanari: cumque interim hæ particulæ, vi caloris actæ, hinc inde per meatus istos serpent, duris eorum parietibus allisæ, atque affricatæ, gladiolorum instar acuuntur, sicque in succos quosdam acres, acidos, erodentes vertuntur: qui succi postea cum metallica materia concretescentes, atramentum sutorium; cum lapidea, alumen; & sic alia multa componunt.

Particulæ autem molliores, quales sunt pleræque ex terra exteriori E delapsæ, nec non etiam eæ aquæ dulcis, ubi penitus elisæ, tam tenues evadunt, ut motu materiæ primi elementi discerpantur,

LX.  
*De istius caloris actione.*

LXI.  
*De succis acris & acidis, ex quibus sunt atramentum sutorium, alumen, &c.*

LXII.  
*De materia oleaginea bituminis, sulphuris, &c.*

atque in multos minutissimos & quam maxime flexiles ramulos dividantur, qui ramuli, terrestribus aliis particulis adherentes, componunt sulphur, bitumen, & alia omnia pinguia sive oleaginea, quæ in fodinis reperiuntur.

LXIII.  
*De Chymicarum principis; & quomodo metalla in fodinas ascendant.*

Atque sic tria hic habemus, quæ pro tribus vulgatis Chymicorum principis, Sale, Sulphure ac Mercurio, sumi possunt, sumendo scilicet succum acrem pro sale, mollissimos ramulos oleagineæ materiæ pro sulphure, ipsumque argentum vivum pro illorum Mercurio. Credique potest, omnia metalla ideo tantum ad nos pervenire, quod acres succi, per meatus corporis C fluentes, quasdam ejus particulas ab aliis disjungant, quæ deinde materia oleaginea involutæ, atque vestitæ, facile ab argento vivo calore rarefacto sursum rapiuntur, & pro diversis suis magnitudinibus ac figuris diversa metalla constituunt. Quæ fortasse singula descripsissem hoc in loco, si varia experimenta, quæ ad certam eorum cognitionem requiruntur, facere hæcenus licuisset.


LXIV.  
*De Terra exteriori, & de origine fontium.*

Iam vero consideremus terram exteriorem E; cujus fragmenta quædam sub mari delitescunt, alia in campos extenduntur, alia in montes attolluntur. Et notemus in primis, quam facile in ea possit intelligi, quo pacto fontes & flumina oriuntur; & quamvis semper in mare fluant, nunquam tamen ipsorum aqua deficiat, nec mare augetur aut dulcescat. Quippe cum infra campos & montes magnæ sint cavitates aquis plenæ, non dubium est, quin multi quotidie vapores, hoc est, aquæ particule, vi caloris ab invicem disjunctæ, ac celeriter motæ, utque ad exteriorem camporum superficiem, atque ad summa montium juga, perveniant. Videamus enim, etiam plerisque istiusmodi vapores ulterius usque ad nubes attolli; ac facilius per terræ meatus ascendunt, ab ejus particulis suffulti, quam per ærem, cujus fluidæ ac mobiles particule ipsos ita fulcire non possunt. Postquam autem isti vapores sic ascenderunt, frigore succedente torpescunt, & amissa vaporis forma rursus in aquam vertuntur; quæ aqua descendere non potest per eosdem illos meatus, per quos vapor ascendit, quia sunt nimis angusti; sed aliquanto latiores vias invenit, in intervallis crustarum sive corticum, quibus tota exterior terra conflata est; quæ viæ ipsam oblique secundum vallium & camporum declivitatem deducunt. Atque ubi istæ subterraneæ aquarum viæ, in superficie montis, vel vallis, vel campi terminantur, ibi fontes scaturiunt; quorum rivi multi simul congregati, flumina compon-

componunt, & per decliviores exterioris terræ superficiæ partes in mare labuntur.

Quamvis autem assidue multæ aquæ ex montibus versus mare fluant, nunquam tamen idcirco cavitates ex quibus ascendunt possunt exhauriri, nec mare augeri. Hæc enim terra exterior non potuit modo paullo ante descripto generari, nempe ex fragmentis corporis E, in superficiem corporis C cadentibus, quin aqua

LXV.  
*Cur mare non augetur ex eo, quod flumina in illud fluant.*



D multos sibi patentissimos meatus sub istis fragmentis retinuerit, per quos tanta semper ejus quantitas à mari versus radices montium redit, quanta ex montibus egreditur. Atque ita, ut animalium sanguis in eorum venis & arteriis, sic aqua in terræ venis & in fluviiis circulariter fluit.

Et quamvis mare sit salsum, solæ tamen aquæ dulcis particule in fontes ascendunt, quia nempe sunt tenues ac flexiles; particule autem salis cum sint rigidæ ac duræ, nec facile in vapores mutari, nec ullo modo per obliquos terræ meatus transire possunt. Et quamvis assidue ista aqua dulcis in mare per flumina revertatur, non ideo mare dulcescit, quia semper æqualis quantitas salis in eo manet.

LXVI.  
*Cur fontes non sint salsi, nec mare dulcescit.*

Sed tamen non valde mirabimur, si forte in quibusdam puteis, à mari valde remotis, multum salis reperiatur. Cuni enim terra multis rimis fatiscat, fieri facile potest, ut aqua salsa non percolata, usque ad illos puteos perveniat; sive quia maris superficiæ æque

LXVII.  
*Cur in quibusdam puteis aqua sit salsa.*



alta est atque ipsorum fundus; sive etiam, quia ubi viz sunt satis latæ, facile salis particulæ, à particulis aquæ dulcis, per corporis duri declivitate[m] sursum atolluntur. Ut experiri licet in vase, cujus labra nonnihil sint repanda, quale est ABC. dum enim aqua falsa in eo evaporatur, omnes

ejus oræ salis crustâ vestiri solent.

LXVIII.

*Cur etiam ex quibusdam montibus sal effodiatur.*

Atque hinc etiam potest intelligi, quo pacto in montibus nonnullis magnæ salis moles instar lapidum concreverint. Quippe aqua maris eo ascendente, ac particulis flexibilis aquæ dulcis ulterius pergentibus, solum sal in cavitatibus, quæ casu ibi fuerunt, remanet, ipsasque inplevit.

LXIX.

*De nitro, aliisque salibus à sale marino diversis.*

Sed & aliquando salis particulæ nonnullos salis angustos terræ meatus pervadunt, atque ibi nonnihil de figurâ & quantitate suâ dependentes, in nitrum, vel sal ammoniacum, vel quid simile mutantur. Quinetiam plurimæ terræ particulæ oblongæ, non ramosæ, ac satis rigidæ, ab origine suâ nitri & aliorum salium formas habuerunt. Neque enim in alio sitæ sunt eæ formæ, quàm quod illorum particulæ sint oblongæ, non flexiles, nec ramosæ, ac prout de cætero varæ sunt, varias salis species componunt.

LXX.

*De vaporibus, spiritibus, & exhalationibus, à terrâ interiore ad exteriori[m] adscendentibus.*

Præter vapores ex aquis sub terrâ latentibus eductos, multi etiam spiritus acres, & oleagineæ exhalationes, nec non vapores argenti vivi, aliorum metallorum particulas secum vehentes, ex terrâ interiori ad exteriori[m] adscendunt: atque ex diversis eorum misturis omnia fossilia componuntur. Per spiritus acres intelligo particulas succorum acrium, nec non etiam salium volatilium ab invicem se junctas, & tam celeriter se commoventes, ut vis qua in omnes partes moveri perseverant, prævaleat eorum gravitati. Per exhalationes autem intelligo particulas ramosas, tenuissimas, oleagineæ materiæ, sic etiam motas. Quippe in aquis, & aliis succis, & oleis, particulæ tantum repunt, sed in vaporibus, spiritibus, & exhalationibus, volant.

LXXI.

*Quomodo ex variis*

Et quidem spiritus majori vi sic volant, & facilius angustos quoque terræ meatus pervadunt, atque ipsis intercepti firmiter hærent, & ideo

& ideo duriora corpora efficiunt, quam exhalationes, aut vapores. Cumque permagna inter hæc tria sit diversitas, pro diversitate particularum ex quibus constant, multa etiam ex ipsis lapidum, aliorumque fossilium non transparentium genera oriuntur, cum in angustis terræ meatibus inclusa hærent, ipsiusque particulis permiscentur; & multa genera fossilium transparentium, atque gemmarum, cum in rimis & cavitatibus terræ primum in succos colliguntur, & deinde paulatim, maxime lubricis & fluidis eorum particulis abeuntibus, reliquæ sibi mutuo adhærescunt.

Sic etiam vapores argenti vivi, terræ rimulas & majusculos meatus perreptando, particulas aliorum metallorum sibi admistas in iis relinquunt, & ita illam auro, argento, plumbo, aliisque imprægnant; ipsique deinde ob eximiam suam lubricitatem ulterius pergunt, aut deorsum relabuntur; aut etiam aliquando ibi hærent, cum meatus per quos regredi possent, sulphureis exhalationibus impediuntur. Atque tunc ipsæ argenti vivi particulae, minutissimâ istarum exhalationum quasi lanugine vestitæ, minium componunt. Ac denique spiritus & exhalationes, nonnulla etiam metalla, ut æs, ferrum, stibium, ex terra interiore ad exteriorem adducunt.

Notandumque est, ista metalla fere tantum ascendere ex iis partibus terræ interioris, quibus fragmenta exterioris inimediate conjuncta sunt. Vt ex. gr. in hac figura, ex 5 versus v, quia per aquas evehî non possunt. Vnde fit, ut non passim omnibus in locis metalla reperiantur.

Notandum etiam, hæc metalla per terræ venas versus radices montium solere attolli, ut hic versus v, ibique potissimum congregari, quia ibidem terra pluribus rimis quàm in aliis locis fatiscit; & quidem in iis montium partibus, quæ Soli meridiano vel orienti obversæ sunt, magis quàm in aliis congregari, quia major ibi est calor, cujus vi attolluntur. Et ideo etiam in illis præsertim locis à fossoribus quæri solent.

Neque putandum est, ulla unquam fodiendi pertinacia usque ad interiorem terram posse perveniri: tum quia exterior nimis est crassa, si ad hominum vires comparetur; tum præcipue propter aquas intermedias, quæ eo majore cum impetu salirent, quo profundior esset locus, in quo primum aperirentur earum venæ, tossoresque omnes obruerent.

. Exha-

*eorum mi-  
stura, varia  
lapidum  
aliorumque  
fossilium ge-  
nera oriantur.*

LXXII.  
*Quomodo  
metalla ex  
terrâ inte-  
riore ad ex-  
teriorem  
perveniunt,  
& quomodo  
minium fiat.*

LXXIII.  
*Cur non in  
omnibus  
terræ locis  
metalla in-  
veniuntur.*

NB.  
Vide fig.  
pag. 162.

LXXIV.  
*Cur potissi-  
mum irve-  
niantur in  
radicibus  
montium,  
versus Me-  
ridiem &  
Orientem.*

LXXV.  
*Fodinas o-  
mnes esse in  
terrâ ex-  
teriore; nec  
posse un-  
quam ad  
interiorem  
fodiendo  
perveniri.*

LXXVI.  
De sulphu-  
re, bitumi-  
ne, argilla,  
oleo.

Exhalationum particulæ tenuissimæ, quales paullo ante descri-  
ptæ sunt, nihil nisi purum æreni solæ componunt, sed tenuioribus  
spirituum particulis facile annectuntur, illasque ex lævibus & lubri-  
cis ramosas reddunt; æ deinde hæ ramosæ, succis acribus ac metal-  
licis quibusdam particulis admistæ, sulphur constituunt; & admistæ  
particulis terræ, multis etiam ejusmodi succis gravidæ, faciunt bitu-  
men; & cum solis particulis terræ conjunctæ, faciunt argillam; &  
denique solæ in oleum vertuntur, cum earum motus ita languescit,  
ut sibi mutuo plane incumbant.

LXXVII.  
Quomodo  
fiat terræ  
motus.

Sed cum celerius agitantur, quam ut ita in oleum verti possint,  
si forte in rimas & cavitates terræ magna copia affluant, pingues ibi  
& crassos fumos componunt, non absumiles iis qui ex candela recens  
exstincta egrediuntur; ac deinde, si quæ forte ignis scintilla in istis  
cavitatibus excitetur, illi fumi protinus accenduntur, atque subi-  
to rarefacti, omnes carceris sui parietes magna vi concutiunt, præ-  
sertim cum multi spiritus ipsis sunt admisti: & ita oriuntur terræ  
motus.

LXXVIII.  
Cur ex qui-  
busdam  
montibus  
ignis erum-  
pat.

Contingit etiam aliquando, cum hi motus fiunt, ut parte terræ  
disjecta & aperta, flamma per juga montium cælum versus erumpat.  
Idque ibi potius fit, quam in humilioribus locis, tum quia sub  
montibus plures sunt cavitates, tum etiam, quia magna illa frag-  
menta, quibus constat terra exterior, in se invicem reclinata,  
faciliorem ibi præbent exitum flammæ, quam in ullis alijs locis.  
Et quamvis claudatur terræ hiatus, simul ac flamma hoc pacto ex  
eo erupit; fieri potest, ut tanta sulphuris aut bituminis copia ex  
montis visceribus ad ejus summitatem expulsa sit, ut ibi longo in-  
cendio sufficiat. Novique fumi postea, in iisdem cavitatibus rur-  
sus collecti, & accensi, facile per eundem hiatum erumpunt;  
unde fit, ut montes nonnulli crebris ejusmodi incendijs sint infam-  
es, ut Ætna Siciliæ, Vesuvius Campaniæ, Hecla Islandiæ, &c.

LXXIX.  
Cur plures  
concussiones  
ferri soleant  
in terræ mo-  
tu: Sicutque  
per aliquot  
horas aut  
dies inter-  
dum duret.

Denique, durat aliquando terræ motus per aliquot horas, aut  
dies; quia non una tantum continua cavitas esse solet, in qua pingues  
& inflammares fumi colliguntur, sed plures diversæ, terra multo  
sulphure aut bitumine saturata disjunctæ; cumque exhalatio in unis  
accensa, terram semel concussit, aliqua mora intercedit, prius-  
quam flamma per meatus sulphure oppletos ad alias possit per-  
venire.

LXXX.  
De natura

Sed hîc superest ut dicam, quo pacto in istis cavitatibus flamma  
possit

possit accendi, simulque ut explicem ignis naturam. Particulæ terrestres, cujuscunque sint magnitudinis aut figuræ, cum singulæ seorsim primi elementi motum sequuntur, ignis formam habent; ut etiam habent aëris formam; cum inter globulos secundi elementi volitantes, eorum agitationem imitantur. Sicque prima & præcipua inter aërem & ignem differentia est, quod multo celerius hujus quam illius particulæ agitentur. Iam enim supra satis ostensum est, motum materiæ primi elementi, multo celeriolem esse quam secundi. Sed alia etiam est permagna differentia, quod etsi crassiores tertii elementi particulæ, quales sunt ex quibus constant vapores argenti vivi, possint aëris formam induere, non tamen ad ejus conservationem sint necessariæ, ac contra ille purior sit, minusque corruptioni obnoxius, cum solis minutissimis particulis constat. Crassiores enim, nisi calore continuo agitentur, pondere suo deorsum labentes, sponte exuunt ejus formam. Ignis autem, sine crassiusculis corporum terrestrium particulis quibus alatur & renovetur, esse non potest.

Cum enim globuli secundi elementi, occupent omnia intervalla circa Terram, quæ satis magna sunt ad illos capiendos, & sibi mutuo omnes ita incumbant, ut uni absque aliis moveri non possint, (nisi forte circulariter circa proprium axem) quamvis materia primi elementi, omnes exiguos angulos à globulis istis relictos replens, in ipsis quam celerrime moveatur, si tamen non habeat plus spatii, quam quod in istis angulis continetur, non potest ibi habere satis virium, ad particulas terrestres, quæ omnes à se mutuo & à globulis secundi elementi sustinentur, secum rapiendas, nec proinde ad ignem generandum. Sed ut ignis alicubi primum excitetur, debent aliqua vi expelli globuli cælestes, ab intervallis nonnullarum particularum terrestrium, quæ deinde ab invicem disjunctæ, atque in sola materia primi elementi natantes, celerrimo ejus motu rapiantur, & quaquaversus impellantur.

Vtque ille ignis conservetur, debent istæ particulæ terrestres esse satis crassæ, solidæ, atque ad motum aptæ, ut à materia primi elementi sic impulsæ, vim habeant globulos cælestes à loco illo in quo est ignis, & in quem redire parati sunt, repellendi, atque ita impediendi, ne globuli isti rursus ibi occupent intervalla primo elementi relictæ, sicque vires ejus frangendo ignem extinguant.

Ac præterea particulæ terrestres, in globulos istos impingentes,

Y


non

LXXXIII.  
Cui egeat  
alimento.LXXXI.  
Quomodo  
primum  
excitetur.LXXXII.  
Quomodo  
conservetur.

non possunt ab iis impediri, ne ulterius pergant, & egrediendo ex eo loco in quo primum elementum suas vires exercet, ignis formam amittant, abeantque in fumum. Quapropter nullus ibi ignis diu remaneret, nisi eodem tempore aliquæ ex istis particulis terrestribus, in aliquod corpus aëre crassius impingendo, alias satis solidas particulas ab eo disjungerent, quæ, prioribus succedentes, & à materia primi elementi abreptæ, novum ignem continuo generarent.

LXXXIV.  
Quomodo  
ex silicibus  
excusantur.

Sed ut hæc accuratius intelligantur, consideremus primo varios



modos quibus ignis generatur, deinde omnia quæ ad ejus conservationem



tionem requiruntur, ac denique, quales sint ejus effectus. Nihil usitatus est, quam ut ex silicibus ignis excutiat; hocque ex eo fieri existimo, quod silices sint satis duri & rigidi, simulque satis friabiles. Et hoc enim quod sint duri & rigidi, si percutiantur ab aliquo corpore etiam duro, spatia quæ multas eorum particulas interjacent, & à globulis secundi elementi solent occupari, solito sunt angustiora, & ideo isti globuli ex silire coacti, nihil præter solam materiam primi elementi circa illas relinquunt; deinde ex eo quod sint friabiles, simul ac istæ silicem particulæ non amplius ictu premuntur, ab invicem dissiliunt, sicque materiæ primi elementi, quæ sola circa ipsas reperitur, innatantes, ignem componunt. Ita si **A** flex, inter cujus anteriores particulas globuli secundi elementi conspicui sunt, **B** repræsentabit eundem silicem, cum ab aliquo corpore duro percutitur, & ejus meatus angustiores facti, nihil amplius nisi materiam primi elemti possunt continere; **C** vero eundem jam percussum, cum quædam ejus particulæ ab eo separatæ, ac solam materiam primi elementi circa se habentes, in ignis scintillas sunt conversæ.

Si lignum, quantumvis siccum, hoc pacto percutiatur, non idcirco scintillas ita emittet, quia cum non adeo durum sit, prima ejus pars quæ corpori percutienti occurrit, flectitur versus secundam; eamque attingit, priusquam hæc secunda flecti incipiat versus tertiam. Sicque globuli secundi elementi non eodem tempore ex multis eorum intervallis, sed successive nunc ex uno, nunc ex alio discedunt. Atqui si hoc lignum aliquandiu & satis valide fricetur, inæqualis ejus particularum agitatio & vibratio, quæ oritur ex ista frictione, potest ex pluribus earum intervallis globulos secundi elementi excutere, simulque ipsas ab invicem disjungere, atque ita in ignem mutare.

Accenditur etiam ignis ope speculi concavi, vel vitri convexi, multos Solis radios versus eundem aliquem locum dirigentis. Quamvis enim istorum radiorum actio globulos secundi elementi pro subjecto suo habeat, multo tamen concitator est ordinario eorum motu. & cum procedat à materia primi elementi, ex qua Sol est conflat, satis habet celeritatis ad ignem excitandum; radiique tam multi simul colligi possunt, ut satis etiam habeant virium ad particulas corporum terrestrium eadem ista celeritate agitandas.

LXXXV.  
*Quomodo  
ex lignis  
scintillæ  
excipiuntur.*

LXXXVI.  
*Quomodo  
ex collectione  
radiorum  
Solis.*

LXXXVII.

*Quomodo  
à solo motu  
valde vio-  
lento.*

Quippe nihil refert, à qua causa particulæ terrestres celerissime moveri primum incipient. Sed quamvis antea fuerint sine motu, si tantum innatent materiæ primi elementi, ex hoc solo protinus celerissimam agitationem acquirunt: eadem ratione qua navis, nullis funibus alligata, in aqua torrente esse non potest, quin simul cum ipsa feratur. Et quamvis eæ terrestres particulæ nondum primo elemento sic innatent, si tantum à qualibet alia causa satis celeriter agitentur, hoc ipso se mutuo, & globulos secundi elementi circa se positos, ita excutient, ut statim ei innatare incipient, & porro ab illo in motu suo conservabuntur. Quamobrem omnis motus valde concitatus sufficit ad ignem excitandum. Et talis in fulmine ac turbinibus solet reperiri, cum scilicet nubes excelsa, in aliam humiliorem ruens, aërem interceptum explodit; ut in Meteoris explicui.

LXXXVIII.

*Quomodo  
à diverso-  
rum corpo-  
rum mistu-  
ra.*

Quamquam sane vix unquam iste solus motus ibi est ignis causa: nam fere semper aëri admiscentur exhalationes, quarum talis est natura, ut facile vel in flammam, vel saltem in corpus lucidum vertantur. Atque hinc ignes fatui circa Terram, & fulgetræ in nubibus, & stellæ trajicientes & cadentes in alto aëre, excitantur. Quippe jam dictum est, exhalationes constare particulis tenuissimis, & in multos quasi ramulos divisas, quibus involutæ sunt aliæ paullo crassiores, ex succis acribus aut salibus volatilibuseductæ. Notandumque est, hos ramulos solere esse tam iminutos & confertos, ut nihil per illorum interstitia, præter materiam primi elementi, transire possit; inter particulas autem istis ramulis vestitas, esse quidem alia majora intervalla, quæ globulis secundi elementi solent impleri, tuncque exhalatio non ignescit; sed interdum etiam accidere, ut occupentur à particulis alterius exhalationis aut spiritus, quæ inde secundum elementum expellentes, primo duntaxat locum relinquunt; ejusque motu protinus abreptæ flammam componunt.

LXXXIX.

*In fulmine,  
in stellis tra-  
jicientibus.*

Et quidem in fulmine, vel fulgetris, causa quæ plures exhalationes simul compingit, manifesta est, propter unius nubis in aliam lapsum. In aëre autem tranquillo, una exhalatione frigore densata & quiescente, facile alia, ex loco calidiori adveniens, aut particulis ad motum aptioribus constans, aut etiam aliquo leni vento impulsata, in ejus poros impetum facit, atque ex iis secundum elementum expellit: cumque particulæ prioris exhalationis nondum

tam

tam arcte simul junctæ sunt, quin hoc aliarum impetu disjungi possint, hoc ipso in flammam erumpunt: qua ratione stellas trajicientes accendi puto.

Cum autem exhalationis particulæ, in corpus tam crassum & viscidum coaluerunt, ut non ita disjungantur, lucem duntaxat aliquam emittunt, similem illi quæ in lignis putridis, in piscibus sale conditis, in guttis aquæ marinæ, & similibus, solet apparere. Ex hoc enim solo, quod globuli secundi elementi, à materia primi pellantur, sit lumen, ut ex supra dictis satis patet. Cumque plurium particularum terrestrium simul junctarum intervalla tam angusta sunt, ut soli primo elemento locum dent, etsi forte hoc primum elementum non satis habeat virium ad ipsas disjungendas, facile tamen habet satis ad globulos secundi elementi circumjacentes, actione illa quam pro lumine sumendam esse diximus, impellendos. Et tales puto esse stellas cadentes. sæpe enim earum materia, humi delapsa, viscida & tenax esse deprehenditur; quanquam sane non sit certum, fuisse illam ipsam viscidam materiam, quæ habuit lucem; potuit enim esse aliqua tenuis flamma ei adhærens.

At in guttis aquæ marinæ, cujus naturam supra explicuimus, facile est videre quo pacto lux excitetur: nempe dum illæ earum particulæ quæ sunt flexiles, sibi mutuo manent implexæ, aliæ quæ sunt rigidæ ac læves, vi tempestatis, alteriusve cujuslibet motus, ex gutta excutiuntur, & spiculorum instar vibratæ, facile ex ejus vicinia globulos secundi elementi expellunt, sicque lucem producunt. In lignis autem putridis, & piscibus qui siccati incipiunt, & talibus, non aliunde lucem oriri puto, quam quod in iis, dum sic lucent, multi sint meatus tam angusti, ut solum primum elementum admittant.

Quod vero alicujus spiritus aut liquoris particulæ, meatus corporis duri, vel etiam liquidi, subeundo, ignem aliquando possint extare, ostendunt fœnum madidum alicubi conclusum, calx aqua aspersa, fermentationes omnes, liquoresque non pauci Chymicis noti, qui dum inter se permiscentur, incallescunt, ac etiam aliquando inflammantur. Non enim alia ratio est cur fœnum recens, si recondatur antequam sit siccum, paulatim incalescat, flammamque sponte concipiat, quam quod multi spiritus vel succi, per herbarum viridum poros ab earum radicibus versus summitates fluere assueti, atque ibi vias ad mensuram suam accommodatas

XG.  
*In iis quæ  
lucent &  
non urunt:  
ut in stellis  
cadentibus.*

XCI.  
*In guttis  
aque mari-  
næ, in li-  
gnis putri-  
dis, & simi-  
libus.*

XCII.  
*In iis quæ  
incallescunt  
& non lu-  
cent: ut in  
fœno inclu-  
so.*

habentes, mancant aliquandiu in herbis excisis; quæ si interim angusto loco includantur, particulæ istorum succorum, ex unis herbis in alias migrantes, multos meatus in ipsis jam siccati incipientibus inveniunt, paulo angustiores, quam ut illos simul cum globulis secundi elementi subire possint; ideoque per illos fluentes, sola materia elementi circumdantur, à qua celerrime impulsæ, ignis agitationem acquirunt. Ita, exempli causa, si spatium quod est inter duo corpora B & C, repræsentet unum ex meatibus alicujus herbæ virentis; ac funiculi 1 2 3 exiguis orbiculis circumdati, fumantur pro particulis succorum sive spirituum à globulis secundi elementi per ejusmodi meatus vehi solitis; spatium autem inter corpora D & E, sit alius meatus angustior herbæ siccæ, quem subeuntes eædem particulæ 1 2 3, non amplius secundum ele-



mentum, sed primum duntaxat circa se habere possint; Perficuum est, ipsas inter B & C motum inoderatum secundi elementi, sed inter D & E motum celerrimum primi sequi debere. Nec refert, quod per exigua tantum quantitas istius primi elementi circa ipsas reperitur. Satis enim est, quod ipsi totæ innant: quemadmodum videmus, navem, secundo fluminis delabentem, non minus facile ipsius cursum sequi, ubi tam angustum est, ut ejus ripas utriusque fere attingat, quam ubi est latissimum. Sic autem celeriter motæ, multo plus habent virium ad particulas eorum circumjacentium concutiendas, quam ipsum primum elementum: ut navis etiam in pontem aliumve obicem impingens, fortius illum quatit quam aqua fluminis, à quo defertur. Et idcirco in duriores scæni particulas irruendo, facile ipsas separant ab invicem, præsertim cum plures simul à diversis partibus in eandem ruunt; cumque satis multas hoc pacto disjungunt, secumque abducunt, sit ignis; cum autem concutiunt duntaxat, nondumque habent vim multas simul ab invicem disjungendi, lente tantum scænum calefaciunt & corumpunt.

XCIH.  
In calce a-  
qua dispersa,  
& reliquis.

Eadem ratione credere licet, cum lapis excoquitur in calcem, multos ejus meatus, solis antea globulis secundi elementi pervios, adeo laxari, ut aquæ particulas, sed primo tantum elemento cinctas, admittant. Atque, ut hîc omnia simul complectar, quoties aliquod

aliquod corpus durum admiftione liquoris alicujus incalefcit, exiftimo, id ex eo fieri, quod multi ejus meatus fint talis menfuræ, ut ifti liquoris particulas, folâ materiâ primi elementj cinctas, admittant. Nec difparem rationem eſſe puto, cum unus liquor alteri liquori affunditur: ſemper enim alteruter conſtat particulis ramofis, aliquo modo implexis & nexis; atque ita corporis duri vicem ſubit; ut de ipſis exhalationibus paullo ante intellectum eſt.

His autem omnibus modis, non tantum in terræ ſuperficie, ſed etiam in ejus cavitatibus, ignis poteſt accendi. Nam ibi ſpiritus acres craſſarum exhalationum meatus ita poſſunt pervadere, ut in iis flammam accendant; & faxorum aut ſilicum fragmenta, ſecreto aquarum lapſu aliſve cauſis exefa, ex cavitatum fornicibus in ſubſtratum ſolum decidendo, tum aërem interceptum magnâ vi poſſunt explodere, tum etiam ſilicum collisione ignem excitare; atque ubi ſemelunum corpus flammam concepit, facile ipſam etiam aliis vicinis corporibus, ad eam recipiendam aptis, communicat. Flammæ enim particulæ iſtorum corporum particulis occurrentes, ipſas movent, & ſecum abducunt. Sed hoc non tam ſpectat ad ignis generationem, quàm ad ejus conſervationem; de qua deinceps eſt agendum.

Conſideremus exempli cauſa candelam accenſam AB, putemusque, in omni ſpatio CDE, per quod ejus flamma ſe extendit, multas quidem volitare particulas ceræ, vel cujuſlibet alterius materiæ oleagineæ, ex qua hæc candela conſtata eſt, multoſque etiam globulos ſecundi elementj, ſed tam hos quàm illos materiæ primi elementj ſic innatare, ut ejus motu rapiantur; & quamvis ſe mutuo sæpe tangant, & impellant, non tamen omni ex parte ſuffulciant, quemadmodum ſolent aliis in locis, ubi nullus eſt ignis.

Materia autem primi elementj, quæ magna copia in hac flamma reperitur, ſemper conatur egredi ex loco in quo eſt, quia celerrime movetur; & quidem egredi ſurſum verſus; hoc eſt, ut ſe removeat à centro Terræ, quia, ut ſupra dictum eſt, ipſis globulis cœleſtibus, aëris meatus occupantibus, eſt levior; & tum hi globuli, tum omnes particulæ terreſtres aëris circumjacentis, deſcendere conantur in ejus locum, ideoque protinus flammam ſuffocarent, ſi ſolo primo elemento conſtaret. Sed particulæ terreſtres, ab ellychnio FG aſſidue egredientes, ſtatim atque primo elemento immerſæ ſunt, ejus curſum ſequuntur, & occurrentes iis aëris particulis,

XCIV.

*Quomodo  
in cavitatibus terra  
ignis accendatur.*

XCV.

*Quomodo  
candela ardeat.*

NB.

Vide fig.  
pag. ſeq.

XCVI.

*Quomodo  
ignis in ea  
conſervetur.*

ticulis, quæ paratæ erant ad descendendum in locum flammæ, ipsas repellunt, sicque ignem conservant.

Cum autem hæc sursum versus præcipue tendant, fit, ut flamma soleat esse acuminata. Et quia multo celerius aguntur, quàm istæ particulæ aëris quas sic repellunt, non possunt ab iis impediri, quo minùs ulterius pergant versus H, ubi paulatim agitationem suam deponunt, sicque vertuntur in fumum.

Qui fumus nullum in toto aëre locum reperiret, quia nullibi vacuum est, nisi, prout egreditur ex flamma, tantundem aëris versus ipsam circulari motu regrederetur. Nempè dum fumus ascendit ad H, pellit inde aërem versus I, & K, qui aër, lambendo summitatem

candelæ B, ac radices ellychnii F, ad flammam accedit, eique alendæ inservit. Sed ad hoc non sufficeret, propter partium suarum tenuitatem, nisi multas ceræ particulas, calore ignis agitata, per ellychnium secum adduceret. Atque ita flamma debet assidue renovari, ut conservetur, & non magis eadem manet quàm flumen, ad quod novæ semper aquæ accedunt.

Motum autem circularem aëris & fumi licet experiri, quoties magnus ignis in cubiculo aliquo excitatur. Si enim cubiculum ita sit clausum; ut præter tubum camini per quem fumus exit, unum tantum aliquod foramen sit apertum, sentietur continuo magnus ventus, per hoc foramen ad focum tendens, in locum fumi abeuntis.

Atque ex his patet, ad ignis conservationem duo requiri. Primum, ut in eo sint particulæ terrestres, quæ à primo elemento impulsæ, vim habeant impediendi, ne ab aëre aliisve liquoribus supra ipsum positis suffocetur. Loquor tantum de liquoribus supra ignem positis; quia, cum solâ suâ gravitate versus illum ferantur, nullum periculum est, ne ab iis qui infra ipsum sunt, possit extingui. Sic flamma candelæ inversæ obruitur à liquore qui alias eam conservat; Et contra, ignes alii fieri possunt, in quibus sint particulæ

**XCVII.**

*Cur ejus flamma sit acuminata; & fumus ex ea egrediatur.*



**XCVIII.**

*Quomodo aër & alia corpora flammam alant.*

**XCIX.**

*De motu aëris versus ignem.*

**C.**

*De iis quæ ignem extinguunt.*

tiçulæ terrestres tam solidæ, tam multæ, ac tanto cum impetu vibratz, ut ipsam aquam affusam repellant, & ab ea exstingui non possint.

Alterum quod ad ignis conservationem requiritur, est, ut adhæreat alicui corpori, ex quo nova materia possit ad illum accedere in locum fumi abeuntis; ideoque istud corpus debet in se habere multas particulas satis tenues, pro ratione ignis conservandi; easque inter se, vel etiam aliis crassioribus ita junctas, ut impulsu particularum illius ignis, cum ab invicem, tum etiam à vicinis secundi elementi globulis se jungi possit, sicque in ignem converti.

CI.  
*Quid requiratur, ut aliquod corpus alendo igni aptum sit.*

Dico, particulas istius corporis esse debere satis tenues, pro ratione ignis conservandi. nam ex. ca. si vini spiritus linteo aspersus flammam conceperit, depascet quidem hæc flamma tenuissima totum istum vini spiritum, sed linteum quod alius ignis facile combureret, non attinget; quoniam ejus particulæ non sunt satis tenues, ut ab ea moveri possint.

CII.  
*Cur flamma ex spiritu vini linteum non urat.*

Et quidem spiritus vini facillime alit flammam, quia non constat, nisi particulis valde tenuibus; & quia in iis ramuli quidam sunt, tam breves quidem & flexiles, ut sibi mutuo non adhæreant; tunc enim spiritus in oleam verteretur, sed tales ut multa perexigua spatia circa se relinquunt, quæ non à globulis secundi elementi, sed à solâ materiâ primi possint occupari.

CIII.  
*Cur spiritus vini facillime ardeat.*

Contra autem aqua videtur igni valde adversa, quia particulis constat non modo crassiusculis, sed etiam lævibus & glabris; quo fit, ut nihil obstat, quominus globuli secundi elementi undique illas cingant & sequantur; atque insuper flexilibus; quo fit, ut facile subeat meatus corporum quæ uruntur, & ex iis ignis particulas arciendo, inpediat ne aliæ ignescant.

CIV.  
*Cur aqua difficillime.*

Sed tamen nonnulla corpora talia sunt, ut aquæ particulæ eorum meatibus immixtæ ignem juvent; quia inde cum impetu resilientes, ipsæ ignescunt. Ideo fabri carbonēs fossiles aqua aspergunt. Et aquæ parva copia, ingentibus flammis injecta, ipsas auget. Quod etiam salia potentius præstant; cum enim eorum particulæ rigidæ sint, & oblongæ, spiculatorum instar in flammâ vibrantur, & in alia corpora impingentes magnam vim habent ad ipsorum minutias concutiendas: unde fit, ut metallis liquefaciendis solcant adjungi.

CV.  
*Cur vis magnum ignium ab aqua aut salibus injectis augetur.*

Illæ autem quæ alendo igni communiter adhibentur, ut ligna, & simi-

CVI.  
*Qualia*

Z

& simi-

*sunt corpora  
qua facile uruntur.*

& similia, constant variis particulis, quarum quædam sunt tenuissimæ, aliæ paullo crassiores, & gradatim aliæ crassiores, & pleuræque sunt ramosæ, magnique meatus ipsas interjacent; quo fit ut ignis particulæ meatus istos ingressæ, primo quidem tenuissimas, ac deinde etiam mediocres, & earum ope crassiores, celerrime commoveant; sicque globulos cœlestes, primo ex angustioribus intervallis, ac deinde etiam ex reliquis, excutiant, ipsasque omnes (solis crassissimis exceptis, ex quibus cineres sunt) secum abripiant.

## CVII.

*Cur quædam in  
flammas, aliam non.*

Et cum ejusmodi particulæ, quæ ex corpore quod uritur, simul egrediuntur, sunt tam multæ ut vim habeant globulos cœlestes ex aliquo aëris vicini spatio expellendi, spatium illud flamma impent; si vero sint pauciores, fit ignis sine flamma: qui vel paulatim per formitis sui meatus serpit, cum materiam quam possit depascere, ibi nanciscitur: ut in istis funibus sive ellychniis quorum usus est in bello ad tormentorum pulverem incendendum.

## CVIII.

*Cur ignis aliquandiu  
in prunis se  
conseruet.*

Vel certe, si nullam talem materiam circa se habet, non conservatur, nisi quatenus inclusus poris corporis cui inhæret, tempore aliquo eget ad omnes ejus particulas ita dissolvendas, ut se ab iis possit liberare. Hocque videre est in carbonibus accensis, qui cineribus tecti, per multas horas ignem retinent, propter hoc solum, quod ille ignis insit quibusdam particulis tenuibus & ramosis, quæ aliis crassioribus implicatæ, quamvis celerrime agitentur, non tamen nisi unæ post alias egredi possunt; ac forte priusquam ita egrediantur, longo motu deteri, & singulæ in plures alias dividi debent.

## CIX.

*De pulvere  
tormentario ex sulphure,  
nitro & carbone  
confecto; ac primo  
de sulphure.*

Nihil vero celerius ignem concipit, nec minus diu illum conservat, quam pulvis tormentarius, ex sulphure, nitro, & carbone confectus. Quippe vel solum sulphur quàm-maxime inflammabile est, quia constat particulis succorum acrium, quæ tam tenuibus & spissis materiæ oleagineæ ramulis sunt involutæ, ut per multi meatus inter istos ramulos soli primo elemento pateant. Vnde fit, ut etiam ad usum medicinæ sulphur calidissimum censatur.

## CX.

*De nitro.*

Nitrum autem constat particulis oblongis & rigidis, sed in hoc à sale communi diversis, quod in una extremitate sint crassiores, quam in alia: ut vel ex eo patet, quod aquâ solutum, non ut sal commune, figurâ quadratâ in ejus superficie concreseat, sed vasis fundo & lateribus adhæreat.

Et



Et quantum ad magnitudinem particularum, putandum est, talem esse inter illas proportionem, ut ex succorum acrium, quæ sunt in sulphure, à primo elemento commotæ facillime globulos secundi ex intervallis ramulorum materiæ oleagineæ excutiant, simulque nitri particulas, quæ ipsis sunt crassiores, exagitent.

Atque hæc nitri particulae, quæ parte sunt crassiores, gravitate suâ deorsum tendunt, earumque ideo præcipuus motus est in parte acutiore. quæ sursum erecta, ut in

B, agitur in gyrum primo exiguum, ut in C; sed qui (nisi quid impediatur) statim fit major, ut in D; cum interim sulphuris particulae, celerime versus omnes partes latæ, ad alias nitri particulas brevissimo tempore perveniunt.



Et quoniam harum nitri particularum, singulae multum spatii exigunt ad circulos sui motus describendos, hinc fit, ut hujus pulveris flamma plurimum dilatetur: Et quia circulos istos describunt eâ cuspide, quæ sursum versus erecta est, hinc tota ejus vis tendit ad superiora: & cum valde siccus & subtilis est, innoxie in manu potest accendi.

Sulphuri autem & nitro carbō admiscetur, atque ex hac mistura, humore aliquo aspersa, granula sive pilulæ fiunt; quæ deinde exsiccantur. Quippe in carbone multi sunt meatus; tum quia plurimi antea fuerunt in corporibus, quorum ustione factus est, tum etiam quia, cum corpora ista urebantur, multum fumi ex eis evolavit. Et duo particularum genera duntaxat in eo reperiuntur: unum est crassiuscularum, quæ, cum solæ sunt, cineres componunt; aliud tenuiorum, quæ facile quidem ignescunt, quia jam ante ignis vi fuerunt commotæ, sed longis & multiplicibus ramis implexæ, non sine aliqua vi disjungi possunt, ut patet ex eo, quod aliis in fumum præcedente ustione abeuntibus, ipsæ ultimæ remanserunt.

Itaque facile sulphur & nitrum, latos carbonis meatus ingrediuntur, & ramosis ejus particulis involvuntur atque constringuntur; præsertim cum humore aliquo madefacta, & in grana, vel exiguas pilulas, compacta, postea siccantur. Hujusque rei usus est, ad efficiendum, ut nitri particulae, non tantum unæ post alias, sed multæ simul, uno & eodem temporis momento incendantur. Etenim cum primum ignis aliunde admotus, grani alicujus superficiem tan-

CXI.

De sulphuris &amp; nitri conjunctione.

CXII.

De motu particularum nitri.

CXIII.

Cur flamma hujus pulveris valde dilatetur, &amp; præcipue agat versus superiora.

CXIV.

De carbone.

CXV.

De granis hujus pulveris, &amp; in quo præcipue ipsius vis consistat.

git, non statim illud inflammat & dissolvit, sed tempore quodam illi opus est, ut ab ista grani superficie ad interiores ejus partes perveniat; ibique sulphure prius incenso, paulatim etiam nitri particulas exagitet, ut tandem ipsæ viribus assumtis, & majus spatium ad gyros suos describendos exigentes, carbonis vincula discerpant, totumque granum confringant. Et quamvis hoc tempus sit admodum breve si ad horas aut dies referatur; notandum tamen, esse satis longum, si comparetur cum summa illa celeritate, quæ granum ita dissiliens, flammam suam per totum aërem vicinum spargit. Nam cum ex. ca. in bellico tormento pauca quædam pulveris grana, ellychnii, alteriusve fomitis igne contacta, prima omnium accenduntur, flamma ex iis erumpens, in minimo temporis momento per omnia granorum circumjacentium intervalla dispergitur; ac deinde, quamvis non tam subito ad interiores ipsorum partes possit penetrare, quia tamen eodem tempore multa attingit, efficit ut multa simul incendantur & dilatentur, sicque magna vi tormentum explodant. Ita carbonis resistentia valde auget celeritatem, qua nitri particulae in flammam erumpunt; & granorum distinctio necessaria, ut satis magnos circa se habeant meatus, per quos flamma pulveris primum accensi, ad multas pulveris residui partes libere accedat.

CXVI.  
De lucernis  
diutissime  
ardentibus.

Post illum ignem, qui omnium minime durabilis est, consideremus, an dari possit aliquis alius, qui è contra sine ullo alimento diutissime perseveret. Ut narratur de lucernis quibusdam, quæ aliquando in hypogæis, ubi mortuorum corpora servabantur, post multos annos inventæ sunt accensæ. Nempe in loco subterraneo & arctissime clauso, ubi nullis vel minimis ventis aër unquam commovebatur, potuit fortasse contingere, ut multæ ramosæ fuliginis particulae circa flammam lucernæ colligerentur, quæ sibi mutuo incumbentes manerent inmotæ, atque ita exiguum quasi fornicem componentes, sufficerent ad impediendum, ne aër circumjacens istam flammam obrueret, ac suffocaret; nec non etiam ad ejusdem flammæ vim sic frangendam, & obtundendam, ut nullas amplius olei vel ellychnii particulas, si quæ adhuc residuæ erant, posset inflammare. Quo fiebat, ut materia primi elementi, sola ibi remanens, & tanquam in exigua quadam stella celerrime semper gyrans, undique à se repelleret globulos secundi, quibus solis, inter particulas compositæ fuliginis, transitus adhuc patebat, sicque lumen  
per

per totum conditorium diffunderet; exiguum quidem & subobscurum, sed quod externi aëris motu, cum locus aperiretur, facite vires posset resumere, ac fuligine discussa lucernam ardentem exhibere.

Nunc veniamus ad eos ignis effectus, qui nondum ex modis quibus oritur & conservatur, potuerunt agnosci; Quippe jam ex dictis patet, quomodo luceat, quomodo calefaciat, quomodo corpora omnia quibus alitur, in multas particulas dissolvat; nec non etiam, quomodo ex istis corporibus, primo loco maxime tenues & lubricæ, deinde aliæ non quidem forte prioribus crassiores, sed magis ramosæ atque implexæ particulæ egrediantur; eæ scilicet quæ caminorum parietibus adhærentes, fuliginem componunt; Solæque omnium crassissimæ in cineres remaneant. Sed superest ut breviter ostendamus, quo pacto ejusdem ignis vi quædam ex corporibus quibus non alitur, liquefcunt & bulliunt, alia siccantur & durefcunt, alia exhalantur, alia in calcem, alia in vitrum convertuntur.

Corpora omnia dura conflata ex particulis, quæ non multo difficilius unæ quam aliæ à vicinis suis separantur, & aliqua ignis vi possunt disjungi, dum istam vim patiuntur, liquefcunt. Nihil enim aliud est, liquidum esse, quam constare particulis à se mutuo disjunctis, & quæ in aliquo sint motu. Cumque tantus est istarum particularum motus, ut quædam ex ipsis in aërem vel ignem vertantur, sicque, solito plus spatii ad motum suum exigentes, alias expellant, corpora ista liquida effervescent & bulliunt.

Corpora autem quibus insunt multæ particulæ tenues, flexiles, lubricæ, aliis crassioribus aut ramosis intertextæ, sed non valde firmiter annexæ, igni adnota illas exhalant, hocque ipso siccantur. Nihil enim aliud est siccum esse, quam carere fluidis illis particulis, quæ cum simul sunt congregatæ, aquam aliumve liquorem componunt: Atque hæ fluidæ particulæ, durorum corporum meatibus inclusæ, illos dilatant, aliasque ipforum particulas motu suo concutiunt; quod eorum duritiem tollit, vel saltem imminuit: sed iis exhalatis, aliæ quæ remanent arctius jungi, & firmitus neci solent, sicque corpora durefcunt.

Et quidem particulæ quæ sic exhalantur, in varia genera distinguuntur. Nam primo, ut eas omittam quæ sunt adeo mobiles & tenues, ut solæ nullum corpus præter aërem constare possint, post

CXVII.

*De reliquis ignis effectibus.*

CXVIII.

*Quænam corpora illi adnotata liquefcant & bulliant.*

CXIX.

*Quænam siccantur & durefcant.*

CXX.

*De aquis ardentibus, inspidis, acidis.*

post ipsas omnium tenuissimæ, quæque facillime exhalantur, sunt illæ quæ Chymicorum vasis undique accurate clausis exceptæ, ac simul collectæ, componunt aquas ardentis, sive spiritus, quales ex vino, tritico, aliisque multis corporibus elici solent. Sequuntur deinde aquæ dulces, sive insipidæ, quales sunt eæ quæ ex plantis, aliisque corporibus destillantur. Tertio loco sunt aquæ erodentes & acidæ, sive succi acres, qui ex salibus non sine magna ignis vi educuntur.

CXXI. *De sublimatis & aleis.* Quædam etiam particulæ crassiores; quales sunt eæ argenti vivi; & salium, quæ valorum summitati adhærentes, in corpora dura concresecunt; satis magna vi opus habent, ut in sublime attollantur.

• Sed olea omnium difficillime ex duris & siccis corporibus exhalantur; idque non tam ignis vi, quam arte quodam perfici debet. Cum enim eorum particulæ tenues sint, & ramosæ, magna vis eas frangeret atque discerperet, priusquam ex istorum corporum meatibus educi possent. Sed iis affunditur aqua copiosa, cujus particulæ læves & lubricæ, nitatus istos pervadentes, paullatim illas integras eliciunt, ac secum abripiunt.

CXXII. *Quod multo ignis gradu mutat effectum.* Atque in his omnibus ignis gradus est observandus; eo enim variato, semper aliquo modo effectus variatur. Ita multa corpora, lento primum igni, ac deinde gradatim fortiori, admota, siccantur, & varias particulas exhalant: quales non emitterent, sed potius tota liquefcerent, si ab initio validis ignibus torquerentur.

CXXIII. *De calce.* Modus etiam ignem applicandi variat ejus effectum. Sic quædam, si tota simul incalescant, liquefiunt; sed si valida flamma ipsorum superficiem lambat, illam in calcem convertit. Quippe corpora omnia dura, quæ sola ignis actione in pulverem minutissimum reducuntur, fractis scilicet vel expulsis tenuioribus quibusdam eorum particulis, quæ reliquas simul jungebant, vulgo apud Chymicos dicuntur in calcem verti. Nec alia inter cineres & calcem differentia est, quam quod cineres sint reliquæ eorum corporum, quorum magna pars igne consumpta est, calx vero sit eorum, quæ fere tota post absolutam ustionem manent.

CXXIV. *De vitro, quomodo fiat.* Ultimus ignis effectus, est calcis & cinerum in vitrum conversio. Postquam enim ex corporibus, quæ uruntur, tenuiores omnes particulæ avulsæ ac rejectæ sunt, cæteræ quæ pro calce vel cineribus manent, tam solidæ sunt & crassæ, ut ignis vi sursum attolli non possint; figuræque habent ut plurimum irregulares & angulosas; unde

unde fit, ut unæ aliis incumbentes, sibi mutuo non adhæreant, nec etiam, nisi forte in minutissimis quibusdam punctis, se contingant. Cum autem postea validus & diuturnus ignis pergat in illas viam suam exercere, hoc est, cum tenuiores particulæ tertii elementi, una cum globulis secundi à materia primi abreptæ, celerrime circa ipsas in omnes partes moveri pergunt, paullatim earum anguli atteruntur, & superficies lævigantur, & forte etiam nonnullæ ex ipsis inflectuntur, sicque unæ super alias repentes, & fluentes, non punctis duntaxat, sed exiguis quibusdam superficiebus se contingunt, & hoc pacto simul connexæ vitrum componunt.

Quippe notandum est, cum duo corpora, quorum superficies aliquam latitudinem habent, sibi mutuo secundum lineam rectam occurrunt, ipsa non posse tam prope ad invicem accedere, quin spatium aliquod intercedat, quod à globulis secundi elementi occupetur; cum autem unum supra aliud oblique ducitur, vel repit, ea multo arctius jungi posse. Nam ex. ca. si corpora B & C sibi invicem occurrant secundum lineam AD, globuli cœlestes eorum superficiebus intercepti, contactum immediatum impediunt. Si au-

CXXV.  
*Quomodo  
ejus parti-  
cula simul  
jungantur.*



tem corpus G hinc inde moveatur supra corpus H, secundum lineam rectam EF, nihil impedit quominus immediate ipsum tangat; saltem si utriusque superficies sint læves & planæ; si autem sint rudes & inæquales, paullatim hoc ipso motu lævigantur & explanantur. Itaque putandum est, calcis & cinerum particulas ab invicem disjunctas, hic exhiberi per corpora B & C; particulas autem vitri, simul junctas, per corpora G & H. Atque ex hac sola diversitate, quam perspicuum est in illas, per vehementem & diuturnam ignis actionem, debere induci, omnes virri proprietates acquirunt.

Vitrum enim, cum adhuc candet, liquidum est, quia ejus particulæ facile moventur illa ignis vi qua jam ante fuerunt lævigatæ, atque inflexæ. Cum vero incipit refrigerari, quaslibet figuras potest induc-

CXXVI.  
*Cur sit li-  
quidum cum  
candet, om-  
nesque fi-  
guras facile  
induat.*

induere. Hocque omnibus corporibus igne liquefactis est commune; dum enim adhuc liquida sunt, ipsorum particulæ non ægre se accommodant ad quasilibet figuras, & cum postea frigore concrefcunt, easdem retinent, quas ultimo induerunt. Potest etiam in fila capillorum instar tenuia extendi, quia ejus particulæ jam concrefcere incipientes, facilius unæ supra alias fluunt, quam ab invicem disjungantur.

CXXVII.

*Cur, cum  
frigidum  
est, sit valde  
durum.*

Cum deinde vitrum plane refriguit, est valde durum, sed simul etiam valde fragile, atque eo fragilius quo citius refriguit. Nempe duritiei causa est, quod constat tantum particulis satis crassis & inflexilibus, quæ non ramulorum intextu, sed immediato contactu sibi invicem adhærent. Alia enim pleraque corpora ideo mollia sunt; quod eorum particulæ sint flexiles, vel certe desinant in ramulos quosdam flexiles, qui sibi mutuo annexi eas jungunt. Nulla autem duorum corporum firmior adhæsiō esse potest, quam ea quæ oritur ex ipsorum immediato contactu; cum scilicet ita se invicem tangunt, ut neutrum sit in motu ad se ab alio sejungendum; quod accidit vitri particulis, statim atque ab igne remotæ sunt; quia earum crassities, & contiguitas, & figuræ inæqualitas, impediunt, ne possint ab aëre circumjacente in eo motu, quo ab invicem disjungebantur, conservari.

CXXVIII.

*Cur valde  
fragile.*

At nihilominus vitrum est valde fragile, quia superficies secundum quas ejus particulæ se invicem tangunt, sunt admodum exiguæ ac paucæ. Multaque alia corpora molliora difficilius franguntur, quia eorum partes ita sunt intertextæ, ut separari non possint, quin ipsarum multi ramuli runipantur & evellantur.

CXXIX.

*Cur ejus  
fragilitas  
minuatur  
si lente re-  
frigeretur.*

Est etiam fragilius cum celeriter, quam cum lente refriguit: ejus enim meatus sunt satis laxi dum candet, quia tunc multa materia primi elementi, simul cum globulis secundi, ac etiam forte cum nonnullis ex tenuioribus tertii particulis, per illos transit. Cum autem refrigeratur sponte, redduntur angustiōres; quia soli globuli secundi elementi, per ipsos transeuntes, minus spatii requirunt; atque si refrigeratio nimis celeriter fiat, vitrum prius est durum, quam ejus meatus ita potuerint arctari; quo fit, ut globuli isti semper postea impetum faciant, ad ejus particulas ab invicem disjungendas; cumque hæ particulæ solo contactu suo junctæ sint, non potest una tantillum ab alia separari, quin statim aliæ plures, ei vicinæ secundum eam superficiem in qua ista separatio fieri cœpit, etiam

etiam separentur, atque ita vitrum plane frangatur. Quam ob causam, qui vitrea vasa conficiunt, ea gradatim ex fornacibus remouent, ut lente refrigerentur. Atque si vitrum frigidum igni apponatur, ita ut in una parte multo magis quam in aliis vicinis calefiat, hoc ipso in illa parte trangetur; quia non possunt ejus meatus calore dilatari, meatibus vicinarum partium immutatis, quin illa ab istis disjungatur. Sed si vitrum lento primum igni, ac deinde gradatim vehementiori admoveatur, & secundum omnes partes æqualiter incalescat, non frangetur, quia omnes ejus meatus æqualiter & eodem tempore laxabuntur.

Præterea vitrum est pellucidum, quia dum generatur liquidum est, & materia ignis, undique circa ejus particulas fluens, innumeros ibi meatus sibi excavat, per quos postea globuli secundi elementi libere transeuntes, actionem luminis in omnes partes secundum lineas rectas transferre possunt. Neque enim ad hoc necesse est, ut sint accurate recti, sed tantum, ut nullibi sint interrupti: Adeo ut si, ex. ca. fingamus, vitrum constare particulis accurate sphericis & æqualibus, sed tam crassis, ut globuli secundi elementi transire possint per spatium illud triangulare, quod inter tres se mutuo tangentes manere debet; vitrum illud erit plane pellucidum, quamvis sit inulto solidius omni eo, quod nunc habetur.

Cum autem materiæ ex qua fit vitrum, metalla vel alia corpora permiscetur, quorum particulae magis igni resistent, & non tam facile lævigantur, quam alia quæ ipsum componunt, hoc ipso fit minus pellucidum, & varios induit colores, prout istæ duriores particulae meatus ejus magis, aut minus, & variis modis, intercludunt.

Denique vitrum est rigidum: ita scilicet, ut non nihil quidem à vi externa flexi possit absque fractura, sed postea cum impetu resiliat, arcus instar, & redeat ad priorem figuram: ut evidenter apparet, cum in fila valde tenuia ductum est. Atque proprietas hoc pacto resiliendi, generaliter habet locum in omnibus corporibus duris, quorum particulae immediato contactu, non ramulorum intextu sunt conjunctæ. Cum enim innumeros habeant meatus, per quos aliqua semper materia movetur, quia nullibi vacuum est, & quorum figurae aptæ sunt ad liberum istius materiæ transitum præbendum, quia ejus ope antea formati fuerunt, talia corpora nullo modo flexi possunt, quin istorum meatuum figura nonnihil varietur. Quo fit,

CXXX.  
*Cur sit pellucidum.*

CXXXI.  
*Quomodo fiat coloratum.*

CXXXII.  
*Cur sit rigidum instar arcus; & generaliter, cur rigida, cum inflexa sunt, sponte redeant ad priorem figuram.*

ut particulæ materiæ, per illos transire aſſuetæ, vias ibi ſolito minus commodas inuenientes, impetum faciunt in eorum parietes, ad priorem figuram ipsis reddendam. Nempe ſi exempli cauſa in arcu laxo meatus, per quos tranſire ſolent globuli ſecundi elementi, ſint circulares, putandum eſt, eoſdem in arcu intenſo, ſive inflexo, eſſe ellipticos, & globulos per ipſos tranſire laborantes, impingere in eorum parietes ſecundum minores diametros iſtarum ellipſium, ſicque vim habere illis figuram circulareſtituendi. Et quamvis iſta vis in ſingulis globulis ſecundi elementi exigua ſit, quia tamen aſſidue quamplurimi per ejuſdem arcus quamplurimos poros meare conantur, illorum omnium vires ſimul junctæ, atque in hoc conſpirantes, ut arcum reducant, ſatis magnæ eſſe poſſunt. Arcus autem diu intentus, præſertim ſi ſit ex ligno, aliæ materia non admodum dura, vim reſiliendi paulatim amittit: quia ejus meatuum figuræ, longo attritu particularum materiæ per ipſos tranſcuntis, ſenſim ad earum menſuram magis & magis aptantur.

CXXXIII.  
De magnete. Repeſtito eorum ex ante diſſis, quæ ad ejus explicacionem requiruntur.

Hactenus naturas aëris, aquæ, terræ, & ignis quæ hujus globi quem incolimus, elementa vulgo cenſentur, ſimulque præcipuas eorum vires & qualitates explicare conatus ſum; ſequitur nunc, ut etiam agam de magnete. Cum enim ejus vis per totum hunc Terræ globum ſit diſfuſa, non dubium eſt, quin ad generalem ejus conſiderationem pertineat. Iam itaque reuocemus nobis in memoriam particulas illas ſtriatas primi elementi, quæ ſupra in tertiæ partis articulo 87, & ſequentibus, ſatis accurate deſcriptæ ſunt. Atque id omne, quod ibi ab articulo 105 ad 109 de ſidere I dictum eſt, de Terra hic intelligentes, putemus, eſſe multos meatus in mediâ ejus regione, axi parallelos, per quos particulæ ſtriatæ ab uno polo venientes, libere ad alium pergant, eoſque ad illarum menſuram ita eſſe excavatos, ut ii qui recipiunt particulas ſtriatas, à polo Auſtrali venientes, nullo modo poſſint recipere alias, quæ veniunt à polo Boreali; nec contra, qui recipiunt Boreales, Auſtrales admittant: quia ſcilicet in modum cochlearum intortæ ſunt, unæ in unam partem, aliæ in oppoſitam. Ac præterea etiam eaſdem particulas per unam tantum partem iſtorum meatuum ingredi poſſe, non autem regredi per aduerſam; propter tenuiſſimas quaſdam ramulorum extremitates, in ſpiris iſtorum meatuum inflexas verſus eam partem, ſecundum quam progredi ſolent, & ita in aduerſam partem aſſurgentes, ut ipſarum reſreſſum impediunt. Vnde ſit ut, poſtquam  
iſtæ



istæ particulæ striatæ per totam mediam Terram secundum lineas rectas, vel rectis æquipollentes, ejus axi parallelas, ab uno hemisphærio ad aliud transiverunt, ipsæ per ætherem circumfusum revertantur ad illud idem hemisphærium, per quod prius Terram ingressæ sunt, atque ita, rursus illam permeantes, quendam ibi quasi vorticem componant.

Et quoniam ex illo æthere, per quem particulas striatas ab uno polo ad alium reverti dixeramus, quatuor diversa corpora genita esse posse ostendimus; nempe Terræ crustam interiorem sive metallicam, aquam, terram exteriorem, & ærem: Notavimusque articulo 113 tertiæ partis, nulla, nisi in crassioribus istius ætheris particulis meatuum ad mensuram particularum striatarum efformatorum, vestigia manere potuisse: Advertendum est hoc in loco, istas omnes crassiores particulas ad interiorem Terræ crustam initio confluisse; nullasque in aqua nec in aëre esse posse; tum quia nullæ ibi particulæ satis crassæ; tum etiam quia, cum ista corpora fluida sint, ipsorum particulæ assidue situm mutant, & proinde si qui olim in iis fuissent tales meatus, cum certum & determinatum situm requirant, jamdudum istâ mutatione corrupti essent.

Ac præterea cum supra dictum sit, Terræ crustam interiorem constare partim ramosis particulis sibi mutuo annexis, partim aliis quæ per ramosarum intervalla hinc inde moventur, isti etiam meatus in his mobilioribus esse non possunt, propter rationem mox allatam, sed in ramosis duntaxat. Et quantum ad terram exteriorem, nulli quidem etiam in ea tales meatus initio fuerunt, quoniam inter aquam & ærem formata est: sed cum postea varia metalla ex terra interiore ad hanc exteriorem ascenderint, quantvis ea omnia, quæ ex mobilioribus & solidioribus illius particulis constata sunt, ejusmodi meatus habere non debeant, certe illud quod ex ramosis & crassis, sed non adeo solidis particulis constat, non potest iis esse destitutum. Et valde rationi consentaneum est, ut credamus, ferum tale esse.

Nullum enim aliud metallum tam difficulter malleo flectitur, vel igne liquefcit, nec ullum etiam adeo durum sine alterius corporis mixtura reddi potest: quæ tria indicio sunt, ejus ramenta magis ramosa sive angulosa esse, quam cæterorum, & ideo sibi invicem firmius annecti. Nec obstat quod nonnullæ ejus glebæ satis facile primæ vice

CXXXIV.  
*Nullus in aëre nec in aqua esse meatus recipiendis particulis striatis idoneus.*

CXXXV.  
*Nullus etiam esse in illis corporibus terræ exterioris præterquam in ferro.*

CXXXVI.  
*Cur tales meatus sint in ferro.*

igni liqueſcant; tunc enim earum ramenta, nondum ſibi mutuo annexa, ſed una ab aliis diſjuncta ſunt; & ideo caloris vi facile agitantur. Præterea quamvis ferrum ſit aliis metallis durius & minus fuſile, eſt tamen etiam unum ex minime ponderoſis, & facile rubigine corrumpitur, aut aquis fortibus eroditur: quæ omnia indicio ſunt, ejus particulas non eſſe aliorum metallorum particulis ſolidiores, ut ſunt craſſiores, ſed multos in iis meatus contineri.

CXXXVII.

*Quæ ratio-  
ne etiam  
ſint in ſin-  
gulis ejus  
ramentiſ.*

Nolo tamen hic affirmare, in ſingulis ferri ramentiſ eſſe integra foramina, in modum cochlearum intorta, per quæ tranſeant particulæ ſtriatæ; ut etiam nolo negare, quin talia multa in iſtis reperiantur: ſed hic ſufficiet, ſi putemus, iſtiusmodi foraminum medietates in ſingulorum ramentorum ſuperficiebus ita eſſe inſculptas, ut, cum iſtæ ſuperficies apte junguntur, foramina integra componant. Et facile credi poteſt, craſſiores illas ramoſas, & foraminofas interioris terræ particulas, ex quibus fit ferrum, vi ſpirituum ſive ſuccorum acrium, illam permeantium, ita fuiſſe diviſas, ut dimidiata iſta foramina, in ſuperficiebus ramentorum quæ ab iſtis ſeparabantur remanerent; atque hæc ramenta poſtea per venas terræ exterioris, tum ab iſtis ſpiritibus, tum etiam ab exhalationibus & vaporibus protuſa, paulatim in fodinas aſcendiſſe.

CXXXVIII.

*Quomodo  
iſti meatus  
apti red-  
dantur ad  
particular  
ſtriatas, ab  
utrovis  
parte ve-  
nientes, ad-  
mittendat.*

Notandumque eſt, ipſa, ſic aſcendendo, non ſemper in eaſdem partes converti poſſe, quia ſunt anguloſa, & diverſas inæqualitates in terræ venis offendent; atque cum particulæ ſtriatæ, quæ à terrâ interiore cum impetu venientes, per totam exteriorem ſibi vias quærunt, iſtorum ramentorum meatus ita ſitos inveniunt, ut, ad motum ſuum ſecundum lineas rectas continuandum, per illa eorum orificia, per quæ prius egredi conſueverant, ingredi conentur, ipſas ibi occurrere perexiguas iſtis ramulorum extremitatibus, quas inter meatum ſpiras eminere, ac regressuris particulis ſtriatas aſſurgere, ſupra dictum eſt; haſque ramulorum extremitates initio quidem illis reſiſtere, ſed, ab iſtis sæpe sæpius impuſas, ſucceſſu temporis omnes in contrariam partem ſecti, aut etiam nonnullas frangi; cumque poſtea iſti meatus, ramentorum, quibus inſunt, ſitu mutato, alia ſua orificia particulis ſtriatas obvertunt, has rurſus occurrere extremitatibus ramulorum in meatus aſſurgentium, ipſasque paulatim in aliam partem inſectere, & quo sæpius atque diutius hoc iteratur, eo ramulorum iſtorum in utramque partem inſexionem faciliorem evadere.

Et

Et quidem ea ramenta, quæ, sæpe hoc pacto per exterioris terræ venas ascendendo, modo in unam, modo in aliam partem conversa fuerit, sive sola simul collecta sint, sive aliorum corporum meatibus in impacta, glebam ferri componunt. Ea vero, quæ vel semper eundem situm retinuerunt; vel certe, si, ut ad fodinas pervenerent, illum aliquoties mutare coactæ fuerint, saltem ibi postea, lapidis alteriusve corporis meatibus firmiter impacta, per multos annos immota remanserunt, faciunt magnetem. Atque ita vix ulla est ferri gleba, quæ non aliquo modo ad magnetis naturam accedat, & nullus omnino est magnes in quo non aliquid ferri contineatur; etsi forte aliquando istud ferrum aliquibus aliis corporibus tam arcte adhæreat, ut facilius igne corrumpi, quam ab iis educi possit.

CXXXIX.  
*Quæ sit natura magnetis.*

Cum autem ferri glæ igni admotæ liquefunt, ut in ferrum aut chalybem vertantur, earum ramenta vi caloris agitata, & ab heterogeneis corporibus disjuncta, hinc inde se contorquent, donec applicent se una aliis, secundum eas superficies, in quibus dimidiatos meatus, recipiendis particulis striatis idoneos, insculptos esse, paulo ante dictum est; ac etiam donec istorum meatum mediocritates tam apte congruant, ut integros meatus efforment. Quod ubi accidit, statim particulæ striatæ, quæ non minus in igne quam in aliis corporibus reperiuntur, per illos liberius quam per alia loca fluentes, impediunt ne exiguæ superficies, ex quarum apto situ & conjunctione exsurgunt, tam facile quam prius situm mutant, & ipsarum contiguitas, vel saltem vis gravitatis, quæ ramenta omnia deorsum premit, impedit ne facile disjungantur. Cunque interim ramenta ipsa, propter agitationem ignis, pergant moveri, multa simul in eundem motum conspirant, & totus liquor ex iis confusus, in varias quasi guttulas aut grumulos distinguitur: ita scilicet, ut omnia illa ramenta quæ simul moventur, unam quasi guttam conficiant, quæ gutta suam superficiem motu suo statim lævigat & perpolit. Occursu enim aliarum guttarum, quicquid est rude atque angulosum in ramentis, ex quibus constat, ab ejus superficie ad partes interiores detruditur, atque ita omnes cujusque guttularum partes quam arctissime simul junguntur.

CXL.  
*Quomodo fusione fiat chalybs, & quodvis ferrum.*

Et totus liquor, hoc pacto in guttulas sive grumulos distinctus, si celeriter frigeat, concrevit in chalybem admodum durum, rigidum, & fragilem, sere ut vitrum. Quippe durus est, quia constat

CXLI.  
*Cur chalybs sit valde durus, rigidus, & fragilis.*

ramentis sibi mutuo arctissime conjunctis; & rigidus, hoc est, talis, ut, si flectatur, sponte redeat ad priorem figuram, quia flexione ista ejus ramentorum exiguæ superficies non disjunguntur, sed soli meatus figuras mutant, ut supra de vitro dictum est; denique est fragilis, quia guttulæ, sive grumuli, quibus constat, sibi mutuo non adhærent nisi per superficierum suarum contactum; atque hic contactus non nisi in paucissimis & perexiguis locis immediatus esse potest.

CXLII.

*Qua sit differentia inter chalybem, & aliud ferrum.*

Non autem omnes glebæ æque aptæ sunt, ut in chalybem vertantur; ac etiam illæ eadem, ex quibus optimus & durissimus chalybs fieri solet, vile tantum ferrum dant, cum igne non convenienti funduntur. Nam si glebæ ramenta sint adeo angulosa & confragosa, ut sibi mutuo prius adhæreant, quam superficies suas apte possint ad invicem applicare, atque in guttulas distingui; vel si ignis non sit satis fortis, ad liquorem ita in guttulas distinguendum, & ramenta ipsas componentia simul constringenda; vel contra si sit tam fortis, ut istorum ramentorum aptum situm disturbet, non chalybs, sed ferrum minus durum & magis flexile habetur.

CXLIII.

*Quomodo chalybs temperetur.*

Ac etiam chalybs jam factus, si rursus igni admoveatur, etsi non facile liqueat, quia ejus grumuli nimis crassi sunt & solidi, ut ab igne integri moveantur, & ramenta quibus unusquisque grumulus constat, nimis arcte compacta, ut locis suis plane extrudi possint, mollitur tamen, quia omnes ejus particulæ calore concutiuntur: & postea si lente refrigeretur, non resumit priorem duritiem, nec rigorem, nec fragilitatem, sed fit flexile instar ferri vilioris. Dum enim hoc pacto refrigeratur, ramenta angulosa & confragosa, quæ ex grumulorum superficieribus ad interiores eorum partes vi caloris protrusa erant, foras se exserunt, & una aliis implicata, tanquam uncis quibusdam perexiguos unos grumulos aliis annexant; quo fit, ut ramenta ista non amplius tam arcte in grumulis suis compacta sint, atque ut grumuli non amplius immediato contactu, sed tanquam hamis vel uncis quibusdam alligati sibi mutuo adhæreant; & ideo chalybs non admodum durus, nec rigidus, nec fragilis, sed mollis, & flexilis evadat. In quo non differt à ferro communi, nisi quod chalybi iterum candefacto, & deinde celeriter refrigerato, prior durities & rigiditas reddatur; non autem ferro, saltem tanta. Cujus ratio est, quod ramenta in chalybe non tam longe absint à situ, ad maximam duritiem convenienti, quin facile illum ignis vi resumant, & in celerissima

rima refrigeratione retineant : cum autem in ferro talein situm nunquam habuerint , nunquam etiam illum resumunt . Et quidem ut ita chalybs aut ferrum candens celerrime refrigeretur , in aquam , aliove liquores frigidus mergi solet ; ac contra in oleum vel alia pinguis , ut lentius frigescat . & quia quo durior , & rigidior , eo etiam fragilior evadit ; ut gladii , ferræ , lima , aliave instrumenta ex eo fiant , non semper in frigidissimis liquoribus exstingui debet , sed in temperatis , prout in unoquoque ex istis instrumentis magis minusve fragilitas est vitanda , quam durities optanda . & ideo dum certis liquoribus ita mergitur , non inmerito dicitur temperari .

Quantum autem ad meatus , recipiendis particulis striatis idoneos , satis quidem patet ex dictis , permultos tam in chalybe quam in ferro esse debere ; ac etiam eos esse in chalybe magis integros & perfectos , ramulorumque extremitates , in ipsorum spiris eminentes , cum semel in unam partem flexæ sunt , non tam facile in contrariam posse inflecti ; quamquam etiam in hoc facilius , quam in magnete , flectantur ; ac denique omnes istos meatus , non in chalybe aut alio ferro , ut in magnete , officia sua recipiendis particulis striatis , ab Austro venientibus idonea , in unam partem , & idonea recipientibus aliis à Borea venientibus , in contrariam convertere ; sed eorum situm varium atque incertum esse debere , propterea quod ignis agitatione turbatur . Et in brevissima illa mora , qua hæc ignis agitatio frigore sistitur , tot tantum ex istis meatibus versus Austrum & Boream converti possunt , quot particulæ striatæ , à polis Terræ venientes , sibi tunc temporis per illos viam quaerunt . Et quia istæ particulæ striatæ omnibus ferri meatibus multitudine non respondent , omne quidem ferrum aliquam viam magneticam accepit ab eo situ , quem habuit respectu partium terræ , cum ultimo candefactum refriguit , vel etiam ab eo in quo diu immotum stetit , si diu in eodem situ steterit immotum ; sed pro multitudine meatuum quos in se continet , potest habere adhuc majorem .

Quæ omnia ex principiis Naturæ , supra expositis , ita sequuntur , ut quamvis non respicerem ad illas magneticas proprietates , quas hæc explicandas suscepi , ea tamen non aliter se habere judicarem . Deinceps autem videbimus , horum ope tam apte & perspicue omnium istarum proprietatum dari rationem , ut hoc etiam videatur sufficere ad persuadendum , ea vera esse , quamvis ex Naturæ principiis sequi nesciremus . Et quidem magneticæ proprietates ,

CXLIV.  
Quæ sit differentia inter meatus magnetis , chalybis , & ferri .

CXLV.  
Enumeratio proprietatum virtutis magneticæ .

192      PRINCIPIORVM PHILOSOPHIÆ  
tes, quæ ab ipsarum admiratoribus notari solent, ad hæc capita  
possunt referri.

1. Quod in magnete duo sint poli, quorum unus ubique loco-  
rum, versus Terræ polum Borealem, alius versus Australem se  
convertit.

2. Quod isti magnetis poli, pro diversis Terræ locis quibus in-  
sistunt, diversimode versus ejus centrum se inclinent.

3. Quod, si duo magnetes sint sphærici, unus versus alium eo-  
dem modo se convertat, ac quilibet ex ipsis versus Terram.

4. Quod postquam sunt ita conversi, ad invicem accedant.

5. Quod, si in contrario situ detineantur, se mutuo refugiant.

6. Quod, si magnes dividatur plano, lineæ per suos polos du-  
ctæ parallelo, partes segmentorum quæ prius junctæ erant, se in-  
tuo etiam refugiant.

7. Quod, si dividatur plano, lineam per polos ductam ad angu-  
los rectos secante, duo puncta, prius contigua, fiant poli diversæ vir-  
tutis; unus in uno; alius in alio segmento.

8. Quod quamvis in uno magnete sint tantum duo poli, unus  
Australis, alius Borealis, in unoquoque tamen ex ipsius fragmen-  
tis duo etiam similes poli reperiuntur; adeo ut ejus vis, quatenus  
ratione polorum diversa videtur, eadem sit in quavis parte, ac in  
toto.

9. Quod ferrum à magnete istam vim recipiat, cum tantum ei  
admovetur.

10. Quod pro variis modis quibus ei admovetur, eam diversi-  
mode recipiat.

11. Quod ferrum oblongum, quomodocunque magneti admo-  
tum, illam semper secundum suam longitudinem recipiat.

12. Quod magnes de vi sua nihil amittat, quamvis eam ferro  
communicet.

13. Quod ipsa brevissimo quidem tempore ferro communice-  
tur, sed temporis diuturnitate magis & magis in eo confirmetur.

14. Quod chalybs durissimus eam majorem recipiat, & rece-  
ptam constantius servet, quam vilius ferrum.

15. Quod major ei communicetur à perfectiore magnete, quam  
à minus perfecto.

16. Quod ipsa etiam Terra sit magnes, & nonnihil de sua vi fer-  
ro communicet.

17. Quod

17. Quod hæc vis in Terra, maximo magnete, minus fortis appareat, quam in plerisque aliis minoribus.

18. Quod acus à magnete tactæ, suas extremitates eodem modo versus Terram convertant, ac magnes suos polos.

19. Quod eas non accurate versus Terræ polos convertant, sed varie variis in locis ab iis declinent.

20. Quod ista declinatio cum tempore mutari possit.

21. Quod nulla sit, ut quidam aiunt, vel forte quod non eadem, nec tanta sit, in magnete supra unum ex suis polis perpendiculariter erecto, quam in eo, cujus poli æqualiter à Terra distant.

22. Quod magnes trahat ferrum.

23. Quod magnes armatus multo plus ferri sustineat, quam nudus.

24. Quod ejus poli, quamvis contrarii, se invicem juvent ad idem ferrum sustinendum.

25. Quod rotulæ ferreæ, magneti appensæ, gyratio in utramvis partem à vi magnetica non impediatur.

26. Quod vis unius magnetis varie possit augeri vel minui, varia magnetis alterius aut ferri ad ipsum applicatione.

27. Quod magnes, quantumvis fortis, ferrum à se distans ab alterius debilioris magnetis contactu retrahere non possit.

28. Quod contra magnes debilis, aut exiguum ferrum, sæpe aliud ferrum sibi contiguum separet à magnete fortiore.

29. Quod polus magnetis, quem dicimus Australem, plus ferri sustineat in his Borealibus regionibus, quam ille quem dicimus Borealem.

30. Quod limatura ferri circa unum, aut plures magnetes, certis quibusdam modis se disponat.

31. Quod lamina ferrea, polo magnetis adjuncta, ejus vim trahendi vel convertendi ferri deflectat.


32. Quod eandem nullius alterius corporis interpositio impediat.

33. Quod magnes ad Terram aliosve vicinos magnetes aliter conversus manens, quam sponte se converteret, si nihil ejus motui obstaret, successu temporis suam vim amittat.

34. Quod denique ista vis etiam rubigine, humiditate & situ minuatur, atque igne tollatur; non autem ulla alia nobis cognita ratione.

CXLVI.  
*Quomodo  
 particula  
 striata per  
 Terra meatus  
 fluant.*

Ad quarum proprietatum causas intelligendas, proponamus nobis ob oculos Terram AB, cujus A est polus Australis, & B Borealis: notemusque, particulas striatas, ab Australi cœli parte E venientes, alio plane modo intortas esse, quam venientes à Boreali F; quo fit, ut unæ aliarum meatus ingredi plane non possint. Notemus etiam, Australes quidem, recta pergere ab A versus B, per mediam Terram, ac deinde per aërem ei circum-



fusum reverti à B versus A; eodemque tempore Boreales transire à B ad A per mediam Terram, & reverti ab A ad B per aërem



aërem circumfusum: quia meatus per quos ab una parte ad aliam venerant, sunt tales, ut per ipsos regredi non possint.

Interim vero quot novæ semper accedunt a partibus cœli E & F, tot per alias partes cœli G & H abscidunt; vel in itinere dissipantur, & figuras suas amittunt: non quidem transeundo per mediam Terræ regionem; quia ibi meatus habent ad mensuram suam excavatos, per quos sine ullo offendiculo celerrime fluunt; sed redeundo per aërem, aquam & alia corpora terræ exterioris, in quibus nullos ejusmodi meatus habentes, multo difficilius moventur, particulisque secundi & tertii elementi assidue occurrunt, quas cum loco expellere laborant, interdum ab ipsis comminuuntur.

Iam vero si forte istæ particulæ striatæ magnetem ibi offendant, cum in eo inveniunt meatus ad suam figuram conformatos, eodemque modo dispositos ac meatus terræ interioris, ut paullo ante diximus, non dubium est, quin multo facilius per illum transeant, quam per aërem vel alia corpora terræ exterioris; saltem cum iste magnes ita situs est, ut habeat suorum meatorum orificia conversa versus eas Terræ partes, à quibus veniunt eæ particulæ striatæ, quæ per illa libere ingredi possunt.

Et, quemadmodum in Terra, sic in magnete, punctum medium ejus partis, in qua sunt orificia meatorum, per quæ ingrediuntur particulæ striatæ, venientes ab Australi cœli parte, dicimus polum Australem; punctum autem medium alterius partis, per quam hæ particulæ striatæ egrediuntur, & aliæ venientes à Septentrione ingrediuntur, dicimus polum Borealem. Nec moramur, quod vulgo alii polum quem vocamus Australem, vocent Borealem; neque enim ea de re vulgus, cui soli jus competit nomina rebus male convenientia frequenti usu approbandi, loqui solet.

Cum autem hi poli magnetis, non respiciunt eas Terræ partes, à quibus veniunt eæ particulæ striatæ, quibus liberum transitum præbere possunt, tunc istæ particulæ striatæ, oblique in magnetis meatus irruentes, illum impellunt ea vi quam habent ad perseverandum in suo motu secundum lineas rectas, donec ipsum ad naturalem situm reducerint: sicque quoties à nulla externa vi retinetur, efficiunt ut ejus polus Australis versus polum Terræ Borealem convertatur, & Borealis versus Australem. Quoniam eæ quæ à Terræ polo Boreali per aërem ad Austrum tendunt, venire prius ab Australi cœli parte per mediam Terram, & venire à Boreali quæ ab Boream revertuntur.

CXLVII.  
*Quod difficilius transeant per aërem, & terram exteriorem, quam per interiorem.*


CXLVIII.  
*Quod facilius transeant per magnetem quam per alia corpora hujus terræ exterioris.*

CXLIX.  
*Qui sunt poli magnetis.*

CL.  
*Cur isti poli se convertant versus polos Terræ.*

CLI.  
*Cur etiam  
 certa ratio  
 ne versus  
 ejus cen-  
 trum se re-  
 clinens.*

Efficiunt etiam ut magnes, pro diversis terræ locis quibus insitit, unum ex polis suis, altero magis aut minus, versus illam inclinet. Neinpe in Æquatore quidem *a*, polus Australis magnetis *L*, versus *B* Borealem Terræ; & *b* Borealis ejusdem magnetis, versus Australem Terræ dirigitur; ac neuter altero magis deprimitur, quia particulæ striatæ cum æquali vi ab utraque parte ad illos accedunt. Sed in polo Terræ Boreali, polus *a* magnetis *H* omnino



deprimitur, & *b* ad perpendicularum erigitur. In locis autem intermedijs magnes *M* polum suum *b* magis aut minus erigit, & polum

lum *a* magis aut minus deprimit, prout magis aut minus vicinus est polo Terræ B. Quorum causa est quod Australes particulæ striatæ, magnetem N ingressuræ, ab interioribus Terræ partibus per polum B, secundum lineas rectas, surgant; Boreales verò ab hemisphærio Terræ D A C, circumquaque per æreum versus eundem magnetem N venientes, non magis oblique progredi debeant, ut ad ejus superiorem partem, quam ut ad inferiorem, accedant: Australes vero, ingressuræ magnetem M, à toto Terræ tractu qui est inter B & M ascendentes, vim habeant ejus polum *a* oblique deprimendi, ne à Borealibus, quæ à tractu Terræ A C ad alium ipsius polum *b* non minus facile accedunt cum erectus est, quam cum depressus, impediuntur.

Cum autem istæ particulæ striatæ per singulos magnetes eodem plane modo ac per Terram fluant, non aliter duos magnetes sphaericos unum ad alium, quam ad totam terram, debent convertere. Notandum enim, ipsas circa unumquemque magnetem multo majore copia semper esse congregatas, quam in aëre inde remoto: quia nempe in magnete habent meatus, per quos multo facilius fluunt quam per aërem circumjacentem: à quo idcirco juxta magnetem retinentur; ut etiam, propter meatus quos habent in Terra interiore, major est earum copia in toto aëre, aliisque corporibus Terram ambientibus, quam in cœlo. Et ita quantum ad vim inagneticam, eadem plane omnia putanda sunt de uno magnete, respectu alterius magnetis, ac de terra, quæ ipsa maximus magnes dici potest.

Neque vero duo magnetes se tantum ad invicem convertunt, donec polus Borealis unius, polum Australem alterius suspiciat, sed præterea postquam sunt ita conversi, ad invicem accedunt donec se mutuo contingant, si nihil ipsorum motum impediat. Notandum enim est, particulas striatas celerissime moveri quandiu versantur in meatibus magnetum, quia ibi feruntur impetu primi elementi ad quem pertinent, cumque inde egrediuntur, occurrere particulis aliorum corporum, easque propellere, quoniam hæc, ad secundum aut tertium elementum pertinentes, non tantum habent celeritatis. Ita illæ quæ transeunt per magnetem O, celeritate qua feruntur ab A ad B, atque à B ad A, vim acquirunt ulterius progrediendi secundum lineas rectas, versus R & S, donec ibi tam multis particulis secundi aut tertii elementi


CLII.

*Cur unus  
magnes ad  
alium se  
convertat  
& inclinet  
eodem mo-  
do atque ad  
Terram.*

CLIII.

*Cur duo  
magnetes ad  
invicem ac-  
cedant, &  
quæ sit cu-  
jusque  
sphaera  
attractivitas.*

occurrerint, ut ab ipsis utrimque reflectantur versus V. Totumque spatium RVS per quod ita sparguntur, vocatur sphaera virtutis, sive activitatis, hujus magnetis O: quam patet eo majorem esse debere, quo magis est major, praesertim quo longior secun-



dum lineam AB, quia particulae striatae longius per illum progredientes, majorem agitationem acquirunt. Ita etiam quae transcunt per magnetem P, recta utrimque pergunt versus S & T, atque inde reflectuntur versus X, totumque aërem in sphaerae suae activitatis contentum propellunt. Sed non ideo expellunt, si nullum habeat locum quo possit recedere: ut nullum habet, cum istorum magnetum sphaerae virtutis sunt ab invicem disjunctae: sed cum in unam coalescunt, tunc primo facilius est particulis striatis, quae veniunt ab O versus S, recta pergere usque ad P, in locum earum quae ex T per X ad S & b revertebantur, quam reflecti versus V & R, quo non difficulter pergunt venientes ab X; faciliusque est venientibus à P ad S, pergere usque ad O, quam reflecti versus X, quo etiam non difficulter pergunt venientes ab V; sicque istae particulae striatae non aliter transcunt per hos duos magnetes O & P, quam si unicus esset. Deinde facilius est particulis striatis, recta pergentibus ab O ad P, atque à P ad O, aërem intermedium expellere ab S versus R & T, in locum magnetem O & P, sicque efficere, ut hi magnetes ad invicem accedant, donec se contingant in S, quam per totum istum aërem eniti ab A ad b, atque ab V ad X, quae duae viae breviores sunt, cum hi duo magnetes ad invicem accedunt, vel, si unus retineatur, cum saltem alter ad ipsam venit.


CLIV.  
Cur inter-

Poli autem cognominis duorum magnetum non sic ad invicem acce-

accedunt, sed contra potius, si nimis prope admoveantur, recedunt. Particulæ enim striatæ ab eo unius magnetis polo, qui alteri magneti obversus est, venientes, cum hunc alterum ingredi non possint, spatium aliquod exigunt inter istos duos magnetes quo transcant, ut ad alium magnetis ex quo egressæ sunt polum revertantur. Nempe egredientes ab O per polum A, cum ingredi non possint in P per ejus polum a, spatium aliquod exigunt inter A & a, per quod transcant versus V & B, atque vi, qua motæ sunt à B ad A, pellunt magnetem P; sicque egredientes à P pellunt magnetem O: saltem cum eorum axes B A & ab sunt in eadem linea recta. Sed cum tantillo magis in unam partem, quam in aliam, inflexi sunt, tunc isti magnetes se convertunt modo paullo ante explicato: vel si hæc eorum conversio impediatur, non autem motus rectus; tunc rursus unus magnes alium fugat secundum lineam rectam. Ita si magnes O, exiguæ cymbæ impositus, aquæ sic innatet, ut semper ejus maneat ad perpendicularum erectus, & magnes P, cujus polus Australis Australi alterius obversus est, manu moveatur versus Y, hinc fiet, ut magnes O recedat versus Z, antequam à magnete P tangatur. In quamcunque enim partem cymba se convertat, requiritur semper aliquod spatium inter istos duos magnetes, ut particulæ striatæ, ex iis per polos A & a egredientes, versus V & X transire possint.




Et ex his facillime intelligitur, cur, si magnes secetur plano parallelo lineæ per ejus polos ductæ, segmentumque libere suspendatur supra magnetem ex quo resectum est, sponte se convertat, & situm contrarium ejus quem prius habuerat, assectet; ita ut si partes A & a prius junctæ fuerint, itemque B & b, postea b vertat se versus A, & a versus B: quia nempe antea pars Australis unius, Australi alterius juncta erat, & Borealis Bo-



CLV.  
Cur segmentorum magnetis partes, que ante sectionem junctæ erant, se mutuo etiam refugiant.

reali,

occurrerint, ut ab ipsis utriusque reflectantur versus V. Totumque spatium RVS per quod ita sparguntur, vocatur sphaera virtutis, sive activitatis, hujus magnetis O: quam patet comajorem esse debere, quo magis est major, præsertim quo longior secun-




dum lineam AB, quia particulae striatae longius per illum progredientes, majorem agitationem acquirunt. Itactiam quæ transcurrent per magnetem P, recta utrimque pergunt versus S & T, atque inde reflectuntur versus X, totumque aërem in sphaerae suæ activitatis contentum propellunt. Sed non ideo expellunt, si nullum habeat locum quo possit recedere: ut nullum habet, cum istorum magnetum sphaerae virtutis sunt ab invicem disjunctæ: sed cum in unam coalescunt, tunc primo facilius est particulis striatis, quæ veniunt ab O versus S, recta pergere usque ad P, in locum earum quæ ex T per X ad S & b revertebantur, quam reflecti versus V & R, quo non difficulter pergunt venientes ab X; faciliusque est venientibus à P ad S, pergere usque ad O, quam reflecti versus X, quo etiam non difficulter pergunt venientes ab V; sicque istæ particulae striatae non aliter transeunt per hos duos magnetes O & P, quam si unicus esset. Deinde facilius est particulis striatis, recta pergentibus ab O ad P, atque à P ad O, aërem intermedium expellere ab S versus R & T, in locum magnetem O & P, sicque efficere, ut hi magnetes ad invicem accedant, donec se contingant in S, quam per totum istum aërem eniti ab A ad b, atque ab V ad X, quæ duæ viæ breviores fiunt, cum hi duo magnetes ad invicem accedunt, vel, si unus retineatur, cum saltem alter ad ipsam venit.


CLIV.  
Cur inter-

Poli autem cognomines duorum magnetum non sic ad invicem  
acce-

accedunt, sed contra potius, si nimis prope admoveantur, recedunt. *dum se invicem refugiant.*  
 Particulæ enim striatæ ab eo unius magnetis polo, qui alteri magneti obversus est, venientes, cum hunc alterum ingredi non possint, spatium aliquod exigunt inter istos duos magnetes quo transeant, ut ad alium magnetis ex quo egressæ sunt polum revertantur. Nempe egredientes ab O per polum A, cum ingredi non possint in P per ejus polum a, spatium aliquod exigunt inter A & a, per quod transeant versus V & B, atque vi, qua motæ sunt à B ad A, pellunt magnetem P; sicque egredientes à P pellunt magnetem O: saltem cum eorum axes BA & ab sunt in eadem linea recta. Sed cum tantillo magis in unam partem, quam in aliam, inflexi sunt, tunc isti magnetes se convertunt modo paullo ante explicato: vel si hæc eorum conversio impediatur, non autem motus rectus; tunc rursus unus magnes alium fugat secundum lineam rectam. Ita si magnes O, exiguæ cymbæ impositus, aquæ sic innatet, ut semper ejus maneat ad perpendicularum erectus, & magnes P, cujus polus Australis Australi alterius obversus est, manu moveatur versus Y, hinc fiet, ut magnes O recedat versus Z, antequam à magnete P tangatur. In quamcunque enim partem cymba se convertat, requiritur semper aliquod spatium inter istos duos magnetes, ut particulæ striatæ, ex iis per polos A & a egredientes, versus V & X transire possint.



Et ex his facillime intelligitur, cur, si magnes secetur plano parallelo lineæ per ejus polos ductæ, segmentumque libere suspendatur supra magnetem ex quo resectum est, sponte se convertat, & situm contrarium ejus quem prius habuerat, assectet; ita ut si partes A & a prius junctæ fuerint, itemque B & b, postea b vertat se versus A, & a versus B: quia nempe antea pars Australis unius, Australi alterius juncta erat, & Borealis Bo-




CLV.  
 Cur segmentorum magnetis partes, quæ ante sectionem junctæ erant, se mutuo etiam refugiant.

reali,

reali, post divisionem vero particulæ striatæ per Australem partem unius egressæ, per Borealem alterius ingredi debent; & egressæ per Borealem, ingredi per Australem.

## CLVI.

*Cur duo puncta, quæ prius in uno magnete contigua erant, in ejus fragmentis sine poli diuersæ virtutis.*



Manifestum etiam est, cur, si magnes dividatur plano, lineam per polos ductam ad angulos rectos secante, poli segmentorum quæ ante sectionem se mutuo tangebant, ut *b* & *a*, sint contrariæ virtutis: quia particulæ striatæ, quæ per unum ex istis polis egrediuntur, per alium ingredi debent.

CLVII.  
*Cur eadem sit vis in quavis magnetis parte, ac in toto.*

Nec minus manifestum est, eandem esse vim in quavis magnetis parte ac in toto: neque enim ista vis alia est in polis, quam in reliquis partibus, sed tantum major videtur, quia per illos egrediuntur particulæ striatæ, quæ per longissimos magnetis meatus transierunt, & quæ inter omnes ab eadem parte venientes mediæ sunt. Saltem in magnete spherico; ad cujus exemplum in reliquis ibi poli esse censentur, ubi maxima vis apparet. Nec etiam ista vis alia est in uno polo quam in alio, nisi quatenus particulæ striatæ per unum ingressæ per alium egrediuntur: atqui nulla est tantilla pars magnetis, in qua, si habent ingressum, non habeant etiam egressum.

CLVIII.  
*Cur magnes suam vim ferro sibi admoto communicet.*


Nec mirum est, quòd ferrum, magneti admotum, vim magneticam ab illo acquirat. Iam enim habet meatus recipiendis particulis striatis idoneos, nihilque ipsi deest ad istam vim acquirendam, nisi quod exiguæ quædam ramulorum, ex quibus ejus ramenta constant, extremitates hinc inde in istis meatibus promineant; quæ omnes versus unam & eandem partem flecti debent in iis meatibus, per quos transire possunt particulæ striatæ, ab Austro venientes, & versus oppositani in aliis. Atqui magnete admoto, particulæ striatæ magna vi & magna copia, torrentis instar, in ferri meatus irruentes, istas ramulorum extremitates hoc pacto inflectunt; ac proinde ipsi dant id omne, quod in eo ad vim magneticam desiderabatur.

CLIX.  
*Cur ferrum pro variis modis, quibus magneti admovetur, ipsam diuersimode recipiat.*

Et quidem pro variis partibus magnetis, ad quas ferrum applicatur, variè accipit istam vim. Sic pars *R* ferri *RST*, si applicetur polo boreali magnetis *P*, fiet polus Australis ferri, quia per illam ingredientur particulæ striatæ ab Austro venientes, & per partem *T* ingredientur Boreales, ex polo *A* per aërem reflexas. Eadem pars *R*, si jacet supra æquatorem magnetis, & respiciat ejus polum



polum Borealem, ut in C, fiet rursus polus Australis ferri; sed si invertatur, & respiciat polum Australem, ut in D, tunc amittet vim poli Australis, & fiet polus Borealis. Denique si S pars media istius ferri, tangat polum magnetis A, particulæ striatæ Boreales, illud ingressæ per S, utrimque egredientur per R & T; sicque in utraque extremitate recipiet vim poli Australis, & in medio vim poli Borealis.



Quæri tantum potest, cur istæ particulæ striatæ, ex magnetis polo A, ferri partem S ingredientes, non recta pergant versus E, sed potius hinc inde reflectantur versus R & T, sicque hoc ferrum, secundum suam longitudinem potius quam secundum latitudinem, vim magneticam recipiat. Sed facilis responsio est, quia multo magis apertas & faciles vias inveniunt in ferro, quam in aere, à quo idcirco versus ferrum reflectuntur.

Facilis etiam responsio est, si quæretur cur magnes nihil amittat de sua vi, cum eam ferro communicat. Nulla enim in magnetis mutatio fit, propterea quod particulæ striatæ ex eo egredientes, ferrum potius quam quodvis aliud corpus, ingrediuntur: nisi forsan quod liberius per ferrum, quam per alia corpora transfundo, copiosius etiam ex magnetis, cum ferrum ei adjunctum est, egredientur; quo tantum abest ut ejus vis minuatur, quin potius augetur.

Et brevissimo tempore ista vis ferro accedit, quia particulæ striatæ celerrime per ipsum fluunt; sed longa mora in eo confirmatur, quia quo diutius ramulorum extremitates in unam partem flexæ manserunt, eo difficilius in contrariam reflectuntur.

Et chalybs istam vim majorem accipit quam vilis ferrum, quia plures & perfectiores habet meatus, particulis striatis recipiendis idoneos: Eamque constantius servat, quia ramulorum in iis meatibus prominentium extremitates habet minus flexiles.

Et major ei communicatur à majore & perfectiore magnetis, tum quia particulæ striatæ, majori cum impetu in ejus meatus irruentes,

CLX.  
*Cur ferrina oblonga eam non recipiat, nisi secundum suam longitudinem.*

CLXI.  
*Cur magnes nihil amittat de sua vi, quamvis eam ferro communicet.*

CLXII.  
*Cur hæc vis celerrime ferro communicetur, sed diuturnitate temporis in eo confirmetur.*

CLXIII.  
*Cur chalybs ad eam recipiendam aptior sit, quam vilis ferrum.*

CLXIV.  
*Cur major ei communicetur à*

*perfectiore  
magnete,  
quam à mi-  
nus perfectio.*

ramulorum in iis prominentium extremitates magis inflectunt; tum etiam quia plures simul eo ruentes, plures ejusmodi meatus sibi aperiunt. Notandum enim est, plures esse tales meatus in chalybe, qui scilicet ex solis ferri ramentis constat, quam in magnete in quo multum est materiæ lapideæ, cui ferri ramenta infixæ sunt; atque ideo cum paucæ tantum particulæ striatæ ex magnete debili ferrum ingrediantur, non omnes ejus meatus aperiunt, sed paucos tantum, & quidem illos, qui extremitatibus ramulorum quam maxime flexilibus claudebantur.

CLXV.  
*Cur ipsa et-  
iam terra  
vim magne-  
ticam ferro  
tribuat.*

Vnde fit, ut etiam vile ferrum, in quo scilicet istæ ramulorum extremitates sunt valde flexiles, ab ipsa Terra, magnete quidem maximo, sed admodum debili, nonnullam vim magneticam brevissimo tempore possit accipere. Nempe si sit oblongum, nulla tali vi adhuc imbutum, & una sua extremitate versus Terram inclinatur; protinus ex hoc solo acquireret, in ista extremitate versus Terram inclinata, vim poli Australis in his Borealibus regionibus; & momento illam amitteret, ac plane contrariam acquireret, si eadem ejus extremitas attollatur, & opposita deprimatur.

CLXVI.  
*Cur vis ma-  
gnetica in  
Terra debi-  
lior sit, quam  
in parvis  
magnetibus.*

Sed si quæratur, cur ista vis in Terra, maximo magnete, debiliior sit quam in aliis minoribus: Respondeo, me non putare, illam esse debiliorem, sed potius multo fortiorem, in media illa Terræ regione, quam totam particulis striatis perviam esse supra dictum est; verum istas particulas striatas, ab ipsa egressas, maxima ex parte reverti per interiorem illam superioris Terræ regionis crustam, ex qua metalla oriuntur, & in qua sunt etiam multi meatus, iis recipiendis idonei; atque idcirco per paucas usque ad nos pervenire. Iudico enim, istos meatus, tum in illa crusta interiore, tum etiam in magnetibus, & ferri ramentis, quæ in venis hujus exterioris continentur, plane alio modo conversos esse, quam meatus mediæ regionis; ita ut particulæ striatæ, quæ per hanc mediam regionem ab Austro ad Boream fluunt, revertantur à Borea ad Austrum, per omnes quidem superioris partes, sed præcipue per ejus crustam interiorem, itemque per magnetes & ferrum exterioris; quo cum maxima earum pars se conerit, paucæ supersunt quæ per hunc nostrum aërem, & alia circumjacentia corpora, in meatibus idoneis destituta, sibi viam quærant. Quæ si recte conjicio, magnes è terra excisus, & in cymba super aquam libere collocatus, eandem illam faciem, qua semper antea, dum terræ hærebat, Septen-  
trio-

triones spectavit, debet adhuc in Septentriones convertere: ut Gilbertus, virtutis magneticæ præcipuus indagator, & ejus quæ in Terra est primus inventor, expertum se esse affirmat. Nec minor quod alii contrarium putent se vidisse. forsan enim iis impositum, quod, cum illa ipsa pars terræ, ex qua magnetem excidi curaverant, esset magnes, poli magnetis excisi ad eam se converterent; ut paullo ante dictum est, unius magnetis fragmentum ad aliud converti.

Iam vero, cum ista virtus magnetica non communicetur ferro oblongo, nisi secundum ejus longitudinem, certum est, acum ipsa imbutam suas semper extremitates versus easdem terræ partes debere convertere, versus quas magnes sphaericus polos suos convertit; & semper ejusmodi acus suæ magneticæ virtutis polos in extremitatibus istis præcise habere.

Et quia facilius earum extremitates à reliquis partibus dignosci possunt, quam poli magnetis, ipsarum ope notatum est, magneticæ virtutis polos non ubique Terræ polos accurate respicere, sed variis in locis ab iis declinare. Cujus declinationis causa, ut jam ante Gilbertus animadvertit, ad solas inæqualitates quæ sunt in hac terræ superficie, referri debet. Manifestum enim est, in unius hujus exterioris terræ partibus, multo plura ferri ramenta, pluresque magnetes reperiri, quam in aliis, quo fit, ut particulæ striatæ, à terra interiori egredientes, majori copia versus quædam loca fluant, quam versus alia, sicque ab itineribus suis sæpe deflectant. Et quia polorum magnetis vel extremitatum acus conversio, pendet à solo cursu istarum particularum, omnes earum inflexiones sequi debet. Hujusque rei experimentum facere licet in magnete, cujus figura non sit sphaerica: nam si acus exigua supra diversas ejus partes collocetur, non semper eodem plane modo ad ejus polos se converteret, sed sæpe ab ipsis aliquantum declinabit. Nec putandum est, in eo disparem esse rationem, quod inæqualitates quæ sunt in extrema terræ superficie, ad totam ejus molem comparatæ perexiguæ sint; non enim cum ipsa, sed cum acubus aut magnetibus in quibus declinatio fit, sunt comparandæ, sicque satis magnas esse apparet.

Sunt qui dicunt, istam declinationem non semper in iisdem terræ locis eandem manere; sed cum tempore mutari: quod minime mirum videri debet; non modo quia ferrum quotidie ex unis

CLXVII.

*Cur acus magnete tacta semper sua virtutis polos in extremitatibus suis habeant.*

CLXVIII.

*Cur poli magnetica virtutis non semper accurate versus Terræ polos dirigantur, sed ab iis varie declinent.*

CLXIX.

*Cur etiam interdum ista declinatio cum tempore mutetur.*

terræ partibus in alias ab hominibus transfertur; sed etiam quia ejus glebæ, quæ sunt in hac terra exteriori, quibusdam in locis cum tempore corrumpi possunt, & aliæ in aliis generari, sive ab interiori terræ submitti.

CLXX.  
*Cur in magne-  
 tete supra  
 unum ex  
 suis polis  
 erecto minor  
 esse possit,  
 quam cum  
 ejus poli  
 æqualiter  
 à Terra di-  
 stant.*

Sunt etiam qui dicunt, istam declinationem nullam esse in magnete sphærico, supra polum suum Australem, in his Borealibus regionibus, vel supra Borealem in Australibus, perpendiculariter stante, illumque hoc pacto cymbæ inpositum, quandam æquatoris sui partem, semper accurate eandem versus Boream, & oppositam versus Austrum, convertere. Quod an verum sit, nullo mihi adhuc experimento compertum est. Sed facile mihi persuadeo, non omnino eandem, nec forte eandem esse declinationem, in magnete ita constituto, quam in eo cujus poli æqualiter à Terra distant. Nam particulæ striatæ, in hac superiore Terræ regione, non modo per lineas æqualiter ab ejus centro distantes, ab uno polo ad alium revertuntur, sed etiam ubique (præterquam sub æquatore) nonnullæ ab interioribus ejus partibus ascendunt: & magnetis supra polos erecti conversio ab his ultimis, declinatio vero à prioribus præcipue dependet.

CLXXI.  
*Cur magnes  
 trahat fer-  
 rum.*

Præterea magnes trahit ferrum, sive potius magnes & ferrum ad invicem accedunt: neque enim ulla ibi tractio est, sed statim atque ferrum est intra sphæram activitatis magnetis, vim ab eo mutuatur, & particulæ striatæ ab utroque egredientes, æreum intermedium expellunt; quo fit, ut ambo ad invicem, non aliter quam duo magnetes, accedant. Immo etiam ferrum liberius movetur quam magnes, quia constat iis tantum ramentis, in quibus particulæ striatæ suos habent meatus, magnes autem multa materia lapidea gravatur.

CLXXII.  
*Cur magnes  
 armatus,  
 multo plus  
 ferri susti-  
 neat, quam  
 nudus.*

Sed multi mirantur, magnetem armatum, sive laminam ferream magneti adjunctam, plus ferri posse sustinere, quam solum magnetem. Cujus tamen ratio detegi potest ex eo, quod etiam si plus sibi appensus ferri sustineat, non tamen idcirco plus ad se alliciat, si vel minimum ab eo removeatur; nec etiam plus sustineat, si corpus aliquod, quantumvis tenue, interjacet: hinc enim apparet, istam majorem ejus vim ex sola differentia contactus oriri: quod nempe laminæ ferreæ meatus aptissime congruant cum meatibus ferri ipsi appensi, & ideo particulæ striatæ, per hos meatus ex uno ferro in aliud transeunt, omnem æreum intermedium expellant, efficiant-

efficiantque, ut eorum superficies, se invicem immediate contingentes, difficillime disjungantur: jamque supra ostensum est, nullo glutino duo corpora melius ad invicem posse alligari, quam immediate contactu. Meatus autem magnetis non ita congruunt cum meatibus ferri, propter materiam lapideam quæ in eo est; hincque fit, ut semper aliquantulum spatii inter magnetem & ferrum debeat remanere, per quod particulæ striatæ ex unius meatibus ad meatus alterius perveniant.

Mirantur etiam nonnulli, quod quamvis poli magnetis contrariæ virtutis esse videantur, se tamen invicem juvent ad ferrum sustinendum: ita ut, si ambo laminis ferreis armentur, possint fere duplo plus ferri simul sustinere, quam unus solus. Nempe si A B est magnes, cujus polis adjunctæ sunt laminæ CD & EF, ita utrimque prominentes, ut ferrum GH, iis applicatum, superficie satis lata ipsas tangat, hoc ferrum GH duplo fere gravius esse potest, quam si ab una tantum ex istis laminis sustineretur. Sed hujus rei ratio evidens est ex motu particularum striatarum jam explicato: quamvis enim in eo contrariæ sint, quod quæ per unum polum ingrediuntur, non possint etiam ingredi per alium, hoc non impedit quo minus in sustinendo ferro consentiant; quia venientes ab Australi magnetis polo A, per laminam chalybeam CD reflexæ, ingrediuntur unam ferri partem b, in qua faciunt ejus polum Borealem; atque inde fluentes usque ad Australem a, occurrunt alii laminæ chalybeæ FE, per quam ascendunt ad B, polum magnetis Borealem: & vice versa egressæ ex B, per armaturam EF, ferrum appensum HG, aliamque armaturam DC, revertuntur ad A.



Hic autem motus particularum striatarum per magnetem & ferrum, non ita videtur consistere cum motu circulari ferrearum rotularum, quæ turbinis instar contortæ, diutius gyranæ magnetem pendentes, quam cum ab eo remotæ terræ insistant. Et sanè si particulæ striatæ motu tantum recto agerentur, & singulos ferri meatus per quos ingredi debent, è regione meatus magnetis ex quibus egrediuntur, offenderent, judicarent, eas sistere debere gyrationem istarum rotularum. Sed quia semper ipsæmet gyranæ,

CLXXXIII.  
Cur ejus poli  
quamvis  
contrarii, se  
invicem ju-  
vent ad fer-  
rum susti-  
nendum.

CLXXXIV.  
Cur gyratio  
rotulæ fer-  
reæ à vi  
magnetis cui  
appensa est,  
non impe-  
diatur.

unæ in unam partem, aliæ in contrariam, & oblique transire debent ex meatibus magnetis in meatus ferri, quomocunq[ue] rotula veratur, æque facile in ejus meatus ingrediuntur, ac si esset in mota, minusque ipsius motus impeditur à contactu magnetis, cum ei sic appensa gyratur, quam à contactu Terræ, cum suo pondere illam premit.

CLXXV.

*Quomodo  
& quare vis  
unius ma-  
gnetis au-  
geat vel mi-  
nuat vim  
alterius.*

Variis modis vis unius magnetis augetur vel minuitur alterius magnetis aut ferri accessu. Sed una in hoc generalis regula est, quod quoties ita siti sunt isti magnetes, ut unus in alium particulas striatas mittat, se invicem juvent; contra autem, si unus ab alio eas abducat, sibi obstant. Quia quo celerius & copiosius istæ particulæ per unumquemque magnetem fluunt, eo major in eo est virtus, & magis agitatur, ac plures ab uno magnete vel ferro in alium mitti possunt, quam eo absente ab aëre, aliove ullo corpore in ejus locum constituto. Sic non modo, cum polus Australis unius magnetis, polo Boreali alterius conjunctus est, se invicem juvant ad ferrum aliis suis polis appensum sustinendum; sed etiam cum disjuncti sunt, & ferrum inter utrumque collocatur. Ex. gr. Magnes C juvatur à magnete F, ad ferrum D E sibi conjunctum retinendum; & vice versa, magnes F juvatur à magnete C, ad hujus ferri extremitatem E in aëre sustinendam: potest enim esse tam gravis, ut ab eo solo sic sustineri non posset, si alia extremitas D alteri corpori, quam magneti C, inniteretur.



test enim esse tam gravis, ut ab eo solo sic sustineri non posset, si alia extremitas D alteri corpori, quam magneti C, inniteretur.

CLXXVI.

*Cur ma-  
gnetes, quan-  
tumvis for-  
tis, ferrum  
sibi non con-  
signum à  
magnete de-  
bilitate at-  
trahere non  
possit.*

Sed interim quædam vis magnetis F impeditur à magnete C, nempe illa quam habet ad ferrum D E ad se alliciendum. Notandum enim est, hoc ferrum, quamdiu tangit magnetem C, attrahi non posse à magnete F, quem non tangit, etiamsi hunc illo multo potentiorum esse supponamus. Cujus ratio est, quod particulæ striatæ per hos duos magnetes, & per hoc ferrum, tanquam per unicum magnetem, modo supra explicato transeunt, æqualem fere habeant vim in toto spatio quod est inter C & F; nec ideo possint ferrum D E, non sola ista vi magnetica, sed insuper contactu suo, magneti C alligatum, versus F adducere.

Atque

Atque hinc patet, cursæpe magnes debilis, aut exiguum ferrum, detrahat aliud ferrum à magnete fortiore. Notandum enim est, hoc nunquam fieri nisi cum magnes debilior tangit illud ferrum quod detrahit à magnete fortiori. Quippe cum duo magnetes ferrum oblongum polis dissimilibus tangunt, unus in una extremitate, alius in alia, & deinde isti duo magnetes ab invicem removentur, ferrum intermedium non semper debiliori, nec etiam semper fortiori, sed modo uni, modo alteri, adhæret: nullamque puto esse rationem, cur uni potius quam alteri adhæreat, nisi quod cum cui adhæret, in majori superficie quam alium tangat.


Ex eo vero, quod magnes F juvet magnetem C, ad ferrum DE sustinendum, manifestum est, cur ille polus magnetis, qui à nobis vocatur Australis, plus ferri sustineat quam alter, in his Borealibus regionibus: etenim à Terra maximo magnete juvatur, eodem plane modo ac magnes C à magnete F; contra autem alius polus, propter situm non convenientem, à Terra impeditur.

Si paullo curiosius consideramus, quo pacto limatura ferri circa magnetem se disponat, multa ejus ope advertemus, quæ hæcenus dicta confirmabunt. Nam in primis notare licet, ejus pulvisculos non confuse coacervari, sed unos aliis incumbendo, quosdam quasi tubulos componere, per quos particulæ, striatæ liberius quam per ærem fluunt; quique idcirco earum vias designant. Quæ viæ ut clare ipsis oculis cerni possint, spargatur aliquid istius limaturæ supra planum, in quo sit foramen cui magnes sphæricus ita immittitur, ut polis suis utrimque planum tangat, eo modo quo Astronomorum globi Horizontis circulo immitti solent, ut sphæram rectam repræsentent, & limatura ibi sparsa disponat se in tubulos, qui flexus particularum striatarum circa magnetem, sive etiam circa globum Terræ, à nobis supra descriptos exhibebunt. Deinde si alius magnes eodem modo isti plano juxta priorem inseratur, & polus Australis unius, Borealem alterius respiciat, limatura circumsparsa ostendet etiam, quo pacto particulæ striatæ, per istos duos magnetes tanquam per unicum moveantur. Ejus enim tubuli, qui ab uno ex polis se mutuo respicientibus ad alium porrigentur, erunt omnino recti; alii vero, qui ab uno ex adversis polis ad alium pertingent, erunt circa magnetes inflexi: ut hic sunt lineæ

CLXXVII.  
Cur magnes debilis, aut ferrum, à magnete fortiori ferrum sibi continguum possit detrabere.

CLXXVIII.  
Cur in his Borealibus regionibus polus Australis magnetis sit fortior Boreali.

CLXXIX.  
De iis quæ observari possunt in ferri limatura circa magnetem sparsa.




BRVXT  $\alpha$ . Notari etiam potest, cum aliquid limaturæ ferri ex polo, ex. gr. Australi, unius magnetis pendet, si polus Australis alterius magnetis infra positi versus illam convertatur, & paulatim ei appropinquetur, quo pacto tubuli ex ea confecti primo sursum se retrahunt & inflectunt: quia scilicet eæ particulæ striatæ, quæ per illos fluunt, repelluntur ab aliis quæ veniunt à magnete inferiore. Ac deinde, si iste inferior magnes multo potentior sit superiore, tubuli isti dissolvuntur, & limatura decidit in inferiorem; quia scilicet particulæ striatæ ex hoc inferiori ascendentes, impetum faciunt in singulos istius limaturæ pulvisculos; quas cum ingredi non possint, nisi per easdem illorum superficies quibus magneti superiori adhærent, eos ab hoc superiore disjungunt. Contra vero, si polo Australi superioris magnetis, cui limatura ferri adhæret, polus Borealis inferioris obvertatur, hæc limatura tubulos suos recta versus inferiorem dirigit, & quantum potest producit; quia utrinque particulis striatis, ab uno magnete in alium transeuntibus, viam præbent, sed non ideo à superiori separatur, nisi prius inferiorem tetigerit, propter vim contactus, de qua egimus paullo ante. Atque propter istam eandem vim, si limatura magneti quantumvis forti adhærens, tangatur ab alio debiliore magnete, vel tantum à ferreo aliquo bacillo, nonnullæ ejus partes fortiorem magnetem relinquent, & debiliorem, sive ferreum bacillum, sequentur; illæ scilicet, quæ majori superficie hunc quam illum tangent. Cum enim exiguæ istæ superficies variæ sint, & inæquales, semper accidit, ut quasdam limaturæ



inaturæ particulas uni magneti vel ferro, alias alteri, firmius jungant.

Lamina ferrea, quæ polo magnetis adinota, ejus vim sustinendi ferri multum auget, ut ante dictum est, impedit ejusdem vim ferri ad se alliciendi aut convertendi. Nempe lamina DCD, impedit ne magnes A&B, cujus polo adjuncta est, acum E F ad se alliciat, aut convertat. Iam enim advertimus, particulas striatas, quæ progredirentur à B' versus E F, absque hac lamina esset, in ea reflecti ex C versus extremitates D D, propterea quod liberius per ipsam quam per aërem fluunt, sicque vix ullæ ad acum E F perveniunt. Eodem modo quo supra diximus



paucas à media Terræ regione ad nos pervenire, quia maxima eorum pars, per interiorem crustam superioris Terræ regionis, ab uno polo ad alium revertitur; unde fit, ut debilis tantum vis magnetica totius Terræ hic apud nos sentiat.

Sed præter ferrum, aut magnetem, nullum aliud corpus in locum laminae CD poni potest, à quo magnes AB impediatur, ne vim suam in acum E F exercent. Nullum enim habemus in hac exteriore terra, quantumvis solidum & durum, in quo non sint plurimi meatus; non quidem ad mensuram particularum striatarum efformati, sed multo majores; utpote qui etiam globulos secundi elementi recipiunt, & per quos idcirco istæ particulae striatæ non minus libere transire possunt, quam per aërem, in quo istos etiam globulos secundi elementi obvios habent.

Si ferrum, aut magnes, diu detineatur aliter conversus ad Terram, aliove vicinos magnetes, quam sponte se converteret si nihil ejus motum impediret, hoc ipso vires suas paulatim amittit; quia tunc particulae striatæ, ex Terra vel aliis magnetibus vicinis advenientes, oblique vel averse ipsius meatibus occurrendo, paulatim eorum figuras mutant, & corrumpunt.

Denique vis magnetica humiditate, rubigine, ac situ valde minuitur; & valido igne plane deletur. Rubigo enim ex ferri ramentis efflorescens, meatuum officina occludit; idemque præ-

CLXXX.  
Cur lamina  
ferrea, polo  
magnetis  
conjuncta,  
ejus vim  
strahendi vel  
convertendi  
ferri im-  
pediat.

CLXXXI.  
Cur eandem  
nullius alie-  
rius corporis  
interpositio  
impediat.

CLXXXII.  
Cur magne-  
tis positio  
non conver-  
tens ejus  
vires paul-  
latim immi-  
nuat.

CLXXXIII.  
Cur rubigo,  
humiditas  
& situs, eas  
etiam immi-  
nuat.

*muat, &  
vehemens  
ignis plane  
soluat.*

stat æris humiditas & situs, quia rubiginis initia sunt. Ignis autem agitatio istorum ramentorum positionem plane disturbat. Nihilque puto hæctenus circa magnetem vere ac pro certo fuisse observatum, cujus ratio ex iis quæ explicui, non facile intelligatur.

*CLXXXIV.  
De vi at-  
tractionis  
in succino,  
cera, resina,  
& simi-  
libus.*

Hic autem occasione magnetis qui trahit ferrum aliquid addendum est de succino, gagate, cera, resina, vitro, & similibus, quæ omnia minuta corpora etiam trahunt. Quamvis enim mei non sit instituti, particularia ulla explicare, nisi quatenus requiruntur ad generaliora, de quibus egi, confirmanda; nec examinare possim istam vim in gagate vel succino, nisi prius ex variis experimentis plures alias eorum proprietates deducam, & ita intimam ipsorum naturam investigem: quia tamen eadem vis in vitro etiam est, de quo mihi paullo ante fuit agendum, ad ignis effectus demonstrandos, nisi eam explicarem, alia forsitan quæ de illo scripti, possent in dubium revocari. Præsertim quia forte nonnulli, videntes, istam vim in succino, cera, resina, & oleagineis fere omnibus reperiri, putabunt, ipsam in eo consistere, quod tenues quædam & ramosæ istorum corporum particule, frictione commotæ, (frictio enim ad illam vim excitandam requiri solet,) per ærem vicinum se diffundant, ac sibi mutuo adhærescentes protinus revertantur, & minuta corpora, quæ in itinere offendunt, secum trahant. Quemadmodum videmus, ejusmodi pinguium liquefactorum guttas, bacillo appensas, levi motu ita excuti posse, ut una earum parte bacillo adhærente, alia pars ad aliquam distantiam ab eo recedat, statimque revertatur, nec non festucas, aliave obvia corpuscula, secum adducat. Nihil enim tale in vitro licet imaginari, saltem si natura ejus sit talis, qualem eam supra descripsimus; ac proinde in ipso alia istius attractionis causa est assignanda.

*CLXXXV.  
Quæ sit cau-  
sa istius at-  
tractionis in  
vitro.*

Nempe ex modo quo illud generari dictum est, facile colligitur, præter illa majuscula intervalla, per quæ globuli secundi elementi versus omnes partes transire possunt, multas etiam rimulas oblongas inter ejus particulas reperiri, quæ cum sint angustiores, quam ut istos globulos recipiant, soli materię primi elementi transitum præbent; putandumque est, hanc materiam primi elementi, omnium meatuum quos ingreditur figuras induere assuetam, per rimulas istas transeundo, in quasdam quasi  
facio-

fasciolas tenues, latas, & oblongas efformari; quæ, cum similes rimulas in aëre circumjacente non invenient, intra vitrum se continent, vel certe ab eo non multum evagantur, & circa ejus particulas convolutæ, motu quodam circulari ex unis ejus rimulis in alias fluunt. Quamvis enim materia primi elementi fluidissima sit, quia tamen constat minutis inæqualiter agitatis, ut in tertiae partis articulis 87 & 88 explicui, rationi consentaneum est, ut credamus, multas quidem ex maxime concitatis ejus minutis, à vitro in aërem assidue migrare, aliasque ab aëre in vitrum earum loco reverti; sed cum eæ quæ revertuntur non sint omnes æque concitatæ, illas quæ minimum habent agitationis, versus rimulas, quibus nulli meatus in aëre correspondent, expelli, atque ibi, unas aliis adhærentes, fasciolas istas componere: quæ fasciolarum idcirco successu temporis figuras acquirunt determinatas, quas non facile mutare possunt. Vnde fit, ut si vitrum satis valide fricetur; ita ut nonnihil incalescat; ipsæ hoc motu foras excussæ, per aërem quidem vicinum se dispergant, aliorumque etiam corporum vicinorum meatus ingrediantur; sed quia non tam faciles ibi vias inveniunt, statim ad vitrum revolvantur; & minutiora corpora, quorum meatibus sunt implicitæ, secum adducant.

Quod autem hic de vitro notavimus, de plerisque aliis corporibus etiam credi debet: nempe quod interstitia quædam inter eorum particulas reperiantur, quæ cum nimis angusta sint ad globulos secundi elementi admittendos, solam materiam primi recipiunt; & cum sint majora iis quæ in aëre circumjacente soli isti materię primi elementi etiam patent, implentur minus agitatis ejus minutis; quæ sibi mutuo adjunctæ, particulas componunt, diversas quidem habentes figuras, juxta diversitatem istorum interstitiorum, sed maxima ex parte fasciolarum instar tenues, latas & oblongas; ita ut circa particulas corporum quibus insunt, se convolvendo, assidue moveri possint. Interstitia enim à quibus figuram suam mutuantur, cum debeant esse valde angusta, ut globulos secundi elementi non admittant, nisi essent oblonga rimarum instar, vix possent esse majora iis, quæ inter aëris particulas à globulis ejusdem secundi elementi non occupantur. Quapropter etsi non nequeam, aliam causam attractionis, ante expositionem, in aliquibus forte corporibus locum habere posse; quia tamen

CLXXXVI.  
Eandem  
ipsum causam  
in rebus  
quibus etiam  
videri.

non est ita generalis, & attractio ista in valde multis corporibus observatur, non aliam puto in illis, vel saltem in maxima illorum parte, quam in vitro, esse quærendam.

CLXXXVII.  
Ex distis intelligi, quam causse esse possint reliquorum omnium mirabilium effectuum, qui ad occultas qualitates referri solent.

Cæterum hic notari velim, particulas istas, in meatibus corporum terrestrium ex materia primi elementi efforiatas, non modo variarum attractionum, quales sunt in electro & in magnete, sed & aliorum innumerabilium & admirandorum effectuum causas esse posse. Quæ enim in unoquoque corpore formantur, aliquid singulare habent in sua figura. Quo differunt à reliquis omnibus, in aliis corporibus formatis: cumque retineant maximam agitationem primi elementi, cujus sunt partes, minimas ob causas fieri potest, ut vel extra corpus in quo sunt non evagentur, sed tantum in ejus meatibus hinc inde discurrant; vel contra celerissime ab eo discedant, & alia omnia corpora terrestria pervadentes, ad loca quantumlibet remota brevissimo tempore perveniant, ibique materiam suæ actioni recipiendæ idoneam inveniētes, raros aliquos effectus producant. Et sane quisquis considerabit, quam miræ sint magnetis & ignis proprietates, ac quam diversæ ab iis quas vulgo in aliis corporibus observamus, quam ingens flamma ex minima scintilla momento temporis possit accendi, quam magna sit ejus vis; ad quam immanem distantiam stellæ fixæ lumen suum circumquaque diffundant, & reliqua, quorum causas, meo judicio, satis evidentes, & principiis omnibus notis, & ab omnibus admissis, figura scilicet, magnitudine, situ & motu particularum materiæ, in hoc scripto deduxi: facile sibi persuadebit, nullas esse vires in lapidibus aut plantis tam occultas, nulla sympathiæ vel antipathiæ miracula tam stupenda, nihil denique in natura universa, quod ad causas tantum corporales, sive mente & cogitatione destitutas, debeat referri, cujus ratio ex iisdem illis principiis deduci non possit: adeo ut aliqua alia ipsis adjungere non sit necesse.

CLXXXVIII.  
De iis, que ex translationibus de animali & de homine ad rerum materiam cognitionem mutatione sunt.

Plura non adderem in hac quarta principiorum Philosophiæ parte, si (quemadmodum mihi antehac in animo fuit) duas adhuc alias, quintam scilicet de viventibus, sive de animalibus & plantis, ac sextam de homine, eisdem scripturus. Sed quia nondum omnia, de quibus in iis agere vellem, mihi plane perspecta sunt, nec scio an satis unquam otii habiturus sim ad ipsas absolvendas, ne priores idcirco diutius retineam, vel quid in iis desideretur, quod

quod ad alias reservarim, pauca quædam de sensuum objectis hic subjungam. Quippe hæctenus hanc Terram, totumque adeo hunc mundum aspectabilem, instar machinæ descripsi, nihil præter figuras & motus in eo considerans; sensus autem nostri multa alia nobis exhibent: colores scilicet, odores, sonos & similia, de quibus si plane tacerem, præcipuam explicationis rerum naturalium partem viderer omisisse.

Sciendum itaque, humanam animam, etsi totum corpus informet, præcipuam tamen sedem suam habere in cerebro: in quo solo non modo intelligit, & imaginatur, sed etiam sentit: hocque opere nervorum, qui filorum instar à cerebro ad omnia reliqua membra protenduntur, iisque sic annexi sunt, ut vix ulla pars humani corporis tangi possit, quin hoc ipso moveantur aliquot nervorum extremitates per ipsam sparsæ, atque earum motus ad alias eorum nervorum extremitates, in cerebro circa sedem animæ collectas, transferatur, ut in Dioptricæ capite quartum satis fuse explicui. Motus autem qui sic in cerebro à nervis excitantur, animam, sive mentem intimè cerebro conjunctam, diversimode afficiunt prout ipsi sunt diversi. Atque hæc diversæ mentis affectiones, sive cogitationes, existis motibus immediate consequentes, sensuum perceptiones, sive, ut vulgo loquimur, sensus appellantur.

Horum sensuum diversitates, primo ab ipsorum nervorum diversitate, ac deinde à diversitate motuum, qui in singulis nervis fiunt, dependent. Neque tamen singuli nervi faciunt singulos sensus à reliquis diversos, sed septem tantum præcipuas differentias in iis notare licet, quarum duæ pertinent ad sensus internos, aliæ quinque ad externos. Nempe nervi qui ad ventriculum, œsophagum, fauces, aliasque interiores partes, explendis naturalibus desideriis destinatas, protenduntur, faciunt unum ex sensibus internis, qui appetitus naturalis vocatur; Nervuli vero qui ad cor & præcordia, quamvis perexigui sint, faciunt alium sensum internum, in quo consistunt omnes animi commotiones, sive pathemata, & affectus, ut lætitiæ, tristitiæ, amoris, odii & similia. Nam, exempli causa, sanguis rite temperatus, facile ac plus solito in corde se dilatans, nervulos circa orificia sparsos ita laxat & movet, ut inde alius motus in cerebro sequatur, qui naturali quodam sensu hilaritatis afficit

CLXXXIX.  
*Quid sit sensus, & quomodo fiat.*

CXC.  
*De sensuum distinctione: ac primo de internis, hoc est, de animi affectionibus, & de appetitibus naturalibus.*

mentem: ac etiam aliæ quævis causæ, nervulos istos eodem modo moventes, cundem illum lætitiæ sensum dant. Ita imaginatio fruitionis alicujus boni, non ipsa sensum lætitiæ in se habet, sed spiritus ex cerebro ad musculos quibus illi nervi inserti sunt, mittit, eorumque ope orificia cordis expanduntur, & ejus nervuli moventur eo motu ex quo sequi debet ille sensus. Ita audito grato nuncio, mens primum de ipso judicat; & gaudet gaudio illo intellectuâli, quod sine ulla corporis commotione habetur, quodque idcirco Stoici dixerunt cadere posse in sapientem; deinde cum illud imaginatur, spiritus ex cerebro ad præcordiorum musculos fluunt, & ibi nervulos movent, quorum ope alium in cerebro motum excitant, qui mentem afficit lætitiæ animalis sensu. Eadem ratione sanguis nimis crassus, maligne in cordis ventriculos fluens, & non satis ibi se dilatans, alium quendam motum in iisdem præcordiorum nervulis facit, qui cerebro communicatus, sensum tristitiæ ponit in mente, quamvis ipsa forte nesciat cur tristetur: aliæque plures causæ idem præstare possunt. Atque alii motus istorum nervulorum efficiunt alios affectus, ut amoris, odii, motus, iræ, &c. quatenus sunt tantum affectus, sive animi pathemata, hoc est, quatenus sunt confusæ quædam cogitationes, quas mens non habet à se sola, sed ab eo quod à corpore, cui intime conjuncta est, aliquid patitur. Nam distinctæ cogitationes, quas habemus de iis quæ amplectenda sunt, vel optanda, vel fugienda, &c. toto genere ab istis affectibus distinguuntur. Non alia ratio est appetituum naturalium, ut famis, sitis, &c. qui à nervis ventriculi, faucium, &c. pendent, suntque à voluntate comedendi, bibendi, &c. plane diversi, sed, quia ut plurimum ista voluntas sive appetitio eos comitatur, idcirco dicuntur appetitus.

CXCI.  
De sensibus  
externis: ac  
primo de  
tactu.

Quantum ad sensus externos, quinque vulgo numerantur, propter quinque diversa objectorum genera, nervos iis servientes moventia, totidem genera cogitationum confusarum, quæ ab istis motibus in anima excitantur. Nam primo nervi in universi corporis cutem desinentes, illa mediante à quibuslibet terrenis corporibus tangi possunt, & ab illis integris moveri, uno modo ab illorum duritie, alio à gravitate, alio à calore, alio ab humiditate, &c. quotque diversis modis vel moventur, vel à motu suo ordinario impediuntur, tot in mente diversos sensus excitant,

ex quibus tot tactiles qualitates denominantur. Ac præterea cum isti nervi solito vehementius agitantur, sed ita tamen, ut nulla læsio in corpore inde sequatur, hinc fit sensus titillationis, menti naturaliter gratus, quia vires corporis, cui arcte conjuncta est, ei testatur; si vero aliqua læsio inde sequatur, fit sensus doloris. Atque hinc patet, cur corporea voluptas & dolor tam parum distent ab invicem in objecto, quamvis in sensu contrarii sint.

Deinde alii nervi, per linguam & partes ei vicinas sparsi, ab eorundem corporum particulis, ab invicem disjunctis, & simul cum saliva in ore natantibus, diversimode moventur, prout ipsorum figuræ sunt diversæ, sicque diversorum saporum sensus efficiunt. CXCII.  
*De gustu.*

Tertio, duo etiam nervi, sive cerebri appendices extra calvariam non exsertæ, moventur ab eorundem corporum particulis disjunctis, & in aëre volantibus, non quidem quibuslibet, sed iis quæ satis subtiles ac simul satis vividæ sunt, ut in nares attractæ per ossis spongiosi meatus, usque ad illos nervos perveniant; & à diversis eorum motibus fiunt diversorum odorum sensus. CXCIII.  
*De Odoratu.*

Quarto, duo alii nervi in intimis aurium cavernis reconditi, excipiunt tremulos & vibratos totius aëris circumjacentis motus. Aër enim membranulam tympani concutiens, subjunctam trium ossiculorum catenulam, cui illi nervi adhærent, simul quatit; atque ab horum motuum diversitate, diversorum sonorum sensus oriuntur. CXCIV.  
*De Auditu.*

Denique nervorum opticorum extremitates, tunicam, retinam dictam, in oculis componentes, non ab aëre nec à terrenis ullis corporibus ibi moventur, sed à solis globulis secundi elementis, unde habetur sensus luminis & colorum: ut jam satis in Dioptrica & Meteoris explicui. CXCIV.  
*De Visu.*

Probatur autem evidenter, animam non quatenus est in singulis membris, sed tantum quatenus est in cerebro, ea quæ corpori accidunt in singulis membris nervorum ope sentire: primo ex eo quod morbi varii, solum cerebrum afficientes, omnem sensum tollant, vel perturbent; ut & ipse somnus, qui est in solo cerebro, quotidie nobis magna ex parte adimit sentiendi facultatem, quam postmodum vigilia restituit. Deinde ex eo quod cerebro CXCVI.  
*Animam non sentire, nisi quatenus est in cerebro.*

rebro illæso, si tantum viæ per quas nervi à membris externis ad illud porriguntur, obstructæ sint, hoc ipso illorum membrorum sensus etiam perit. Ac denique ex eo quod dolor aliquando sentiatur, tanquam in quibusdam membris, in quibus nulla tamen est doloris causa, sed in aliis per quæ transcunt nervi, qui ab illis ad cerebrum protenduntur. Quod ultimum innumericis experientis ostendi potest, sed unum hic ponere sufficiet. Cum puellæ cuidam, manum gravi morbo affectam habenti, velarentur oculi quoties Chirurgus accedebat, ne curationis apparatus turbaretur, eique, post aliquot dies brachium ad cubitum usque, ob gangrænam in eo serpenteum, fuisset amputatum, & panni in ejus locum ita substituti, ut eo se privatam esse plane ignoraret, ipsa interim varios dolores, nunc in uno ejus manus quæ abscissa erat digito, nunc in alio se sentire querebatur: quod sane aliunde contingere non poterat, quam ex eo quod nervi qui prius ex cerebro ad manum descendebant, tuncque in brachio juxta cubitum terminabantur, eodem modo ibi moverentur, ac prius moveri debuissent in manu, ad sensum hujus vel illius digiti dolentis animæ in cerebro residenti imprimendum.

CXCVII.

*Mentem esse talis naturæ, ut à solo corporis motu variis sensus in ea possint excitari.*

Probatur deinde, talem esse nostræ mentis naturam, ut ex eo solo, quod quidam motus in corpore fiant ad quaslibet cogitationes, nullam istorum motuum imaginem referentes, possit impelli; & speciatim ad illas confusas, quæ sensus, sive sensationes dicuntur. Nam videmus, verba, sive ore prolata, sive tantum scripta, quaslibet in animis nostris cogitationes & commotiones excitare. In eadem charta, cum eodem calamo & atramento, si tantum calami extremitas certo modo supra chartam ducatur, literas exarabit, quæ cogitationes præriorum, tempestatum, furiarum, affectusque indignationis & tristitiæ in lectorum animis concitabunt; si vero alio modo fere simili calamus moveatur, cogitationes valde diversas, tranquillitatis, pacis, amœnitatis, affectusque plane contrarios amoris & lætitiæ efficiet. Respondebitur fortasse, scripturam vel loquelam nullos affectus, nullasque rerum à se diversarum imaginationes immediate in mente excitare, sed tantummodo diversas intellectiones; quarum deinde occasione anima ipsa variarum rerum imagines in se efformat. Quid autem dicetur de sensu doloris & titillationis? Gladius corpori nostro admovetur; illud scindit; ex hoc solo sequitur dolor; qui sane



fane non minus diversus est à gladii, vel corporis quod scinditur locali motu, quam color, vel sonus, vel odor, vel sapor. Atque ideo cum clare videamus, doloris sensum in nobis excitari ab eo solo, quod aliquæ corporis nostri partes contactu aliqujus alterius corporis localiter moveantur, concludere licet, mentem nostram esse talis naturæ, ut ab aliquibus etiam motibus localibus omnium aliorum sensuum affectiones pati possit.

Præterea non deprehendimus ullam differentiam inter nervos, ex qua liceat judicare, aliud quid per unos, quam alios, ab organo sensuum externorum ad cerebrum pervenire, vel omnino quidquam eo pervenire præter ipsorum nervorum motum localem. Videmusque, hunc motum localem, non modo sensum titillationis, vel doloris exhibere, sed etiam luminis & sonorum. Nam si quis in oculo percutiatur, ita ut ictus vibratio ad retinam usque perveniat, hoc ipso videbit plurimas scintillas luminis fulgurantis; quod lumen extra ejus oculum non erit; Atque si quis aurem suam digito obturet, tremulum quoddam murmur audit; quod à solo motu aëris in ea inclusi procedet. Denique sæpe advertimus, calorem, aliasve sensiles qualitates, quatenus sunt in objectis, nec non etiam formas rerum pure materialium, ut exempli gratia, formam ignis, à motu locali quorundam corporum oriri, atque ipsas deinde alios motus locales in aliis corporibus efficere. Et optime comprehendimus, quo pacto à varia magnitudine, figura & motu particularum unius corporis, varii motus locales in alio corpore excitentur; nullo autem modo possumus intelligere, quo pacto ab iisdem (magnitudine scilicet, figura & motu) aliquid aliud producat, omnino diversæ ab ipsis naturæ, quales sunt illæ formæ substantiales & qualitates reales, quas in rebus esse multi supponunt; nec etiam quo pacto postea istæ qualitates aut formæ vim habeant in aliis corporibus motus locales excitandi. Quæ cum ita sint, & sciamus, eam esse animæ nostræ naturam, ut diversi motus locales sufficiant, ad omnes sensus in ea excitandos; experiamurque, illos re ipsa varios sensus in ea excitare; non autem deprehendamus, quicquam aliud, præter ejusmodi motus, à sensuum externorum organo ad cerebrum transire: omnino concludendum est, non etiam à nobis animadverti, ea, quæ in objectis externis, luminis, coloris, odoris, saporis, soni, caloris, frigoris, & aliarum tactilium

CXCVIII.

*Nil à nobis in objectis externis sensu deprehendi, præter ipsorum figuras, magnitudines & motus.*

qualitatum, vel etiam formarum substantialium nominibus indigitamus, quicquam aliud esse quam istorum objectorum varias dispositiones, quæ efficiunt ut nervos nostros variis modis movere possint.

**CXCIX.** Atque ita facili enumeratione colligitur, nulla naturæ phænomena fuisse à me in hac tractatione prætermissa. Nihil enim inter naturæ phænomena est recensendum, nisi quod sensu deprehenditur. Atque exceptis magnitudine, figura & motu, quæ qualia sint in unoquoque corpore explicui, nihil extra nos positum sentitur, nisi lumen, color, odor, sapor, sonus, & tactiles qualitates; quæ nihil aliud esse, vel saltem à nobis non deprehendi quicquam aliud esse in objectis, quam dispositiones quasdam in magnitudine, figura & motu consistentes, hæcenus est demonstratum.

**CC**  
Nullis me in  
ea principiis  
usum esse,  
quæ non ab  
omnibus re-  
cipiantur;  
hancque  
Philoso-  
phiam non  
esse novam,  
sed maxime  
antiquam  
& vulga-  
rem.

Sed velim etiam notari, me hic universam rerum materialium naturam ita conatum esse explicare, ut nullo plane principio ad hoc usum sim, quod non ab Aristotele, omnibusque aliis omnium seculorum Philosophis fuerit admissum: adeo ut hæc Philosophia non sit nova, sed omnium maxime antiqua & vulgaris. Nempe figuras & motus, & magnitudines corporum consideravi, atque secundum leges Mechanicæ, certis & quotidianis experimentis confirmatas, quidnam ex istorum corporum mutuo concursu sequi debeat, examinavi. Quis autem unquam dubitavit, quin corpora moveantur, variasque habeant magnitudines & figuras, pro quarum diversitate ipsorum etiam motus variantur, atque ex mutua collisione, quæ majuscula sunt, in multa minora dividantur, & figuras mutant? Hoc non uno tantum sensu, sed pluribus, visu, tactu, auditu, deprehendimus; hoc etiam distincte imaginamur & intelligimus: quod de reliquis, ut de coloribus, de sonis, & cæteris, quæ non ope plurium sensuum, sed singulorum duntaxat percipiuntur, dici non potest: semper enim eorum imagines in cogitatione nostra sunt confusæ, nec quidnam illa sint scimus.

**CCI.**  
Davi parti-  
culas corpo-  
rum insen-  
siles.

At multas in singulis corporibus particulas considero, quæ nullo sensu percipiuntur: quod illi fortasse non probant, qui sensus suos pro mensura cognoscibilem sumunt. Quis autem potest dubitare, quin multa corpora sint tam minuta, ut ea nullo sensu deprehendantur, si tantum consideret, quidnam singulis horis ad-  
jiciatur

jiatur iis quæ lente augentur, vel quid detrahatur ex iis quæ minuuntur? Crescit arbor quotidie, nec potest intelligi majorem illam reddi, quam prius fuit, nisi simul intelligatur aliquod corpus ei adjungi. Quis autem unquam sensu deprehendit, quænam sint illa corpuscula, quæ in una die arbori crescenti accesserunt? Atque saltem illi, qui agnoscunt quantitatem esse indefinite divisibilem, fateri debent, ejus partes reddi posse tam exiguas, ut nullo sensu percipiantur. Et sane mirum esse non debet, quod valde minuta corpora sentire nequeamus; cum ipsi nostri nervi, qui moveri debent ab objectis ad sensum efficiendum, non sint minutissimi; sed funiculorum instar, ex multis particulis se minoribus conflati; nec proinde à minutissimis corporibus moveri possint. Nec puto, quemquam ratione utentem negaturum, quin longe melius sit, ad exemplum eorum quæ in magnis corporibus accidere sensu percipimus, judicare de iis quæ accidunt in minutis corpusculis, ob solam suam parvitatem sensum effugientibus, quam, ad hæc explicanda, novas res nescio quas, nullam cum iis quæ sentiuntur similitudinem habentes, excogitare.

At Democritus etiam corpuscula quædam imaginabatur, varias figuras, magnitudines & motus habentia, ex quorum coactione, mutuisque concursibus, omnia sensilia corpora exsurgerent; & tamen ejus philosophandi ratio vulgo ab omnibus rejici solet. Verum nemo unquam illam rejecit, propterea quod in eo considerarentur quædam corpora tam minuta ut sensum effugerent, quæ varias magnitudines, figuras & motus habere dicerentur; quia nemo potest dubitare, quin multa revera talia sint, ut modo ostensum est. Sed rejecta est, primo quia illa corpuscula indivisibilia supponebat; quo nomine etiam ego illum rejicio: deinde quia vacuum circa ipsa esse fingeat; quod ego nullum dari posse demonstro: tertio quia gravitatem iisdem tribuebat; quam ego nullam in ullo corpore cum solum spectatur, sed tantum quatenus ab aliorum corporum situ & motu dependet, atque ad illa refertur, intelligo. Ac denique quia non ostendebat, quo pacto res singulæ ex solo corpusculorum concursu orirentur, vel si de aliquibus id ostenderet, non omnes ejus rationes inter se cohærebant; saltem quantum judicare licet ex iis, quæ de ipsius opinionibus memoriæ prodita sunt. An autem ea quæ hac-

CCII.  
Democriti  
Philosophiam non  
minus differre à nostra, quam à vulgari.

tenus de Philosophia scripti, satis cohæreant, aliis iudicandum relinquo.

CCIII.  
*Quomodo  
figuras &  
motus par-  
ticularum  
insensibilium  
cognoscimus.*

At insensibilibus corporum particulis determinatas figuras & magnitudines & motus assigno, tanquam si eas vidissem, & tamen fateor, esse insensibiles; atque ideo quærent fortasse nonnulli, unde ergo quales sint agnoscam. Quibus respondeo, me primo quidem ex simplicissimis & maxime notis principiis, quorum cognitio mentibus nostris à natura indita est, generaliter considerasse, quænam præcipuæ differentiæ inter magnitudines & figuras & situs corporum, ob solam exiguitatem suam, insensibilium esse possent, & quinam sensibiles effectus ex variis eorum concursibus sequerentur. Ac deinde, cum similes aliquos effectus in rebus sensibilibus animadverti, eas ex simili talium corporum concursu ortas existimasse; præsertim cum nullus alius ipfas explicandi modus excogitari posse videbatur. Atque ad hoc arte facta non parum me adjuverunt: nullum enim aliud inter ipsa & corpora naturalia discrimen agnosco, nisi quod arte factorum operationes ut plurimum peraguntur instrumentis adeo magnis, ut sensu facile percipi possint: hoc enim requiritur, ut ab hominibus fabricari queant. Contra autem, naturales effectus fere semper dependent ab aliquibus organis adeo minutis, ut omnem sensum effugiant. Et sane nullæ sunt in Mechanica rationes, quæ nonetiam ad Physicam, cujus pars vel species est, pertineant: nec minus naturale est horologio, ex his vel illis rotis composito, ut horas indicet, quam arbori, ex hoc vel illo semine ortæ, ut tales fructus producat. Quamobrem ut ii qui in considerandis automatis sunt exercitati, cum alicujus machinæ usum sciunt, & nonnullas ejus partes aspiciunt, facile ex istis, quo modo aliæ quas non vident sint factæ, conjiciunt; ita ex sensibilibus effectibus, & partibus corporum naturalium, quales sint eorum causæ & particulæ insensibiles, investigare conatus sum.

CCIV.  
*Sufficere si  
de insensibilibus  
quælibet  
esse possint,  
explicuerim,  
et si forte  
non talia  
sint.*

At quamvis forte hoc pacto intelligatur, quomodo res omnes naturales fieri potuerint, non tamen ideo concludi debet, ipfas revera sic factas esse. Nam quemadmodum ab eodem artifice duo horologia fieri possunt, quæ quamvis horas æque bene indicent, & extrinsecus omnino similia sint, intus tamen ex valde dissimili rotularum compage constant; ita non dubium est, quin summus rerum opifex omnia illa quæ videmus, pluribus diversis modis potue-

potuerit efficere. Quod equidem verum esse libentissime concedo, satisque à me præstitum esse putabo, si tantum ea quæ scripta talia sint, ut omnibus naturæ phænomenis accurate respondeant. Hocque etiam ad usum vitæ sufficiet, quia & Medicina, & Mechanica, & cæteræ artes omnes, quæ ope Physicæ perfici possunt, ea tantum quæ sensilia sunt, ac proinde inter naturæ phænomena numeranda, pro fine habent. Et ne quis forte sibi persuadeat, Aristotelem aliquid amplius præstitisse, aut præstare voluisse, ipsemet in primo Meteorologicorum, initio capitis septimi, expresse testatur, de iis quæ sensui non sunt manifesta, se putare sufficientes rationes & demonstrationes afferre, si tantum ostendat, ea ita fieri posse, ut à se explicantur.

Sed tamen ne qua hic veritati fraus fiat, considerandum est, quædam esse quæ habentur certa moraliter, hoc est, quantum sufficit ad usum vitæ, quamvis si ad absolutam Dei potentiam referantur, sint incerta. Ut exempli gratia, si quis legere velit epistolam, Latinis quidem literis, sed non in vera significatione positam, scriptam, & conjiciens ubicunque in ea est A, legendum esse B, ubi B legendum C, atque ita pro unaquaque litera proxime sequentem esse substituendam, inveniatur hoc pacto Latina quædam verba ex iis componi, non dubitabit quin illius epistolæ verus sensus in istis verbis contineatur, etsi hoc sola conjectura cognoscat; & fieri forsitan possit, ut qui eam scripsit, non literas proxime sequentes, sed aliquas alias loco verarum posuerit, atque sic alium in ea sensum occultaveit: hoc enim tam difficulter potest contingere, ut non credibile videatur. Sed qui advertent, quam multa de magnetæ, de igne, de totius Mundi fabrica, ex paucis quibusdam principiis hic deducta sint, quamvis ista principia tantum casu & sine ratione à me assumpta esse putarent, forte tamen agnoscent, vix potuisse contingere, ut tam multa simul cohærerent, si falsa essent.

Præterea quædam sunt, etiam in rebus naturalibus, quæ absolute ac plusquam moraliter certa existimamus, hoc scilicet innixi Metaphysico fundamento, quod Deus sit summe bonus & minime fallax, atque ideo facultas quam nobis dedit ad verum à falso dijudicandum, quoties ea recte utimur, & quid ejus ope distincte percipimus, errare non possit. Tales sunt Mathematicæ demonstrationes: talis est cognitio quod res materiales existunt; & talia

CCV.

*Et tamen  
quæ expli-  
cui, videri  
saltem mo-  
raliter cer-  
ta.*

CCVI.

*Ino phis-  
quam mo-  
raliter.*

sunt evidentia omnia ratiocinia, quæ de ipsis sunt. In quorum numerum fortassis etiam hæc nostra recipientur ab iis, qui considerabunt, quo pacto ex primis & maxime simplicibus cognitionis humanæ principiis continua serie deducta sint. præsertim si satis intelligant, nulla nos objecta externa sentire posse, nisi ab iis aliquis motus localis in nervis nostris excitetur; talemque motum excitari non posse à stellis fixis, longissime hinc distantibus, nisi fiat etiam aliquis motus in illis, & in toto cælo interjacente: his enim admittis, cætera omnia, saltem generaliora quæ de Mundo & Terra scripsi, vix aliter quam à me explicata sunt, intelligi posse videntur.

CCVII.

*Sed me  
omnia mea  
Ecclesia au-  
doritati  
submittere.*

At nihilominus memor meæ tenuitatis, nihil affirmo: sed hæc omnia tum Ecclesiæ Catholicæ auctoritati, tum prudentiorum iudiciis submitto; nihilque ab ullo credi velim, nisi quod ipsi evidens & invicta ratio persuadebit.

F I N I S.



A01 1453916